

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קלבטן תרחיף

החומר הפעיל ורכיביו:

כל 15 מ"ל מכילים:

262 מ"ג ביסמוט אבසליצילאט

(bismuth subsalicylate 262 mg)

קלבטן פורטה תרחיף

החומר הפעיל ורכיביו:

כל 7.5 מ"ל מכילים:

262 מ"ג ביסוט אבසליצילאט

(bismuth subsalicylate 262 mg)

קלבטן טבליות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

262 מ"ג ביסוט אבසליצילאט

(bismuth subsalicylate 262 mg)

קלבטן פורטה קפליות

החומר הפעיל וכמותו:

כל קפליה מכילה:

524 מ"ג ביסוט אבසליצילאט

(bismuth subsalicylate 524 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את עלון עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש על פי ההוראות בסעיף המינון בעיון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.
עליך להפסיק את Nutzung התרופה ולפנות אל הרופא אם סימני המחלת (סימפטומים) מחמירים או
אין משתפרים לאחר יומיים.

1. למה מיועדת התרופה?

- להקללה במקרים של שלשול, בחילה, גזם, כאבי בטן עוויתיים, קלקל קיבה וקשיש בעיכול.
- למניעת שלשול של מטיילים.

קבוצה רפואיית: סופח נזלים ורעלנים מהמעי ומהצואה.

קלבטן מכיל את המרכיב הפעיל ביסוט אבאסליצילאט. הוא פועל באמצעות יצירת ציפוי מרגיע ומגן בקיבה ובמעי.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, לסליצילטים, לרבות אספירין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.אתה נוטל סליצילטים אחרים, לרבות אספירין.את בהירין או מניקה. |
|--|

לפני תחילת הטיפול בקלבטן יש לידע את הרופא אם:

- אתה סובל מהפרעה בקרישת דם או משיגdon.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא אם:

- השלשול מלאוה בחום
- אתה סובל מצצלול באוזניים
- אתה מבחין בתופעה חריגה או סובל מתופעות לוואי בלתי צפויות

אם אתה סובל משלשול, חשוב למנוע התיבשות או לטפל בה באמצעות שתיתת נוזלים מרובה או נטילת תכשירי רה-הידרציה הניטלים דרך הפה, במיוחד אם אתה חשש או קשייש.

ילדים ומתבגרים

התרופה מיועדת למוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים. מתחת לגיל 12 שנים יש לפנות לרופא. תכשיר זה אינו מיועד לשימוש עבור ילדים ומתבגרים אשר סובלים או מחלומים מעבעות רוח או מתסמים דמיי שפעת. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

אינטראקציות/תגובהות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח או לוקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במקרה שאתה לוקח אספירין וסילציאטים, תרופות לדילול הדם (נוגדי קרישה), תרופות לטיפול בסוכרת, בשיגdon או תרופות אנטי-ביזוטיות מקובצות טטרציקליינים.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.

הירון והנקה
אין להשתמש בתרופה במהלך הירון או הנקה.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
קלבטן טרחיף וקלבטן פורטה טרחיף:
התכשירים מכילים 20 מ"ג/מ"ל פרופילן גליקול

מכילים גם **R 4Ponceau**, צבע העולול לאירוע לתגובה אלרגית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

קלבטן טබליות וקלבטן פורטה קפליות:
המינון המקביל בדרך כלל הוא:

גיל המטופל	קלבטן טබליות	קלבטן פורטה קפליות
מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים	2 טබליות	1 קפליה

ילדים מתחת לגיל 12 שנים יש להיוועץ ברופא.

אם הומלץ על ידי הרופא - ילדים מתחת לגיל 9 שנים: מומלץ להשתמש בקלבטן נוזלי. לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה, עד 8 פעמים בכל 24 שעות. יש לבלווע את התרופה עם מים.

אין לחצות טබליות קלבטן.
קפליות קלבטן פורטה: ניתן לחצות את הקפליה לשם הקלה על הבליעה, אך יש לבלווע את 2 החלקים יחד.
אין לעבור על המנה המומלצת.

קלבטן טרחיף וקלבטן פורטה טרחיף:

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

גיל המטופל	קלבטן טרחיף	קלבטן פורטה טרחיף
------------	-------------	-------------------

ילדים מתחת לגיל 12 שנים: יש להיוועץ ברופא.

לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה, עד 8 פעמיים בכל 24 שעות. לפני השימוש יש לנערר היטב ולשתות בהתאם למינון המומלץ. יש להקפיד על מדידת המנה בכוסית או בכפית המצורפת. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטلت בטעות מינון גבואה יתר

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעל ילד מן התרפופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרפופה איתך. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

תסמינים של מינון יתר

הרעלה ביסמוט

עלולה להופיע כאנטפלופתיה חריפה עם בלבול, תנענות מיקולניות, רעד, הפרעת דיבור והפרעות הליכה ועמידה.

כמו כן, הרעלת ביסמוט עלולה לגרום להפרעות במערכת העיכול, לTAGBOOT עוריות, לשינוי צבע בקרומיים הריריים ולליקוי בתפקוד הכליאות כתוצאה ממנק טובלרי חריף.

הרעלה סליצילאט

המאפיינים השכיחים כוללים הקאות, התיבשות, טנטון, רטיגו, חירשות, חזעה, גפיהם חממות עם תחרשות דפק הולם, קצב נשימה מוגבר ונשימת יתר (היפרונטילציה). דרגה מסוימת של הפרעה במזין חומצה-בסיס קיימת מרבית המקרים.

בססת נשימתית בשליבן עם חמצת מטבולית, עם HK עורקי תקין או גבוה (ריכוז יוני מימן תקין או מופחת) היא תופעה שכיחה במוגברים ובילדים מעל גיל 4 שנים. ילדים בגיל 4 שנים ומטה, חמצת מטבולית דומיננטית עם HK עורקי נמוך (ריכוז יוני מימן מוגבר) היא שכיחה. חמצת עלולה להגבר את המעבר של סליצילאט דרך מחסום הדם-מוח.

מאפיינים שאינם שכיחים כוללים הקאה דמית, חום גבוה, היפוגליקמיה, היפוקלמייה, תרומבוציטופניה, R/INR PTR מוגבר, קרישת בטור-כלி דם, אי ספיקת כליתית ובזקמת ריאתית שמוקורה אינו לבב.

מאפייני מערכת העצבים המרכזית לרבות בלבול, חוסר התמצאות, תרדמת ופרקטיים פחות שכיחים במוגברים מאשר בילדים.

אם שכחת ליטול את התרפופה

אם שכחת ליטול תרפופה זו בזמן המיעוד, יש ליטול מנה מיד כשןצורת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נטל תרפופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפופה השימוש בקלבטן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול אף אחת מהן.

בילדים ומתבגרים: אם בעת שימוש בתכשיר זה חלים שינויים שניים בהtanegot הcoliims בחילות והקאות, יש להתייעץ עם רופא מאחר שתסמינים אלה עשויים להיות סימן מוקדם לתסמונת ר'י, מחלת נדירה אך חמומה.

תופעות לוואי נוספת

תרופה זו עלולה לגרום לשינוי זמני ולא מזיך במצב הצואה או הלשון (צבע כהה יותר). אם תסminsים

אליה אינם חולפים לאחר 3 ימים מהפסקת השימוש בתכשיר – **התיעץ עם הרופא או הרוקח.**

אם אחת מתופעות הלואוי חממירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך **להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי"

על **קב טיפול תרופתי** שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה

לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אין לגורום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה, הבליסטר או הבקבוק.

תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

קלבטים טבליות:

microcrystalline cellulose, calcium carbonate,mannitol, sodium starch glycolate, povidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polysorbate 80, Red Lake No. 3, sodium saccharin, Eudragit E 100, talc

קלבטים פורטה קפליות:

microcrystalline cellulose, calcium carbonate, sodium starch glycolate, povidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polysorbate 80, Red Lake No. 3, Opadry II

קלבטים תרחיף:

Propylene glycol
Aluminium magnesium silicate
Carboxymethyl cellulose sodium
Sodium salicylate
Methyl salicylate
Salicylic acid
Sorbic acid
Saccharine sodium
Benzoic acid
Ponceau 4R
Purified water

קלבטים פורטה תרחיף:

Propylene glycol
Aluminium magnesium silicate
Carboxymethyl cellulose sodium
Raspberry flavour
Sodium salicylate
Salicylic acid
Sorbic acid
Saccharine sodium
Benzoic acid
Ponceau 4R
Purified water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

קלבטים טבליות: טבליות ורודות עגולות עם קו ח齐יה לצד אחד באריזת בליסטר המכילה 10, 20, 30, 40 טבליות או בבקבוק המכיל 10 טבליות.

קלבטים פורטה קפליות: 20/10/5 קפליות ורודות מאורכיות עם קו ח齊יה לצד אחד באריזת בליסטר.

קלבטים תרחיף: נוזל ורוד סמיך בבקבוק 100 או 200 מ"ל.

קלבטים פורטה תרחיף: נוזל ורוד סמיך בבקבוק 100 מ"ל.

ייתכן שלא כל סוג האריזות משוווקים.

היצן ובעל הרישום: סמ-און בע"מ, רח' אהוד קנמן (העובדת) 25, בת-ים.

מספריו רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

קלבطن טבליות: 114 90 29652

קלבطن פורטה קפליות: 140 95 31841

קלבطن תרחיפ: 68 93 28288

קלבطن פורטה תרחיפ: 131 72 30868

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.