

אלכוספט תמיסה

הרכב:

כלורהקסידין גלוקונט 0.5% w/v
(Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v)
אתנול 70% w/v (Ethanol 70% w/v)

חומרים בלתי פעילים ואזולוגניים בתרופה - ראה טעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

על לך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בטעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. על לך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי העור.

קבוצה תרופתית: חומרים אנטיספטיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים כלורהקסידין גלוקונט ו/או אתנול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה טעיף 6 "מידע נוסף").
- במגע עם העיניים, המוח, קרומי המוח, באוזן הטיבנה או באוזן התינונית כאשר עור התוף מחורר.
- בהזרקה.
- בפתחי הגוף (לדוגמה: אף, אזניים).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אלכוספט מכיל כלורהקסידין. כלורהקסידין ידוע כגורם לרגישות יתר, כולל תגובות אלרגיות כלליות והלם אנפילקטי. השכיחות של רגישות יתר לכלורהקסידין אינה ידועה. אין להשתמש באלכוספט במטופלים עם היסטוריה אפשרית של תגובה אלרגית לתרכובת מכילה כלורהקסידין.
- אם התרופה ניתנת בטעות באינפוזיה - ייתכן שעירוי דם יהיה הכרחי כדי לנטרל את ההמוליזה.
- השימוש בתמיסות כלורהקסידין עבור חיטוי העור לפני פרוצדורות פולשניות, הן על בסיס אלכוהול והן מימיות, נקשר עם כוונות כימיות אצל יילודים. היסכון נראה גבוה יותר אצל תינוקות שמולד לפני הזמן, במיוחד אלו שנולדו לפני שבוע שלוש של ההיריון ובתנאי השבועיים הראשונים אלו.
- אין לקרב את המוצר למקורות חום או אש.
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.

אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

על לך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הניתוח:

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע עם העיניים ועם רקמות ריריות. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות לרופא במידת הצורך.

אופן השימוש:

יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג באלכוספט כל פעם שנדרש.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהגך נוסף לתרופה. הרכב משקפיים אם הגך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברוקח או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באלכוספט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה ולפנות לקבלת טיפול רפואי אם מופיעות התופעות הבאות:

- כלורהקסידין יכול לעתים נדירות מאוד לגרום לרגישות יתר כולל הלם אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים, לחץ דם נמוך) ותגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת העור, גרד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, ספרדות, גירוי בעור, שלפוחיות).
- ייתכן כוונות כימיות ביילודים ובתינוקות.

אם הפיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, על לך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ ליישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש.
- לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בתרופה עד תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:
Purified water, Tartrazine.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה בצבע צהוב.
התרופה מגיעה בגדלי אריזה של: 100 מ"ל, 300 מ"ל, 500 מ"ל או 1,000 מ"ל.

ייתכן שלא כל גדלי האריזה ממושקים.

יצרן ובעל הרישום:

בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 2017400, ישראל.

עלון זה נערך ב-2024/04 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
129-67-30806-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.