

## نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

# الكوسبيت محلول

التركيبية:

كلورهيكسيدين جلوكونات 0.5% w/v  
(Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v)

إيثانول 70% w/v (Ethanol 70% w/v)  
المواد غير الفعالة ومسيبات الحساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء". في هذه النشرة، استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتطهير الجلد.

الفصلية العلاجية: مواد مطهرة.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادتين الفعالتين كلورهيكسيدين جلوكونات وأو الإيثانول أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- بتزامن مع العينين، الدماغ، أغشية الدماغ، في الأذن الوسطى أو في الأذن الخارجية عندما يكون الغشاء الطبلي (طبلة الأذن) منتفخاً.
- في فتحات الجسم (على سبيل المثال: الأنف، الأذنين).

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- الكوسبيت يحتوي على كلورهيكسيدين. معلوم أن كلورهيكسيدين يسبب فرط الحساسية، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية العامة والصدمة التأقية. مدى شيوخ فرط الحساسية لكلورهيكسيدين غير معلوم. لا يجوز استعمال الكوسبيت لدى متلقي العلاج الذين يُحتمل أن لديهم سيرة مرضية من رد فعل تحسسي لمركب يحتوي على كلورهيكسيدين.
- إذا أعطي الدواء بالتسريب عن طريق الخطأ - فيحتمل أن تكون هناك ضرورة لنقل الدم من أجل إبطال انحلال الدم.
- استعمال محاليل كلورهيكسيدين لتطهير الجلد قبل الإجراءات الغزوية - سواء تلك التي تركز على الكحول أو المانيّة - مرتبط بحدوث حروق كيميائية لدى المولدين الجدد. يبدو أن الأطفال الرضع الذين يولدون قبل الأوان أكثر عرضة لهذا الخطر، خاصةً أولئك الذين يولدون قبل الأسبوع الـ 32 من الحمل وخلال أول أسبوعين في حياتهم.
- لا يجوز مجاورة المنتج لمصادر الحرارة أو النار.
- لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يجف المستحضر تماماً.

### التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخراً دوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الواجبة ومن كيفية العلاج بالدواء.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول:

لا يجوز بلعه! هذا الدواء مخصص لاستعمال الخارجي فقط.

يجب الامتناع عن ملامسة العينين والأنسجة المخاطية في حالة الملامسة يجب الشطف بالكثير من الماء ومراجعة الطبيب عند الحاجة.

### كيفية الاستعمال:

يجب مسح المنطقة المخصصة للتطهير بقطعة من القطن المغمّوق بالكوسبيت كلما تطليت الحاجة.

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال الكوسبيت إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف فوراً عن استعمال الدواء والتوجه لتلقي العلاج الطبي إذا ظهرت الأعراض التالية:

- في أحيان نادرة جداً يمكن أن يسبب كلورهيكسيدين فرط الحساسية، بما في ذلك الصدمة التأقية (انتفاخ الحلق أو الشفتين، ضغط دم منخفض) وردود الفعل الحساسية (مثل التهاب الجلد، حكة، احمرار، إيكزما، طفح جلدي، شرى، تقيح الجلد، حويصلات).
- يُحتمل حدوث حروق كيميائية لدى المولدين الجدد والأطفال الرضع.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

### التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى

الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمّم! إن الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

### ظروف التخزين:

- يجب التخزين في مكان بارد، في درجة حرارة دون 25°C.
- تبيّن! مادة قابلة للاشتعال، تُحفظ بعيداً عن النار.
- بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادتين الفعالتين، يحتوي الدواء أيضاً على:

Purified water, Tartrazine.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

محلول أصفر اللون.  
يتأى الدواء في عبوة بأحجام: 100 ملل، 300 ملل، 500 ملل أو 1,000 ملل.

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوة.

المصنع وصاحب الامتياز:

بن شمعون فلويس م.م.م. المنطقة الصناعية مسيحاف، بريد متجول ميسحاف 2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 04/2024 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

129-67-30806-00

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.