

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

هكسبيديل غسول فم محلول لفصل الفم

التركيبة:

كلور هيكسبيدين ديجلوكونات 0.2% w/v

(Chlorhexidine Digluconate 0.2% w/v)

المركبات غير الفعالة ومبيبات الحساسية في الدواء – انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" وفي البند 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة على نهائيتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للاستعمال لدى متلقي العلاج الذين يزيد عمرهم عن 12 عامًا. إذا كان العمر دون ذلك فيجب مراجعة الطبيب قبل الاستعمال.
يجب عليك استعمال الدواء وفقًا للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تعاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

- لإعانة تكثر اللويحة السنينة (البلاك).
- للمساعدة في علاج ومنع التهاب اللثة (جينجيفيتيس).
- للمساعدة في الحفاظ على النظافة الصحية للفم.
- لاستعمال بعد الجراحات أو العلاجات السنينة، للثت على تعافي اللثة.
- لعلاج القروح، والالتهابات الناجمة عن استعمال أطقم الأسنان، والتلوث الفطري في الفم.
- الفعالية العلاجية: مطهر.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة كلور هيكسبيدين ديجلوكونات أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز الاستعمال لدى الأولاد الذين عمرهم دون 12 عامًا إلا بتوصية من الطبيب.
- يجب استعمال الدواء وفقًا لما خُصص له. لا يجوز بلعه. في حالة ملامسة المحلول للعينين أو للأذنين، فيجب شطفهما جيدًا بالماء.
- في حالة نشوء رد فعل تحسسي شديد، عليك التوقف عن الاستعمال والتوجه فورًا لتلقي المساعدة. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- لا يجوز الاستعمال مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" لمزيد من المعلومات.
- لا يجوز تبييض الأقمشة التي لا تمت غسلها.
- قد يظهر تطبخ (تصبغ) مؤقت للأسنان واللسان. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- قد يطرأ تغير على الإحساس بالطعم أو ستشعر بإحساس بالذغ. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- الحمل والإرضاع:
- ليس هناك ما يمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على المركب PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (يسمى أيضًا: Macrogolglycerol Hydroxystearate)، الذي قد يسبب تهيجًا في الجلد.
- يحتوي الدواء على الكحول الذي قد يسبب إحساسًا بالذغ على الجلد المتضرر. يحتوي هذا الدواء على 5.656 ملل من الكحول في كل 100 ملل، وهذا التركيز يعادل 0.05656 ملل/ملل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية استعمال الدواء.

- الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي: مرتان في اليوم.
- التهاب اللثة: يوصى بالاستعمال لمدة شهر.
- القروح في الفم والتلوث الفطري في الفم: يجب مواصلة الاستعمال لمدة يومين إضافيين بعد الشفاء.
- التهابات الفم الناجمة عن أطقم الأسنان: يجب تنظيف ونقع أطقم الأسنان في غسول الفم لمدة 15 دقيقة مرتين في اليوم.
- بعد الجراحات السنينة: يجب اتباع تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك.
- يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

لا يجوز بلعه.

يجب الاستعمال فقط إذا كان قفل السداد موجودًا وبشكله الكامل قبل الفتح.

قد تخل معاجين الأسنان بفعالية غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، اشطف فمك جيدًا بالماء وانتظر 5 دقائق قبل استعمال هكسبيديل غسول فم. بدلًا من ذلك، بإمكانك استعمال غسول الفم أيضًا في وقت آخر من اليوم.

تعليمات الاستعمال:

يجب تعبئة كأس القياس الصغيرة حتى خط 10 ملل، وشطف الفم جيدًا بالدواء لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك يجب بصق الدواء. إذا استمرت الأعراض، فراجع الطبيب.

إذا استعملت خطأ جرعة دوائية أعلى

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هكسبيديل غسول فم إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا لتلقي المساعدة الطبية إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- تطبق جلدي
- انتفاخ في الفم أو في الوجه
- صعوبات في التنفس

قد تكون هذه الأعراض أعراضًا لرد فعل تحسسي خطير ونادر جدًا. يجب التوقف عن استعمال الدواء ومراجعة الطبيب إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- تهيج في الفم
- ألم

انتفاخ الجانِب الداخلي للخدين

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) – أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل 1 من بين 10:

• تطبخ (تصبغ) مؤقت للسان ويتلاشى عند إيقاف العلاج.

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100:

• جفاف في الفم.

• تغير في حساسة الذوق، إحساس بالذغ، تتميل، أو نخز في اللسان عندما تستعمل غسول الفم لأول مرة. يزول ذلك عادة مع الاستمرار بالعلاج.

إذا استمرت الأعراض – فيجب التوجه إلى الطبيب.

أعراض جانبية مدى شيوعة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعتها بعد):

- تطبخ (تصبغ) مؤقت للأسنان وعادة يمكن إزالته عن طريق التنظيف بالفرشاة. يمكن منع حدوث هذا التطبخ بواسطة الامتناع عن شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر – خاصة ساعة بعد الاستعمال، وأيضًا عن طريق تنظيف الأسنان اليومي بالفرشاة وبمعجون الأسنان (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟"). إذا بقي التطبخ، فيمكن إزالته بواسطة التنظيف والصلل لدى طبيب الأسنان أو أخصائية صحة الأسنان.
- بالنسبة لأطقم الأسنان – يمكن تنظيفها بواسطة مادة لتنظيف أطقم الأسنان.
- انتفاخ في غدد اللعاب.
- تقشر الجلد داخل الفم. لاجتباب حدوث ذلك، يجب تخفيف غسول الفم بكمية مساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تعاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تستب التفتيح بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C.
- يجب حفظه في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.
- يمكن استعمال الدواء لما لا يزيد عن 6 أشهر منذ فتح القنينة لأول مرة، ودون تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على: Purified Water, Sorbitol Solution, Ethanol 95% (Alcohol 95%), PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Peppermint Oil

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة لونها بني تحتوي على محلول صاف. تأتي مع كأس قياس صغيرة.

حجم العبوة: 300 ملل.

المصنِّع وصاحب الامتياز:

بن شمعون فلوريس م.ص. المنطقة الصناعية ميسجاف، بريد متحول 2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 04/2024 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

161-77-35102-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.