

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ، أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على ريفاروكسابان (Rivaroxaban) 10 ملغ.

المواد غير الفعالة ومسببات الأرجية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بأعنان حتى نهائيتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطه للأخرين. قد يضرهم هذا الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

بالإضافة إلى النشرة، توجد للدواء **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** بطاقة معلومات وقائية لمثلقي العلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائية هامة، يتوجب عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج وخلال فترة العلاج **بريفاروكسابان دكسل 10 ملغ**، وعليك أتباعها. يجب قراءة بطاقة المعلومات الوقائية لمثلقي العلاج ونشرة المستهلك قبل البدء باستعمال الدواء. يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعانة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ مخصص لـ:

- منع تكوّن خثرات دموية في الأوردة، لدى البالغين بعد جراحة اختيارية لاستبدال الورك أو الركبة.
- منع معاودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (الخثار الوريدي العميق) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي) لدى البالغين، بعد إتمام ما لا يقل عن 6 أشهر علاجية للخثار الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي السابق.
- **الفصيلة العلاجية:** ينتمي **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** إلى فصيلة الأدوية المسماة مضادات التخثر ويعمل عن طريق تقليل الميل إلى تكوّن خثرات دموية وذلك من خلال حجب عمليّ يلعب دورًا في عملية التخثر (العامل 10a).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (ريفاروكسابان) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت تعاني من نزيف دموي متزايد.
- وُجد لديك مرض أو حالة في عضو في الجسم يزيدان من خطر نشوء نزيف دموي خطير (مثل: قرحة المعدة، إصابة أو نزيف دموي في الدماغ، جراحة في الدماغ أو العينين تمت مؤخرًا).
- كنت تستعمل أدوية لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، باستثناء حالات الانتقال من العلاج بمضاد تخثر واحد إلى العلاج بأخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال أنبوب قسطرة وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا.
- كنت تعاني من مرض في الكبد يسبب ارتفاعًا في خطر نشوء نزيف دموي.
- كنت حاملاً أو مرضعًا.

لا تستعمل ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ وأخبر طبيبك إذا التطبيق عليك أحد الأوضاع الموصوفة أعلاه.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ.**

يتطلب استعمال ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ توخي الحذر بشكل خاص. قبل العلاج **بريفاروكسابان دكسل 10 ملغ**، أخبر الطبيب إذا:

- كنت معرضًا لخطر عالٍ لنشوء نزيف دموي مثلًا قد يكون في إحدى الحالات التالية:
 - مرض كلوي بدرجة متوسطة أو خطيرة، لأن وظيفة الكليتين قد تؤثر على كمية الدواء الذي يعمل في جسمك.
 - كنت تستعمل أدوية أخرى لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال أنبوب قسطرة وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا (انظر في البند 2 "التفاعلات بين الأدوية").
 - اضطرابات نزفية.
 - ضغط دم مرتفع جدًا، وغير متوازن بواسطة العلاج الوالتي.
 - مرض في المعدة أو في الأمعاء قد يسبب نزيفًا دمويًا، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب المريء نتيجةً مثلًا لمرض الارتجاع المعدي المريئي (مرض يعلو فيه الحمض من المعدة إلى المريء) أو أورام موضعها في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
 - مشاكل في الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال الشبكية).
 - مرض رنوي تتوسع فيه الشعب الهوائية وتمتلئ بالإفرازات الفيجية (توسع القصبات) أو نزيف دموي سابق من الرئة.
- وُجد لديك صمام قلبي اصطناعي.
- كنت تعلم أنك تعاني من مرض اسمه متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي يسبب ازديادًا في خطر نشوء خثرات دموية)، أخبر طبيبك وهو سيقرر ما إذا كان يجب تغيير العلاج. حدد الطبيب أن ضغط دمك غير مستقر أو إذا حُطّط لأجلك علاج جراحي أو علاج آخر لإزالة الخثرة الدموية من الرئتين.

إذا تطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، فأخبر الطبيب قبل استعمال الدواء. سيقرر الطبيب ما إذا كان يجب علاجك **بريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** وما إذا كنت بحاجة إلى متابعة عن كثب.

- إذا اعتقد الطبيب أنك معرض لخطر متزايد لتطوير قرحة المعدة أو الأمعاء، فيحتمل أن يعطيك أيضًا

علاجًا لمنعها.

إذا كان عليك الخضوع لعملية جراحية

من المهم للغاية تناول **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** قبل وبعد الجراحة، بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.

إذا كنت جراحتك تتضمن أنبوب قسطرة أو حقنة داخل النخاع (مثلًا للتخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي أو لتسكين الألم):

- من المهم للغاية تناول **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- راجع الطبيب المعالج فورًا إذا كنت تعاني من خثر (انعدام الإحساس) أو من ضعف في الرجلين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد تلاشي التخدير، لأن هناك حاجة إلى تدخل طبي طارئ.

الأولاد والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عامًا. لا تتوفر معلومات كافية حول الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأنز، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول)، باستثناء تلك المخصصة فقط للدهن على الجلد.
- أقراص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج - وهي حالة ينتج فيها الجسم فائضًا من الكورتيزول.

- أدوية معينة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل: كلاريثروميسين، إيريثروميسين، إيريثروميسين).
- أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج ثلوث فيروس الإيدز (HIV) (مثل: ريتونايفير).
- أدوية أخرى مضادة للتخثر (مثل: إينوكسابارين، كلويديدوجريل أو مناهضات فيتامينات K مثل وارفارين وأسينوكومارول).

- أدوية مضادة للالتهاب ومسكنة للألم (مثل: نابروكسين أو حمض الأستيل ساليسيليك [الأسبيرين]).

- درونيدارون، دواء لعلاج النبض غير المنتظم.

أدوية معينة لعلاج الاكتئاب (مثبطات استرداد السيروتونين الانتقالية [SSRIs] أو مثبطات استرداد السيروتونين والنورابينفرين [SNRIs]).

إذا تطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخبر الطبيب قبل استعمال الدواء، لأن هذه الأدوية قد تؤدي إلى مزيد فعالية **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ**. سيقرر طبيبك ما إذا كان سيتم علاجك **بريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراقبة طبية عن كثب.

كذلك، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:

- أدوية معينة لعلاج الصدغ (مثل: فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).

St. John's wort (العرن) - مستحضر نباتي لعلاج الاكتئاب.

- ريفامبيسين (مضاد حيوي).

إذا تطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخبر الطبيب قبل استعمال الدواء، لأن هذه الأدوية قد تؤدي إلى تقليل فعالية **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ**. سيقرر طبيبك ما إذا كان سيتم علاجك **بريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراقبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** مع أو بدون الطعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تستعلمي **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** إذا كنت حاملاً أو مرضعًا.

إذا كان هناك احتمال أن تحملي، فعليك استعمال وسيلة متوقّ بها لمنع الحمل في فترة استعمال **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ**.

إذا حملت خلال فترة استعمال الدواء، فراجعي الطبيب فورًا، وهو سيقرر بشأن استمرار العلاج.

السياقفة واستعمال الماكينات

ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ قد يسبب الدوار (عرض جانبي شائع) أو الإغماء (عرض جانبي غير شائع) (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السياقة، ولا ركوب الدراجة الهوائية، ولا استعمال الأدوات أو تشغيل الماكينات في فترة استعمال **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** إذا تأثرت من هذين العرضين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** على اللاكوز. إذا أخبرك طبيب في الماضي أن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

• لمنع تكوّن خثرات دموية في الأوردة بعد جراحة استبدال الورك أو الركبة، الجرعة الدوائية المتبّعة عادة هي قرص واحد (10 ملغ) مرة واحدة في اليوم.
• يجب تناول أول قرص بعد إجراء الجراحة بـ 6-10 ساعات إذا حدد الطبيب أن حالتك مستقرة. بعد ذلك يجب تناول قرص واحد كل يوم إلى أن يأمرك الطبيب المعالج بالتوقف عن ذلك.

• لمنع معاودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (الخثار الوريدي العميق) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي) بعد إتمام ما لا يقل عن 6 أشهر علاجية للخثار الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي السابق، الجرعة الدوائية المتبّعة عادة هي قرص واحد (10 ملغ) مرة واحدة في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

- في جراحة استبدال مفصل الورك تكون مدة العلاج عادة 5 أسابيع.

- في جراحة استبدال مفصل الركبة تكون مدة العلاج عادة أسبوعين.

• لمنع معاودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (الخثار الوريدي العميق) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي) بعد إتمام ما لا يقل عن 6 أشهر علاجية للخثار الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي السابق، سيتمّ تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب.

كيفية تناول

يوصى ببلع الدواء مع الماء.

إذا كان من الصعب عليك بلع القرص بأكمله، فكلّم طبيبك عن طرق أخرى لتناول **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ**. يمكن سحق القرص وخلطه مع الماء أو هريس التفاح، مباشرة قبل تناوله.

عند الحاجة، سيعطيك طبيبك **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** مسحوقًا عن طريق أنبوب تغذية للمعدة.

يُمنع شطر القرص لعدم وجود خط تقسيم. لا تتوفر معلومات عن مضغ القرص.

سيساهم تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم في أن تتذكّر تناوله.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى

عليك مراجعة الطبيب المعالج فورًا. تناول أكثر مما يلزم من **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** يزيد من خطر نشوء نزيف دموي. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تتذكّر. يجب تناول القرص التالي في يوم الغد ومواصلة العلاج كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة في أي حال من الأحوال!

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

حتى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء قبل إتمام العلاج دون استشارة الطبيب لأن **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** يمنع نشوء حالة خطيرة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

كما هو الحال مع أدوية مشابهة أخرى لتقليل تكوّن الخثرات الدموية، فإن **ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ** قد يسبب نزيفًا دمويًا من شأنه أن يشكّل خطرًا على الحياة. قد يسبب النزيف الدموي الشديد انخفاضًا فجائيًا في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزيف مخفيًا.

يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية:

علامات على وجود نزيف دموي:

- نزيف دموي دماغي أو داخل القحف (قد تشملّ الأعراض على: صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، اختلاج، انخفاض في مستوى الوعي وتصلّب في الرقبة). هذه حالة طوارئ طبية خطيرة، يجب التوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري.

- نزيف دموي مطول أو متزايد.

- ضعف غير اعتيادي، تعب، شحوب، دوار، صداع، انتفاخ غير مفسر، ضيق التنفس، ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (أجينا بيكتوريس).

سيقرر طبيبك ما إذا كان الأمر يتطلب مراقبة عن كثب أو يتطلب تغييرًا في العلاج.

علامات على رد فعل جلدي خطير:

- طفح جلدي كثيف وأخذ في الانتشار على الجلد، حويصلات أو جروح في التسنج المخاطي، مثلًا في الفم أو العينين (Toxic Epidermal Necrolysis / Stevens-Johnson syndrome).

- رد فعل على الدواء يسبب الطفح الجلدي، الحمى، التهاب الأعضاء الداخلية، الشذوذ في الجهاز المنوي والتوكع الجهازى (متلازمة DRESS).

شيوخ هذه الأعراض الجانبية نادر جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000).

- انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط فجائي في ضغط الدم.

تُعتبر درجة شيوخ ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة جدًا (ردود الفعل التأقية، بما في ذلك الصدمة التأقية؛ أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000) وغير شائعة (الوذمة الوعائية والوذمة التحسسية؛ عرضان يظهران عند 1-10 مستعملين من بين 1.000).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

- انخفاض في خلايا الدم الحمراء مما قد يسبب الشحوب، الضعف أو ضيق التنفس

- نزيف دموي في المعدة أو في الأمعاء، نزيف دموي في الأعضاء التناسلية والمسالك البولية (يشمل الدم في البول والنزيف الحيضي المتزايد)، نزيف دموي من الأنف (رعاف)، نزيف دموي في اللثة

- نزيف دموي إلى داخل العين (بما في ذلك نزيف من بياض العين)

- نزيف دموي إلى داخل نسيج أو تجوف في الجسم (ورم دموي داخلي موضعي، رضّة)

- سعال دموي

- نزيف دموي من الجلد أو تحت الجلد

- نزيف دموي بعد عملية جراحية

- تسرب دم أو سائل من جرح جراحي

- انتفاخ في الأطراف

- ألم في الأطراف

- خلل في وظيفة الكليتين (يمكن أن يتم اكتشافه في الفحوص التي يجريها الطبيب)

- حمى

- ألم في البطن، صعوبات في الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال

- ضغط دم منخفض (قد تكون أعراض ذلك دوارًا أو إغماءً عند الوقوف)

- انخفاض عام في القوة والطاقة (ضعف، تعب)، صداع، دوار

- طفح جلدي، حكة جلدية

- قد تشيّر فحوص الدم إلى ارتفاع في إنزيمات معينة في الكبد

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1.000):

- نزيف دموي داخل الدماغ أو داخل القحف (انظر أعلاه، علامات على وجود نزيف دموي)

- نزيف دموي إلى داخل مفصل مما يسبب الألم والانتفاخ

- قلة الصفائح (عدد منخفض لصفائح الدم، وهي خلايا تساهم في تخثر الدم)

- ردود فعل تحسسية، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية في الجلد

- خلل في وظيفة الكبد (يمكن أن يتم اكتشافه في الفحوص التي يجريها الطبيب)

- قد تشيّر فحوص الدم إلى ارتفاع في البيليروبين، في إنزيمات معينة في البنكرياس أو الكبد، أو في عدد صفائح الدم

- إغماء

- شعور عام غير جيد

- نبض متسارع

- جفاف في الفم

- شرى (أورتيكاريا)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10.000):

- نزيف دموي إلى داخل العضلة

- ركود صفراوي (جريان متضائل للمرارة)، التهاب الكبد (هيباتيتيس) بما في ذلك تضرر خلايا الكبد (كبد متهبط يشمل تضررًا كبديًا)

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

- انتفاخ موضعي

- ورم دموي داخلي موضعي (هيماتوما) في الأربية نتيجةً لمضاعفات إجراء قلبي يتم فيه إدخال أنبوب قسطرة إلى شريان في الرجل

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000):

- تراكم البويضات، نوع من خلايا الدم البيضاء المحببة التي تسبب التهابا في الرئتين (التهاب الرئتين البؤبؤيني)

أعراض جانبية مدى شيوخها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوخها بعد):

- فشل كلوي بعد نزيف دموي خطير

- نزيف دموي في الكلية، مصحوب أحيانًا بوجود دم في البول مما يؤدي إلى عدم قدرة الكليتين على العمل كما ينبغي (اعتلال الكلية المرتبط بمضادات التخثر)

- ضغط متزايد في عضلات الرجلين أو الذراعين بعد نزيف دموي، مما يسبب الألم، الانتفاخ، التغيرات في الإحساس، والخدر أو التشلل (متلازمة الحيز بعد نزيف دموي)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التلّيع عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دعونا نعل توفسوت لوزاى علقب טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستشارة المتصلة للتلّيع عن أعراض جانبية، عن عن طريق الدخول إلى الرابط: **https://sideeffects.health.gov.il**

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- لا توجد ظروف خاصة للتخزين. يوصى بحفظه في درجة حرارة الغرفة.

- الأقراص المسحوقة: تكون الأقراص المسحوقة في حالة استقرار في الماء أو في هريس التفاح حتى 4 ساعات.

• لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, hypromellose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, macrogol 3350, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص مطلية مستديرة، لونها أحمر فاتح، محدية من كلا الجانبين ومع إشارة "M" على أحد جانبيها.

حجم العبوة المصادق عليه: 30 قرصًا.

اسم المصنع وعنوانه: مديكيم، إس.إي.بي، برشلونة، إسبانيا.

تم تحرير النشرة في أيلول/سبتمبر 2023 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 172-93-36479-99

من أجل التبسيط ولتسهيل الفزاء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل: دكسل م. ض. شارع دكسل 1، أور عاكيفًا 3060000، إسرائيل