



**כרטיס מידע בטיחותי למטופל בנוגד  
הקרישה ריברוקסבן דקסל<sup>®</sup>  
ריברוקסבן דקסל<sup>®</sup> 2.5 מ"ג  
ריברוקסבן דקסל<sup>®</sup> 10 מ"ג  
ריברוקסבן דקסל<sup>®</sup> 15 מ"ג  
ריברוקסבן דקסל<sup>®</sup> 20 מ"ג**

שא כרטיס זה עימך בכל עת.  
הצג כרטיס זה לכל רופא או רופא שיניים בתחילת הביקור.

## נושא כרטיס זה מטופל בנוגד הקרישה ריבוקסבן דקסל

שם \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_

תאריך לידה \_\_\_\_\_ משקל \_\_\_\_\_

מידע לגבי מחלות ותרופות נלוות \_\_\_\_\_

### מידע לשעת חירום

במקרה חירום אנא הודיעו לרופא המטפל \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_

אנא הודיעו גם ל:

שם \_\_\_\_\_ קרבה משפחתית \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_

טלפון חירום (מרפאה/עזרה ראשונה) \_\_\_\_\_

## מידע על השימוש בתרופה

תאריך התחלת הטיפול \_\_\_\_\_

התוויה \_\_\_\_\_

מינון ומשטר מתן \_\_\_\_\_

תפקוד כלייתי בעת תחילת הטיפול (Creatinine Clearance mL/min)

\_\_\_\_\_

## מידע לצוות הרפואי:

מדידת INR אינה מתאימה להערכת הפעילות האנטיקואגולנטית של

ריבוקסבן דקסל, ולכן אין להשתמש בה למטרה זו.

## מידע אודות נוגדי קרישה והנחיות למטופל

- נוגד הקרישה ריברוקסבן דקסל הינו מדלל דם, המגן עליך מפני היווצרות קרישי דם מסוכנים.
- יש ליטול ריברוקסבן דקסל בדיוק לפי מרשם הרופא. על מנת להבטיח הגנה אופטימלית מפני קרישי דם, יש להקפיד על מועדי הנטילה כפי שהומלץ על ידי הרופא ולא לדלג על אף טבלייה, אלא בהוראת הרופא.
- אין להפסיק את נטילת ריברוקסבן דקסל ללא התייעצות עם הרופא, זאת מאחר שהדבר עלול להגביר את הסיכון שלך להיווצרות קרישי דם.

## נטילה עם מזון:

על מנת להבטיח יעילות מירבית של הטיפול:

- **ריבוקסבן דקסל במינון 20 מ"ג** - חובה ליטול עם מזון.
- **ריבוקסבן דקסל במינון 15 מ"ג** - חובה ליטול עם מזון.
- **ריבוקסבן דקסל במינון 10 מ"ג** - ניתן ליטול עם או בלי מזון.
- **ריבוקסבן דקסל במינון 2.5 מ"ג** - ניתן ליטול עם או בלי מזון.

מומלץ לבלוע את הטבלייה עם מים. אם קשה לך לבלוע את הטבלייה בשלמותה, ניתן לרסק את הטבלייה ולערבב עם מים או מחית תפוחים, מייד לפני נטילתה. במינונים 15/20 מ"ג יש לאכול מייד לאחר נטילת התרופה המרוסקת.

## אם שכחת ליטול ריבוקסבן דקסל בזמן המיועד:

### בעת נטילת ריבוקסבן דקסל 10/15/20 מ"ג:

- במינון של 10/15/20 מ"ג פעם ביום - יש ליטול מנה מייד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה או שתי מנות באותו יום!
- במינון של 15 מ"ג פעמיים ביום – [במהלך שלושת השבועות הראשונים של הטיפול בפקת ורידים עמוקים (DVT) או בתסחיף ריאתי (PE)], יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אין ליטול יותר משתי טבליות של 15 מ"ג ביום אחד. ניתן ליטול שתי טבליות של 15 מ"ג ביחד לקבלת מינון של 30 מ"ג ליום אחד. למחרת היום יש להמשיך וליטול טבלייה אחת של 15 מ"ג פעמיים ביום.

\* בכל מקרה של ספק, יש להתייעץ עם הרופא.

## בעת נטילת ריברוקסבן דקסל 2.5 מ"ג:

- קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.
- ספר לרופא על כל תרופה נוספת שאתה נוטל, שנטלת לאחרונה או שבכוונתך להתחיל ליטול, טרם התחלת הטיפול בריברוקסבן דקסל. הנחייה זו כוללת גם תרופות ללא מרשם (לרבות נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, NSAIDs) ותוספי תזונה.
- טרם ביצוע פעולה כירורגית או פולשנית כלשהי, לרבות טיפולי שיניים, עליך ליידע את הרופא המטפל בך על נטילת ריברוקסבן דקסל.
- בעת נטילת נוגד קרישה כגון ריברוקסבן דקסל, עליך להיות מודע לתופעות הלוואי האפשריות שלו.
  - לרשימה מלאה של תופעת הלוואי, יש לעיין בעלון לצרכן.
  - דימום הוא תופעת הלוואי השכיחה ביותר.
  - אם ידוע לך כי אתה נמצא בסיכון לדימום, אל תחל בנטילת ריברוקסבן דקסל לפני שתדון בכך עם הרופא המטפל בך.

## פנה מייד לרופא אם אתה סובל מסימנים או תסמינים העלולים להעיד על דימום, כגון:

- כאב
- חיוורון
- נפיחות בלתי מוסברת או אי נוחות
- כאב ראש, סחרחורת, עייפות או חולשה יוצאת דופן
- קוצר נשימה
- כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס)
- שטפי דם תת-עוריים חריגים, דימום מהאף, דימום מהחניכיים, דימום מחתכים אשר אינו פוסק במשך פרק זמן ארוך
- דימום נרתיקי או דימום וסתי מוגבר באופן חריג
- דם בשתן שעשוי להיות ורוד או חום; צואה אדומה או שחורה
- שיעול דמי או הקאה של דם או של חומר דמוי גרגרי קפה



## אם אתה מצוי בסיכון מוגבר לדמם, יש לדון בכך/להיוועץ עם הרופא שלך. גורמי סיכון עיקריים לדימום כוללים בין היתר:

- מחלת כליה בדרגה בינונית או חמורה
- הפרעה כבדית
- תרופות המשפיעות על קרישת דם כגון: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, אספירין ונוגדי קרישה אחרים
- יתר לחץ דם חמור בלתי מאוזן
- הפרעות דמם
- מחלה בקיבה או במעי העלולה לגרום לדימום כגון: דלקת המעי או הקיבה, או דלקת בוושט כתוצאה, למשל, ממחלת החזר ושטי-קיבתי
- רטינופתיה
- ברונכיאקטזיות או דימום קודם מהריאה

## גורמי סיכון נוספים לדימום עבור מטופלים בריברוקסבן דקסל 2.5 מ"ג

- גיל 75 שנים ומעלה
- משקל של 60 ק"ג או פחות
- מחלת עורקים כלילית עם כשל לבבי סימפטומטי חמור

## דיווח על תופעות לוואי ו/או פגמי איכות בתכשיר

- ניתן לדווח על **תופעות לוואי** למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

- לדיווח על **תופעות לוואי** ועל **פגמי איכות בתכשיר** יש לפנות לשירות הלקוחות של דקסל:

טלפון: 04-6364016

דואר אלקטרוני: [Customerservice@dexcel.com](mailto:Customerservice@dexcel.com)

למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן. בכל שאלה, אנא פנה/י לרופא המטפל שלך.

אושר ב- 01/2024