

بطاقة معلومات وقائية لمتلقي العلاج بمضاد التخثر ريفاروكسابان دكسل

ريفاروكسابان دكسل 2.5 ملغ

ريفاروكسابان دكسل 10 ملغ

ريفاروكسابان دكسل 15 ملغ

ريفاروكسابان دكسل 20 ملغ

احمل هذه البطاقة معك في كل وقت

اعرض هذه البطاقة على كل طبيب أو طبيب أسنان في بداية الزيارة

- عند تناول مضاد للتخثر مثل ريفاروكسابان دكسل، يجب أن تكون على علم بأعراضه الجانبية المحتملة.
- للحصول على قائمة كاملة بالأعراض الجانبية، يجب قراءة نشرة المستهلك.
- النزيف الدموي هو العرض الجانبي الأكثر شيوعاً.
- إذا كان معلوماً لك أنك معرضٌ لخطر حدوث نزيف دموي، فلا تبدأ بتناول ريفاروكسابان دكسل قبل أن تتحدث ذلك مع الطبيب الذي يعالجتك.

توجه فوراً إلى الطبيب إذا عانيت من علامات أو أعراض قد تشير إلى نزيف دموي، مثل:

- ألم
- شحوب
- انتفاخ غير مفسر أو انزعاج
- صداع، دوام، تعب أو ضعف غير عادي
- ضيق التنفس
- ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (أنجينا بيكتوريس)
- أورام دموية شاذة تحت الجلد، نزيف دموي من الأنف (رعاف)، نزيف دموي من اللثة، نزيف دموي من جروح لا يقطع طوال مدة طويلة
- نزيف دموي مهلبلي أو نزيف دموي حبيضي متزايد بشكل غير عادي
- دم في البول قد يكون وردياً أو بنياً؛ براز أحمر أو أسود
- سعال دموي أو تقيؤ الدم أو مادة شبيهة بحبيبات القهوة

إذا كنت معرضاً لخطر متزايد للنزف، فيجب مباحثة ذلك/استشارة طبيبك. تشمل عوامل الخطر الأساسية لحدوث نزيف دموي، من بين أمور أخرى، على:

- مرض كلوي بدرجة متوسطة أو خطيرة
- اضطراب كبد
- أدوية تؤثر على تخثر الدم مثل: مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، الأسبيرين ومضادات التخثر الأخرى
- فرط ضغط الدم الخطير غير المتوازن
- اضطرابات نزفية
- مرض في المعدة أو في الأمعاء قد يسبب نزيفاً دمويًا مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب المريء نتيجةً مثلًا لمرض الارتجاع المعدي المريئي
- اعتلال الشبكية
- بروتينكتازيس (توسع القصبات) أو نزيف دموي سابق من الرئة

عوامل خطر إضافية لحدوث نزيف دموي لدى متلقي العلاج بريفاروكسابان دكسل 2.5 ملغ

- عمر 75 عامًا فما فوق
- وزن الجسم 60 كغم أو أقل
- مرض الشرايين التاجية مع فشل قلبي خطير مصحوب بالأعراض

التبليغ عن الأعراض الجانبية و/أو عيوب الجودة في المستحضر

- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دיוون عل توفעות لوزا، كلب تيفول ترفوتني" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>
- للتبليغ عن الأعراض الجانبية وعن عيوب الجودة في المستحضر يجب التوجه إلى خدمة العملاء في دكسل: رقم الهاتف: 04-6364016
- البريد الإلكتروني: Customerservice@dexcel.com

للحصول على معلومات إضافية يجب قراءة نشرة المستهلك. لطرح أي سؤال، يرجى مراجعة طبيبك المعالج.
صودق عليها في 01/2024

حامل هذه البطاقة يتلقى العلاج بمضاد التخثر ريفاروكسابان دكسل

الاسم _____
العنوان _____
تاريخ الولادة _____ الوزن _____
معلومات عن أمراض وأدوية إضافية _____

معلومات لوقت الطوارئ

في حالة الطوارئ أخبروا رجاءً الطبيب المعالج _____
الهاتف _____

رجاءً أخبروا أيضاً:

الاسم _____ القرابة العائلية _____
الهاتف _____
هاتف الطوارئ (العبادة/الإسعاف الأولي) _____

معلومات عن استعمال الدواء

تاريخ البدء بالعلاج _____
داعي الاستعمال _____
الجرعة الدوائية ونظام الإعطاء _____
الوظيفة الكلية عند البدء بالعلاج _____
(Creatinine Clearance mL/min) _____

معلومات للطاقم الطبي:

قياس INR غير مناسب لتقييم فعالية ريفاروكسابان دكسل المضادة للتخثر، ولذلك لا يجوز استخدامه لهذا الغرض.

معلومات عن مضادات التخثر وإرشادات لمتلقي العلاج

- مضاد التخثر ريفاروكسابان دكسل عبارة عن مميع للدم، بحميك من تكون خثرات دموية خطيرة.
- يجب تناول ريفاروكسابان دكسل حسب وصفة الطبيب بالضبط. من أجل ضمان الحماية المثالية من الخثرات الدموية، يجب الحرص على مواعيد تناول كما أوصى بها الطبيب، وعدم تخطي أي قرص، إلا بأمر من الطبيب.
- لا يجوز إيقاف تناول ريفاروكسابان دكسل دون استشارة الطبيب، وذلك لأن هذا الشيء قد يزيد من خطر تكون خثرات دموية لديك.

التناول مع الطعام:

من أجل ضمان الفعالية القصوى للعلاج:

- ريفاروكسابان دكسل بجرعة 20 ملغ - من الواجب تناوله مع الطعام.
- ريفاروكسابان دكسل بجرعة 15 ملغ - من الواجب تناوله مع الطعام.
- ريفاروكسابان دكسل بجرعة 10 ملغ - يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه.
- ريفاروكسابان دكسل بجرعة 2.5 ملغ - يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه.

يوصى ببلع القرص مع الماء. إذا استصعبت بلع القرص بشكله الكامل، فيمكن سحق القرص وخلطه مع الماء أو هريس التفاح، مباشرة قبل تناوله. بالنسبة للجرعتين الدوائيتين 15/20 ملغ، يجب تناول الطعام فوراً بعد تناول الدواء المسحوق.

إذا نسيت تناول ريفاروكسابان دكسل في الوقت المحدد:

عند تناول ريفاروكسابان دكسل 10/15/20 ملغ:

- عندما تكون الجرعة الدوائية 10/15/20 ملغ مرة واحدة في اليوم - فيجب تناول جرعة فور تذكرك، لكن لا يجوز تناول جرعة مضاعفة أو جرعتين في نفس اليوم بأي حال من الأحوال!
- عندما تكون الجرعة الدوائية 15 ملغ مرتين في اليوم - (خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من علاج الخثار الوريدي العميق (DVT) أو الانصمام الرئوي (PE)) فيجب تناول جرعة فور تذكرك. لا يجوز تناول أكثر من قرصين من 15 ملغ في يوم واحد. يمكن تناول قرصين من 15 ملغ سويًا للحصول على جرعة دوائية من 30 ملغ في يوم واحد. في الغد يجب الاستمرار في تناول قرص واحد من 15 ملغ مرتين في اليوم.

عند تناول ريفاروكسابان دكسل 2.5 ملغ:

- تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية.
- * في أي حالة من الشك، يجب استشارة الطبيب.
- أخبر الطبيب عن أي دواء إضافي تتناوله، أو تناولته مؤخرًا، أو تتويى البدء بتناوله، قبل البدء بالعلاج بريفاروكسابان دكسل. يشمل هذا الإرشاد أيضًا الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبيب (بما في ذلك مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، NSAIDs) والإضافات الغذائية (المكملات).
- قبل إجراء أي عملية جراحية أو غزوية، بما في ذلك علاجات الأسنان، عليك إعلام الطبيب الذي يعالجتك بأنك تستعمل ريفاروكسابان دكسل.