

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

טנופובייר טבע טבליות מצופות

חומר פעיל

כל טבלייה מצופה מכילה:

Tenofovir Disoproxil (as fumarate) 245 mg

טנופובייר דיסופרוקסיל (כפומארט) 245 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגנים ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתחם בתרופה זו, מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב עבורך. עלון זה מכיל מידע חיוני על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור את העalon הזה, יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב. תרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה לשולך. אם אתה חש בתופעות לוואי פנה לרופא או לרוקח, גם אם אתה חש בתופעות לוואי שאין מוזכרות בעalon (ראה סעיף 4).

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אם טנופובייר טבע נרשמה ליילדך, אנא שים לב כי כל המידע בעalon זה מיועד ליילדך (במקרה זה קרא "ילדך" במקומם "אתה/הינך").

1. למה מיועדת התרופה?

- טנופובייר טבע מיועד לטיפול ב- HIV (נגיף כשל חיסוני אנושי) במבוגרים ובילדים מגיל 12 שנים ומעלה.
- טנופובייר טבע משמש גם לטיפול בהפטיטיס C כרונית, זיהום בגין הפטיטיס B (HBV) במבוגרים. לא ידוע אם טנופובייר טבע בטוח ויעיל לטיפול בגין הפטיטיס B בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

קבוצה רפואייתית:

תרופה נגדת נגיפים לשימוש סיטמי; מעכבי ריאוורס טרנסקריפטאז נוקלאוזידים ונוקלאוטידים (nucleoside reverse transcriptase inhibitor)

טנופובייר טבע מכיל את החומר הפעיל טנופובייר דיסופרוקסיל (tenofovir disoproxil). חומר פעיל זה הינו אנטירטרויראלי או נוגד נגיפי רטרו אשר מיועד לטיפול בווירוס HIV, HBV או שניהם יחדיו. טנופובייר הינו מעכב ריאוורס טרנסקריפטאז נוקלאוטידי, המוכר כ- NRTI ופועל דרך התערבות בפעולות התקינה של אנזימים (טראנסקרייפטאז הופכי-ב- HIV; DNA פולימראז בהפטיטיס B), אשר הכרחיים לשכפול הנגיפים עצמם. במקרה של HIV, יש ליטול טנופובייר טבע תמיד בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בווירוס HIV. אין חובה שהיא לך HIV כדי לקבל טיפול בטנופובייר טבע עבור HBV.

תרופה זו אינה מרפא HIV. בתקופת הטיפול בטנופובייר טבע אתה עלול לפתח זיהומים או מחילות אחרות הקשורות ל- HIV. היןך גם יכול עדין להעביר HIV או HBV לאחרים, لكن חשוב לנקט במשנה זהירות כדי להימנע מהדבקת אנשים אחרים.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי לטנופובייר, טנופובייר דיסופרוקסיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים של התרופה זו הרשומים בסעיף 6.

אם המצב לעיל חל לך, ספר לרופא מיד ולא תיטול בטנופובייר טבע.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופת:

טנופוביר טבע אינו מפחית את הסיכון להעברת HBV לאחרים דרך מגע מיינ או דם מזוהם. אתה חייב להמשיך לנוקוט אמצעי זהירות כדי למנוע זאת.

יש להיוועץ ברופא או ברוחק לפני נטילת טנופוביר טבע.

- אם הייתה לך מחלת כלניות, או אם בבדיקות נמצאו בעיות כלניות. אין לחת טנופוביר טבע למתרגרים שקיימות אצלם בעיות כלניות. לפני תחילת הטיפול הרופא עשוי להפנות לבדיקות דם כדי להעיר את תפקוד הכלניות שלך. טנופוביר טבע עשוי לפגוע בכלניות במהלך הטיפול. הרופא עשוי להפנות לבדיקות דם במהלך הטיפול כדי לעקוב אחר תפקוד הכלניות שלך. אם אתה מבוגר, הרופא עשוי להמליץ שתיטול את התרופות בתדרות נמוכה יותר. אל תפחית את המינון הרשות, אלא אם כן הרופא אמר לך לעשות זאת.

בדרכ כלל לא נוטלים טנופוביר טבע יחד עם תרופות אחרות העולות לפגוע בכלניות (ראה "תרופות אחרות וטנופוביר טבע"). אם הדבר בלתי נמנע, הרופא יעקוב אחר תפקוד כלניות פעם בשבוע.

- אם הנך סובל מאוסטואופורוזיס, יש לך היסטוריה של שברים בעצמות או אם הנך חווה בעיות בעצמות שלך בעצמות (המתבטאות ככאבי עצמות מתמשכים או מחמיירים ולעיתים גורמות לשברים) עלולות להופיע גם בגל נזק לתא אבובי הכליה (ראה בסעיף 4 "טופעות לוואי"). ספר לרופא שלך אם אתה חווה כאבי עצמות או שברים.

טנופוביר דיסופרואקסיל עלול גם להביא לירידה במסת עצם. הביטוי המשמעותי בירידה כתוצאה מסת עצם נצפה בניסויים קליניים כאשר מטופלים טיפולו בטנופוביר דיסופרואקסיל בשילוב עם מעכבר פרוטיאז עם מאיצ'.

באופן כללי, ההשפעות של טנופוביר דיסופרואקסיל על בריאות עצם לטווח ארוך ועל סיכוי עתידי לשברים במבוגרים ובמטופלים צעירים אין ודאות.

חלק מהמטופלים הבוגרים עם HIV הנוטלים טיפול אנטירטרוירלי משולב עלולים לפתח מחלת עצמות הנקרatte אויסטואונקרוזיס (מוות של רקמת עצם הנגרמת על-ידי אובדן אספקת דם לעצם). משלך הטיפול האנטירטרוירלי המשולב, שימוש בקורטיקוסטורואידים, צריכת אלcoleול, דיכוי חיסוני חמוץ, אינדיקס מסת גוף גבוהה יותר, בין השאר, עלולים להוות חלק מהרבה גורמי סיכון לפיתוח מחלת זו. הסימנים של אויסטואונקרוזיס הינם קשיין ממפרקים, כאבים ומיחושים (ביחוד של הירך, הברכ והכתף) וקשישים בתנועה. אם הנך מבחין בכל אחד מהסתמים, ספר לרופא שלך

- שוחח עם הרופא אם יש לך מחלת כבד, כולל דלקת כבד. מטופלים עם מחלת כבד כולל דלקת כבד כרונית מסוג B או C, המטופלים בתרופות נוגדות נגיפי רטרו, נתונים בסיכון גבוה יותר לסיבוכי כבד חמומיים ואף מסכני חיים. אם הנך סובל מדלקת כבד מסוג B, יתכן ורופא ישකול בהAIRות את הטיפול המיטבי עבורך. אם יש לך היסטוריה של מחלות כבד או דלקת כבד כרונית מסוג B, יתכן ורופא יערוך לך בדיקות דם כדי לנטר את תפקודי הכבד שלך.

- היזהר מזיהומים. אם יש לך זיהום מתקדם ב-HIV (איידס) ויש לך זיהום, עם תחילת הטיפול בטנופוביר טבע עלולים להתפתח אצלך תסמיני זיהום ודלקת או עלולים להחמיר אצלך תסמים נשל זיהום קיימים. תסמים אלה עשויים להיעיד עלך שתפקיד מערכת החיסון השתפר והוא נלחמת בזיהום. מיד לאחר התחלת נטילת טנופוביר טבע עליך לשים לב להופעת סימני דלקת או זיהום. אם תבחן בסימן כלשהו לדלקת או לזרימת דוחה מיד לרופא.

לאחר תחילת נטילה של תרופות לטיפול בזיהום ב- HIV, בנוסף לזריהם מזדמנים, עלולות להופיע גם מחלות אוטואימוניות (מצב שבו מערכת החיסון תוקפת רקמות בריאות בגוף). מחלות אוטואימוניות עלולות להתפתח חודשים רבים לאחר תחילת הטיפול. אם תבחן בתסמים כלשהם של זיהום או בתסמים אחרים כגון חולשת שרירים, חולשה המתחילה בכפות הידיים והרגליים ומתרפעת מעליה

לכיוון הago, דפוקות לב, רעד או פעילות יתר (היפראקטיביות), הודיע על כך מיד לרופא כדי לקבל את הטיפול הנוכחי.

- **ספר לרופא או לרוקח אם גילך מעל 65 שנים.** טנוfovיר לא נבדק במטופלים שגילם מעל 65 שנים. אם גילך מעל 65 ונרשם לך טנוfovירطبع, הרופא יעקוב אחריך בקפידה.

תרופות אחרות וטנוfovירطبع

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על לך לרופא או לרוקח.**

• אם יש לך גם HBV וגם HIV והינך מתחילה ליטול טנוfovירطبع, **אל תפסיק ליטול כל תרופה נגד HIV** שנרשם לך הרופא.

• **אל תיטול טנוfovירطبع** אם אתה כבר נטל תרופות אחרות המכילות טנוfovיר דיספרוקסיל או טנוfovיר אלפנמייד. אל תיטול טנוfovירطبع ביחד עם תרופות המכילות אדפוביר דיפיבוקסיל (תרופה המשמשת לטיפול בדלקת CBD כרונית מסוג B).

- **חשוב במיוחד לרופא אם אתה נטל תרופות אחרות העולמות לפגוע בклיות, בינה:**

- אמיגליקוזידים, פנטמידין או נקומייצין (טיפול בziehom חידקי)
- אמפורריצין B (טיפול בziehom פטריתית)
- פוסקרנט, גנטילוביליר, סידופובייר (טיפול בziehom נגיי)
- אינטראוקין-2 (טיפול בסרטן)
- אדפובייר דיפיבוקסיל (טיפול ב-HBV)
- טקרולימוס (לדייכו מערכת החיסון)
- תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (SAsNs, לשיכוך כאבי עצמות או כאבי שרירים).

• **תרופות אחרות המכילות דידנויזן (טיפול בziehom ב-HIV):** נטילת טנוfovירطبع עם תרופות נוגדות נגיפים אחרות המכילות דידנויזן עלולה להעלות את רמות הדידנויזן בدم ועלולה להפחית את ספירת תא CD4. לעיתים נדירות דוח על דלקת של הלבלב וחמצת לקטית (עודף של חומצה לקטית בדם), שלפעמים גרמה למומות, בעת נתילה בו-זמןית של תרופות המכילות טנוfovיר דיספרוקסיל ודידנויזן. הרופא ישקוע בקפידה האם לטפל בר בשילוב של טנוfovיר ודידנויזן.

- כמו כן חשוב לרופא אם אתה לוקח לדיפסיביר/סופוסוביר, סופוסוביר/ולפטסיביר או סופוסוביר/ולפטסיביר/ווקסילפרבר לטיפול בדלקת הפטיטיס C.

נטילת טנוfovירطبع עם מזון ומשקלה:
יש ליטול טנוfovירطبع עם מזון (למשל, ארוחה או חטייף).

הירין והנקה:

אם הינך הרה או מניקה, חושבת שיתכן שתת הרה, או מתכוונת להרהור, היועץ לרופא או ברוקח לפני נטילת התרופה.

- **אם נטילת טנוfovירطبع במהלך ההירון, יתכן שהרופא יבקש מך לעבור בדיקות דם שוטפות ובדיקות אבחון אחרות כדי לנטר את התפתחותה לךך. בילדים שאמהותיהם נטלו בהירון תרופות מסווג מעכבי ריוורס טראנסקריפטאז נוקלאוטידי (sofisatinib) (NRTIs, nucleotide reverse transcriptase inhibitor)** התועלת מהאגנה מפני נגיף ה-HIV עלתה על הסיכון לתופעות לוואי.
- **במידה ואתם נשאית HBV ולתינוקך ניתן טיפול למניעת העברת הפטיטיס B במהלך הלידה, הינך יכולה להניך את תינוקך אך ראשית שוחחי עם הרופא שלא קיבל מידע נוסף.**
- **הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם HIV כיוון שziehom ה-HIV עלול לעבור לתינוק בחלב האם. אם הינך מניקה או שוקלת הנקה, עליך להיוועץ לרופא שלך בהקדם האפשרי.**

נהיגה ושימוש במכונות:

טנופוביר טבָע עולל לגורם לשחרחות. אם אתה חש סחרחות בעת נטילת טנופוביר טבָע, אין לנו גו או לרכיב על אופנים ואין להפעיל כלים או מכונות מסוכנים.

ילדים ותבוגרים

טבָליות טנופוביר טבָע מתאימות עברו:

- מתבוגרים עם זיהום ב-**1-HIV** בני 12 עד פחות מ-18 שנים השוקלים לפחות 35 ק"ג.

טנופוביר טבָע אין מתאים לקבוצות הבאות:

- לא לילדים עם זיהום ב-**1-HIV** מתחת לגיל 12 שנים
- לא ילדים עם זיהום ב-**HIV** מתחת לגיל 18 שנים

מידע לגבי מינון מופיע בסעיף 3, "כיצד תשתמש בתרופה".

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- טנופוביר טבָע מכיל לקטוז. היועץ ברופא לפנֵי נטילת טנופוביר טבָע אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך אי-סבלות לsockרים כלשהם, פנה לרופא שלך לפנֵי נטילת התרופה זו.
- תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן בטבְיליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתכשיר תמיד להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- לטיפול ב-**1-HIV** או ב-**HBV** במוגרים: טבְליה אחת מדי יום עם מזון (למשל, ארוחה או חטיף).
- לטיפול ב-**1-HIV** במתבוגרים בני 12 עד פחות מ-18 שנים השוקלים לפחות 35 ק"ג: טבְליה אחת מדי יום עם מזון (למשל, ארוחה או חטיף).

אין לעבר על המנה המומלצת.

יש לקחת את התרופה פעמיים ביום, עם כוס מים, עם אוכל. אין לחצות בהיעדר קו חציה.

במקרה של קושי מיוחד בטבְיליה, אפשרות לרסק את הטבְיליה באמצעות קצחה הכפית. לאחר מכן ערבע את האבקה בכ- 100 מ"ל (חצי כוס) מים, מיץ תפוזים או מיץ ענבים, ושתה מייד.

- יש ליטול תמיד המינון שעליו המליך הרופא. קר תזודא שהתרופה שלך תועל, ובכך תפחת את הסיכון להתקפות עמידות לטיפול. אל תנסה את המינון ללא הוראה מהרופא.
- אם אתה מבוגר ויש לך בעיות בכליות, יתכן שהרופא ימליך לך ליטול טנופוביר טבָע בתדירות נמוכה יותר.
- אם יש לך HBV יתכן שהרופא יציין לך ליטול הנטילה של תרופה נגדות נגיף רטרו אוחרות, עיין בעלונים לצריך של תרופות אלה.

בדיקות ומעקב

לטנופוביר טבָע יכול להיות השפעה על הכליות. לפני תחילת השימוש בתרופה הרופא יפנה אותך לבדיקות דם, על מנת להעיר את תפקוד הכליות והכבד.

בתקופת הטיפול בתרופה זו, מומלץ לבצע בדיקות דם להערכת תפקוד הכליות, ובהתאם לתוצאות, הרופא המטפל עשוי להורות לך ליטול טנופוביר טבָע 245 מ"ג בתדירות נמוכה יותר. עיין גם בסעיף 2 "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה", סעיף 3 "אם יש לך דלקת כבד מסווג B או HIV ודלקת כבד מסווג B בידך (זיהום מקביל)" ובסעיף 4 "תופעות לוואי".

אם נטלה טנופובייר טבע במינון גובה מהנדרש

אם נטלה בטיעות יותר מדי טבליות טנופובייר טבע, יתכן שתהיה נתון בסיכון מוגבר לחווות תופעות לוואי אפשריות עם תרופה זו (ראו בסעיף 4 "תופעות לוואי"). אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלע ייל'ך מן התרופה, צור קשר עם הרופא או חדר המין הסמור והיוועץ בהם. הבא את בקבוק הטబליות עמך כדי שתוכל לתאר במדויק מה נטלה.

אם שכחת ליטול טנופובייר טבע

חשוב לא להחמיר ממנה של טנופובייר טבע. אם החמצת ממנה, חשוב כמה זמן עבר מאז שהיית צריכה ליטול אותה.

- **אם עברו פחות מ- 12 שעות** משעת הנטילה הרגילה, יש ליטול את התרופה בהקדם האפשרי, אז ליטול את המנה הבאה בשעה הרגילה.

- **אם עברו יותר מ- 12 שעות** מאז שאתה צריכה ליטול את התרופה, התעלם מהמנה שנשכחה. המתן וטיפול את המנה הבאה בשעה הרגילה. אל תיטול ממנה כפולה כדי לפצות על טבליה שנשכחה.

אם הקאתת תוך פחות משבוע אחת אחרי נטילת טנופובייר טבע, יש ליטול טבליה נוספת. אם הקאתת תוך יותר משבוע אחת אחרי נטילת טנופובייר טבע, אין צורך ליטול טבליה נוספת.

אם הינך מפסיק ליטול טנופובייר טבע אין להפסיק ליטול טנופובייר טבע בלי להתייעץ עם הרופא. הפסקת הטיפול בطنופובייר טבע עלולה להפחית את עילוות הטיפול שעליו המליץ הרופא.

אם יש לך דלקת כבד מסוג B או HIV ודלקת כבד מסוג B ביחד (זיהום מקביל), חשוב מאד לא להפסיק את הטיפול בطنופובייר טבע בלבד להיוועץ קודם ברופא. אצל חלק מהחולים שהפסיקו ליטול את התרופה הופיעה החמרה בדלקת הכבד שניצפהה בבדיקות דם או בתסמינים שחוו החולים. אחרי הפסקת הטיפול יתכן שהייה צורך לבצע בדיקות דם במשך מספר חודשים. לחلك מהמתופלים עם מחלת כבד מתקדמת או שחמת כבד לא מומלץ להפסיק את הטיפול, מכיוון שהפסקת הטיפול עלולה לגרום להחמרה דלקת הכבד.

- **שוחח עם הרופא לפני שתפסיק ליטול טנופובייר טבע מסיבה כלשהי,** במיוחד אם אתה חוות תופעות לוואי כלשהן או אם יש לך מחלת נוספת.
- **ספר מייד לרופא על תסמינים חדשים או לא רגילים שהופיעו אחרי שהפסיק את הטיפול,** במיוחד תסמינים שאתה מקשר לזיהום בדלקת כבד מסוג B.
- **פנה לרופא לפני שתתחל ליטול שוב טబליות טנופובייר טבע.**

אין ליטול תרופות בחושרי בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהוא נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

במהלך טיפול ב- HIV תיתכן עלייה במשקל וברמות השומנים והגלוקוז בدم. הדבר קשור בחלקו לשיקום הבבリアות וסגנון החיים, ובמקרה של שומנים בדם לעיתים הדבר קשור בתרופות ל- HIV עצמן. הרופא יערוך בדיקות כדי לאთר את השינויים האלה.

כמו בכל תרופה, השימוש בטנופובייר טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחות מהן.

תופעות לוואי חמורות אפשריות: ספר מייד לרופא

חמצת לקטית (עדף חומצת לקטית בدم) היא תופעת לוואי נדירה (עלולה לפגוע ב- עד למטרול אחד מתוך כל 1,000 מטופלים) אך חמורת העוללה להיות קטלנית. תופעות הלואוי הבאות עלולות להיות סימנים להופעת חמצת לקטית:

- נשימה עמוקה ומהירה
- ישנווניות

○ בחלות, הקאות וכאבי בטן

אם אתה סבור שייתכן שיש לך חמצת לקטית, פנה מיד לרופא.

תופעות לוואי חמורות אפשריות אחרות

תופעות הלואוי הבאות אינן שכיחות (הן עלולות לפגוע ב- עד מטופל אחד מתוך כל 100 מטופלים):

- כאבים בבטן הנגרמים מדלקת של הלבלב
- נזק לתאי אבוביtes הכליה

תופעות הלואוי הבאות הין נדירות (עלולות לפגוע ב- עד מטופל אחד מתוך כל 1,000 מטופלים):

- דלקת של הכליות, השתנה מרובה וצימאון
- שינויים בשתן וכאבי גב שנגרמים כתוצאה מבעיות בכליות, כולל אי ספיקת כליות
- התרככות העצמות (המלחואה בכאבי עצמות, לעיתים מ对照检查 זה גורם לשברים), העולוה להופיע עקב נזק לתאי אבוביtes הכליה
- כבד שומני

אם אתה סבור שהופיעה אצלך אחת מתופעות הלואוי החמורות האלה, ספר לרופא.

תופעות לוואי שכיחות ביותר

תופעות הלואוי הבאות הין שכיחות מאוד (עלולות לפגוע ב- 10 מטופלים לפחות מתוך כל 100 מטופלים):

- שלשלולים, הקאות, בחילות, סחרחות, פריחה, תחושת חולשה

יתכן שבבדיקות יראו גם:

- ירידה ברמת הזרchan בدم

תופעות לוואי אפשריות אחרות

תופעות הלואוי הבאות שכיחות (עלולות לפגוע ב- עד 10 מטופלים מתוך כל 100 מטופלים):

- כאב ראש, כאב בטן, תחושת עייפות, תחושת נפיחות, גזים בבטן, אובדן מסת עצם

יתכן שבבדיקות יראו גם:

- בעיות כבד

תופעות הלואוי הבאות אינן שכיחות (עלולות לפגוע ב- עד מטופל אחד מתוך כל 100 מטופלים):

- פירוק שרירים, כאבי שרירים או חולשת שרירים

יתכן שבבדיקות יראו גם:

- ירידה ברמות האשלגן בدم
- עלייה ברמות הקריאטינין בدم
- בעיות בלבלב

פירוק שריר, התרככות של העצמות (המלחואים בכאבי עצמות, לעיתים מ对照检查 זה גורם לשברים), כאבי שרירים, חולשת שרירים וירידה ברמות האשלגן או הזרchan בדם עלולים להופיע עקב נזק לתאי אבוביtes הכליה.

תופעות הלואוי הבאות הין נדירות (עלולות לפגוע ב- עד למטופל אחד מתוך כל 1,000 מטופלים):

- כאבים בבטן הנגרמים כתוצאה מדלקת של הכבד
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כנסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדוח על תופעות הלואין ישירות לבעל הרישום באמצעות כתובת המייל:

Safety.Israel@tevapharm.com

תוכל לעזור לספק מידע נוסף על בטיחות התרופה באמצעות דיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנع הרעלת!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ לטווח ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה זו אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C**
- **ניתן להשתמש בתרופה עד 60 יום** לאחר פתיחת הבקבוק **לאראשונה ולא יאוחר מהתאריך התפוגה.**
- **שים לב:** הבקבוק מכיל סופח לחותה. אין לבלוע! יש להשאיר את הסופח בתוך הבקבוק ולסגור היטב את הבקבוק לאחר כל שימוש!
- אל תשליך תרופות לביבות או לאשפפה הביתיית. יש להיוועץ ברוקח כיצד להשילר תרופות שאינן משתמש בהן עוד. אמצעים אלה יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Polyvinyl alcohol (E1203), Colloidal anhydrous silica, Titanium dioxide (E171), Macrogol (E1521), Talc, Indigo carmine aluminium lake, Carmine (E120).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
צורת הטבלייה: טבליה מוארכת בצבע תכלת עד כחול, מצופה. בצדיה האחד של הטבליה מופיע '93' ובצדיה الآخر מופיע '7104'.
האריזה מכילה בקבוק ובו 30 טבליות.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו: טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 150.91.33867
עלון זה נערך במאי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.