



מאי 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבע מודיעעה על העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר הבא:

Tenofovir Teva

טנוfovיר טבע

Contains: TENOFOVIR DISOPROXIL (AS FUMARATE) 245 mg

עדכונים בעליון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Indicated for the treatment of :

1. HIV 1 infected adults and pediatric patients 12 years of age and older in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of HIV.

2. Chronic hepatitis B in adults with:

- Compensated liver disease, with evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active inflammation and/or fibrosis.
- Decompensated liver disease..

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלහן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום והסרות מיידע בטקסט מוחק):

ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת טנוfovיר טבע.

• **אם הנך סובל מאוסטיאופורוזיס, יש לך היסטורייה של שברים בעצמות או אם הנך חווה בעיות בעצמות של בעצמות. אצל חלק מהמטופלים המבוגרים עם HIV הטיפול טיפול משולב נגד גיאופרטרו עלולה להתפתח מחלת עצם הנקריאת ונק עצם (או אוסטיאונקררוזיס) מוחת של רקמת עצם הנגראט כתוצאה מאובדן אספקת דם לעצם). בין גורמי הסיכון האפשריים הרבים להתפתחות מחלת זו ניתן למנות את משך הטיפול המשולב נגד גיאופרטרו, שימוש בקורטיקוסטרואידים, צריכת אל Kohol, דיכוי-חיסוני חמוץ ועליה במקצת מסת הגוף. טמני ונק העצם כולל נזקשות מפרקית, כאבים ומיחושים (במיוחד בירך, בברך ובכתף) וקשישות. אם תבחן באחד מהתסמינים הללו ספר לרופא שלך.**

חלק מהמטופלים הבוגרים עם HIV הנותלים טיפול אנטירטרווריאלי משולב עלולים לפתח מחלת עצמות הנקריאת או אוסטיאונקררוזיס (מוות של רקמת העצם הנגראת על-ידי אובדן אספקת דם לעצם). משך הטיפול האנטיטרווריאלי המשולב, שימוש בקורטיקוסטרואידים, צריכת אל Kohol, דיכוי-חיסוני חמוץ יותר, בין השאר, עלולים להוות חלק מהרבה גורמי סיכון לפיתוח מחלת זו. הסימנים של אוסטיאונקררוזיס הינם קשיין מפרקים, כאבים ומיחושים (במיוחד של הירך, הברך והכתף) וקשישים בתנועה. אם הנך מב奸 בכל אחד מהתסמינים, ספר לרופא שלך ספר לרופא שלך אם ידויך לך אחת מבעיות המופיעות. מטופלים עם אוסטיאופורוזיס נמצאים בסיכון מוגבר לשבריט.



[...]

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי אפשריות אחרות

תופעות הלוואי הבאות שכיחות (עלולות לפגוע ב- עד 10 מטופלים מתוך כל 100 מטופלים):

- כאב ראש, כאב בטן, תחושת עייפות, תחושת נפיחות, גזים בטן, **אובדן מסת עצם**.

העלון לצריכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות
וניתן לקבללו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.
<https://israeldrugs.health.gov.il>