

עלון לצרכנית לפי תקנות הרווקטים (תקנירט) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד בלבד

הרמוני
טבליות מצופות™

כל טבילה מצופה מכילה:
 אתיינילאסטרדיול 0.02 mg
 ethinylestradiol 0.02 mg
 גסטודן 0.075 mg
 gestodene 0.075 mg
 גסטודן 0.075 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראי סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספים".
קראי בעין את העلون עד סופו בטרם שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנו אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעבורי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

הרמוני הינו תכשיר למניעת הריון השיר לקבוצת תרופות המכונה "галולות למניעת הריון".
 כל אחת מהטבליות מכילה שני הורמוניים נקיים, אסטרוגן (אתיינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (גסטודן).
קבוצה רפואיית: גלולות מושובות למניעת הריון, שיLOB של אסטרוגן ופרוגסטוגן.

מספר דברים חשוב לדעת על אמצעי מניעה הורמוניים מושובים:

- כאשר נוטלים אותם בצוරנו נוכנה, אמצעי מנעה הורמוניים מושובים הם אחת השיטות ההיפוכות האמינות ביותר למניעת הריון.
- הם מעלים מעט את הסיכון לפקקת (קרישי דם) בורידים ובעורקים, במיוחד בשנה הראשונה או בנטילה חוזרת לאחר הפקקה של 4 שבועות או יותר.
- עליך להיות עירני וլפנות לרופא אם את חוששת כי ינרך סובל מתסמים של קריש דם (ראי פרק 2, "הרמוני ופקקת (קרישי דם)").

2. לפני שימוש בתרופה

לפני שאת מתחילה ליטול הרמוני עליך לקרוא את המידע על פקקת (קרישי דם) בפרק 2. חשוב במיוחד לקרוא את החלק של התסמים של פקקת (ראי פרק 2, "הרמוני ופקקת (קרישי דם)").

אין להשתמש בתרופה אם:

הין נתונה באחד מהנסיבות הבאים. במקרה בו יש לך אחד מהמצבים המופיעים מטה לעיל'ך לספר עלך לרופא.
הרופא שלך ידוע איתך על אמצעים אחרים למניעת הריון אשר מתאימים יותר עבורך. אם אחד המצבים מופיע לראשונה בזמן השימוש בהרמוני, יש לפנות לרופא מייד.

- | |
|--|
| את רגשה (אלרגיה) לאתיינילאסטרדיול או לגסטודן או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בפרק 6). |
| יש לך או אי פעם היה לך קריש דם בכל דם ברגל (פקקת ורידים عمוקה, DVT), בריאה (טסחיף ריאתי, PE), בעיניים או בכל איבר אחר (ראי "הרמוני ופקקת (קרישי דם)".) |
| ידע לך כי הין סובל מהפראה בקרישת הדם, למשל חסר בחלבון C, חסר בחלבון S, חסר באנטי תромבי III, מוטציה בפקטור 5 לייזן או נוכחות נוגדים אנטיפוסופליידיים. |
| הין עומדת בפניה ניתן או אם הין עתידה להיות במצב של חסר תנועה ממושך (ראי "הרמוני ופקקת (קרישי דם)".) |
| אי פעם היה לך לב או שbez (CVA). |
| יש לך או אי פעם היה לך סוג של מיגרנה המכונה "מיגרנה עם אורה" (עם תחושה לא רגילה, למשל הבזקי אוור). |
| את סובל מהפראות במסתמי הלב או בקצב הלב. |
| יש לך או אי פעם היה לך תעוקת חזזה (מצב הגורם לכאב חזק בחזה ויכול להיות סימן ראשוני להתקף לב) או התקף איסכמי חולף (AIA – תסמנין שבע זמינים). |
| יש לך אחת מהמלחמות הבאות אשר עלולות לגרום את הסיכון להיווצרות קריש דם בעורקים: |
| <ul style="list-style-type: none"> - סוכרת חמורה עם נזק לכליה דם - לחץ דם גבוה מאוד - רמות גבוהות של שומנים בדם (コレsterol וטריגליקידים) - מצב של יתר הומואיסטיין |
| יש לך או אי פעם היה לך סרטן או חсад לסרטן דם, סרטן ברחם או סרטן בכבד (ראי "галולות למניעת הריון וسرطان"). |
| יש לך מחלת כבד חמורה. עד שתפקיד הכבד עדין לא חזק למצב תקין. |
| יש לך דימום בלתי מוסבר מהортיק. |
| אם את בהריון או חושבת שיתokin שאתה בהריון. |
| יש לך או אי פעם היה לך דלקת של הלבלב, שנמצאה קשורה לעלייה חמורה ברמת השומנים בדם. |

אל תשתמש בהרמוני אם יש לך הפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית), ואת נוטלת תרופות המכילות שיLOB של אומבריטאסואיר/פאריטאפרור/or/רטינאטור, דאסאכטואיר, גלקפרא/or/פיברנטטסואיר או סופוסובור/or/ולפטסוא/or/וקסילפרור/or (ראי גם "תרופות אחרות והרמוני").

יש לפנות לטיפול רפואי מייד:

- אם הבדיקה בתסמיינים אפשריים לקריש דם היכולם להעיד על כך שאת סובלת מקריש דם ברגל (כלהמר מפקחת ורידים عمוקה), מקריש דם בריאה (טסחיף ריאתי), מהתקף לב או שbez (ראי "הרמוני ופקחת (קרישי דם").

למייד על התסמיינים לתופעות לוואי חמורות אלו ראי פרק 2 "אריך להזות תסמינים של קריש דם".

אם הינך סובלת מחד או יותר מהמצבים הבאים מפתחת או מחמיר בתקופת הטיפול בהרמוני, יש להיוועץ ברופא.

כמו כן, אם אחד או יותר מהמצבים הבאים מפתחת או מחמיר בתקופת הטיפול בהרמוני, יש להיוועץ ברופא:

- אם את מעשנת (במיוחד אם את מעל גיל 35), ראי "הרמוני ופקחת (קרישי דם)".
- אם אחד מקרובי המשפחה שלן מדרגה ראשונה סבל ממחלה שנגרמה על ידי קריש דם, למשל פקחת ורידים عمוקה, טסחיף ריאתי, התקף לב או שbez, ראי "הרמוני ופקחת (קרישי דם)".
- אם את סובלת מעודף משקל, ראי "הרמוני ופקחת (קרישי דם)".
- אם את סובלת מיגרנות.
- אם יש לך (או אי פעם הייתה לך) ציסטה אחת או יותר בשדי ויש לך קרוב משפחה ראשונה שסבל מסרטן שד.
- אם יש לך שרירנים ברכם (גידול שפיר שאינו סרטני).
- אם יש לך מחלת כבד או CIS המירה (אבני מרה).
- אם הייתה לך בעבר מחלת בכיס המרה במהלך נטילת גלולות למניעת הירון או במהלך הירון.
- אם את סובלת מתגובה של רגשות יתר הנקרהת אנגיאודמיה.
- אם את סובלת או סובלת בעבר מדיכאון חמור.
- אם יש לך (או אי פעם הייתה לך) קלואזמה (כתמים חומיים על העור שנקראים "מסיכת הירון", במיוחד על הפנים).
- במקרה זה עלייך להימנע מחשפה מוגברת לשמש או לקרבי UV.
- אם את סובלת מחלת הקrhoן או מקוליטיס כיבית (מחלות דלקתיות כרוניות של המעי).
- אם את סובלת מחלת אדמנטיית מרכזית (SLE – מחלת המשפיעה על מערכת החיסון).
- אם את סובלת מטאסתומונת המולטיית אורמית (HUS – הפרעה במערכת קרישת הדם העוללה לגרום לכשל קליתי).
- אם את סובלת מאנמיה חרמישית (מחלה תורשתית של כדוריות הדם האדומות).
- אם את סובלת מרמות גבוהות של שומנים בדם (היפרטרוגליקרידמייה) או אם ישנה היסטורי משפחתי של מצב זה. היפרטרוגליקרידמייה נמצאה קשורה לסיכון מוגבר לחלות בפנקרטיטיס (דלקת בלבל).
- אם יולדת לפני מספר שבועות או אם עברת הפליה בשליש השני להריון, את בסיכון מוגבר להיזוצות קריש דם.
- עליך לשאול את הרופא כמה זמן לאחר הלידה או הפליה בשליש השני תוכל להשתמש בהרמוני.
- אם את סובלת מדלקת בורדים מתחת לעור (דלקת ורידים פקקית שטחית).
- אם יש לך ורידים דליליים.

יש לשים לב לממצאים מסוימים שעולים להחמיר במהלך נטילת הגלולות, למשל אסטמה, אפילפסיה, הרופס שמתפרק בזמן ההריון (herpes gestationis), היפרפלוקטינומה, מצב הנקרוֹר קוויה או "Saint Vitus' Dance" (מחלה המאפיינת בתנעות הגוף מהירות, תנעות עוויות לא מתאימות המשפיעות בעיקר על הפנים, כפות הרגליים והידיים) וטרשת האוזן (מחלה של האוזן הפנימית).

אם את חזה תסמינים של אנטיאדמיה כגון גפיות הפנים, הלשון / או לוע / או קושי בבלעה או פריחה (סרפת) שיתתק שילוי בקשרי נשימה, פni לרופא מייד. תכשירים המכילים אסטרוגנים עלולים לגרום או להחמיר תסמינים של אנטיאדמיה תורשתית או אנטיאדמיה נרכשת.

הרמוני, כמו יתר הגלולות למניעת הירון, אינה מונעת הדבקות בזיהום ה-*HIV* (אידס) או מחלות אחרות המועברות ביחסו מעין.

הפרעות פסיביאטריות

ישן נשים אשר דיווחו על דיכאון או מצב רוח דיכאוני תוך כדי שימוש באטען מניעה הורמוני כולל בשימוש בהרמוני. דיכאון יכול להיות רציני ועלויל לעתים להוביל למחלות אובדן. אם את חזה שינויים במצב רוח וסמנים דיכאוניים, צרי קשר עם הרופא בהקדם האפשרי לצורך המשך ייעוץ רפואי.

הרמוני ופקחת (קרישי דם)

השימוש באטען מנעה הורמוני משולבים כגון הרמוני מעלה את הסיכון להתקפות של קריש דם בהשוואה לסיכון בנשים שלא משתמשות באטען כלשהו. במקרים נדירים, קריש דם יכול להשפוך כל דם ולגרום לביעות חמורות. קריש דם יכולם להתפתח:

- בורדים [פקחת ורידים, טסחיף פקיקי בורדים (VTE)].
- בעורקים [פקחת עורקים, טסחיף פקיקי בעורקים (ATE)].

ההחולמה מקריש דם לא תמיד מלאה. במקרים נדירים, עלולים להגרם נזקים חמורים ומתמשכים ובקרים נדירים מאוד הם יכולים להיות קטלניים.

חשוב לציין שהטסיכון הכללי להתקפות קריש דם בשל השימוש בהרמוני הינו קטן.

איך לזהות תסמינים של קריש דם

פנוי לרופא בבדיקות אם את מבחינה באחד או יותר מהתסמינים הבאים.

מהו אט כנראה סובל?	האם את חשה באחד או יותר מהטסמים הבאים?
פקקת ורידים عمוקה	<ul style="list-style-type: none"> • נפיחות באחת הרגליים או לאורך רOID וריד ברגלי או בכך הרجل במיעוד כאשר זה מלווה ב: ◦ כאב או ריגשות ברgel אשר באים לידי ביטוי רק בעמידה או הליכה ◦ תחושת חמיות באוותה הרגל ◦ שינויים במצב העור של הרגל, למשל הופכת להיות חיורת, אדומה או כחולה
תשchip ריאתי	<ul style="list-style-type: none"> • קוצר נשימה פתאומי ולא מוסבר או נשימה מהירה • שיעול פתאומי ללא סיבה אשר עלול להיות דמי • כאב חד בחזה אשר עלול להתגבר עם נשימה عمוקה • תחושת סחרור או סחרחות • דופק מהיר או לא סדי • כאב עד בבטן <p style="text-align: center;">אם איןך בטוחה, פנוי לרופא בהקדם האפשרי, מכיוון שהליך מחסמים הללו כמו שיעול או קוצר נשימה עלולים להיתפס בטעות כסימנים למצב קל כגון זיהום במערכת הנשימה (למשל התקרכות).</p>
פקקת בויריד הרשתית (קריש דם בכלי הדם של העין)	<ul style="list-style-type: none"> • סימנים אשר לרוב מופיעים בעין אחת: • איבוד ראייה מיידי או טשטוש ראייה ללא כאב אשר יכול להתפתח לאיבוד ראייה
התקף לב	<ul style="list-style-type: none"> • כאב, חוסר נוחות, לחץ, כבדות בחזה • תחושת לחיצה או גודש בחזה, בזרוע או מתחת לעצם החזה • תחושת מלאות, קושי בעיכול או תחושת חנק • תחושת חוסר נוחות בחלק העליון של הגוף המוקרטנת לגב, לסת, לגרון, לזרוע ולבطن • הדעה, בחילות, הקאות או סחרחות • חולשה קיצונית, חרדה או קוצר נשימה • דופק מהיר או לא סדי
שבץ (CVA)	<ul style="list-style-type: none"> • חולשה פתואמית או היעדר תחושה בפנים, בזרוע או ברגל, במיוחד מצד אחד של הגוף • בלבול פתאומי, קושי בדיבור או בהבנה • קושי פתואמי בראייה בעין אחת או בשתי העיניים • קושי פתואמי בהיליכה, סחרחות, איבוד שיווי משקל או קואורדינציה • כאב ראש חמוץ או ממושך המופיע בפתאומיות ללא סיבה ידועה • אובדן הכרה או עילפון עם או ללא פרכוס <p style="text-align: center;">לעתים התסמינים של שבץ יכולים להיות קיצרים מאוד עם החלמה מלאה כמעט מיידית, אבל את עדין צריכה לפנות בבדיקות לטיפול רפואי מאוחר שאת עלולה להיות בסיכון לשbez נסוף.</p>
חסימה של כלי דם אחרים על ידי קריש דם (למשל כלי דם בכבד, בעיים או בכליות)	<ul style="list-style-type: none"> • נזיפות וכיילון קל בגפיים • כאב חריף בבטן (בטן חריפה)

פקקת ורידים

מה יכול לךות אם נוצר קריש דם בויריד?

- השימוש באמצעי מניעה הורומונליים משולבים קשור לעלייה בסיכון להתפתחות קריש דם בוירידים (פקקת ורידים). אולם תופעת לוואי זו נדירה. היא יכולה בתדירות גבוהה ביותר במהלך השנה הראשונה לשימוש באמצעי מנעה הורומונליים משולבים.
- כשكريש דם מתפתח בויריד ברגלי או בcpu הרגל הוא עלול לגרום לפקקת ורידים عمוקה.
- אם קריש דם נע מהרגל לריאה הוא עלול לגרום לתסחיף ריאתי.
- במקרים נדירים מאוד קריש דם עלול להיווצר בויריד באיבר אחר, למשל בעין (פקקת בויריד הרשתית).

מתי הסיכון להתפתחות קריש דם ורידי הוא הגבוה ביותר?

הסיכון הגבוה ביותר להתקפות קרייש דם בווריד הינו במהלך השנה הראשונה לניטילת אמצעי מניעת ההורמוני משולב בפעם הראשונה. הסיכון עלול להיות גבוה יותר גם כאשר את חזרת ליטול אמצעי מניעת ההורמוני משולב (תקشير זהה לה שלקחת בעבר או אחר) לאחר הפסקה של 4 שבועות או יותר. לאחר השנה הראשונה הסיכון ייה מuszט גבוה בהשוואה למצב בו לא הייתה ניטילת אמצעי מניעת ההורמוני משולב. כאשר מפסיקים ליטול הרמוני הסיכון להתקפות קרייש דם חוזר למצב נורמלי תוך מספר שבועות.

מה הסיכון להתקפות קרייש דם?

הסיכון תלוי בנסיבות הבסיסיות שלך לפקחת ורידית ובסוג אמצעי המונעה ההורמוני המשולב שאתה נוטל. הסיכון הכללי לקריש דם ברגל או בריאה (פקקת ורידים عمוקה או תסחיף ריאתי) בשימוש עם הרמוני הוא נמוך.

- מתווך כל 10,000 נשים אשר לא נוטלות אמצעי מניעת ההורמוני משולב ואין בהריון, שתיים יפתחו קריש דם בשנה.
- מתווך כל 10,000 נשים אשר נוטלות אמצעי מניעת ההורמוני משולב אשר מכיל לבונרגסטREL, נורטיסטרון או נורוגסטימאט, כ-7-5 יפתחו קריש דם בשנה.
- מתווך כל 10,000 נשים אשר נוטלות אמצעי מניעת ההורמוני משולב אשר מכיל גסטודן, כגן הרמוני, כ-12-9 יפתחו קריש דם בשנה.
- הסיכון לפתח קריש דם ישתנה בהתאם להיסטוריה הרפואית שלך (ראוי "גורם המעלים את הסיכון שלך להיווצרות קריש דם בווריד" מטה).

הסיכון לפתח קריש דם בשנה	
כ-2 מתווך 10,000 נשים	נשים אשר אין נוטלות אמצעי מניעת ההורמוני משולב (גלאולה/מדבקה/טבעת) ואין בהריון
כ-7-5 מתווך 10,000 נשים	נשים אשר נוטלות אמצעי מניעת ההורמוני משולב אשר מכיל לבונרגסטREL, נורטיסטרון או נורוגסטימאט
כ-12-9 מתווך 10,000 נשים	נשים אשר נוטלות הרמוני

גורמים המעלים את הסיכון שלך להיווצרות קריש דם בווריד:

הסיכון להיווצרות קריש דם עם ניטילת הרמוני נמוך אך ישנים ממצבים אשר עלולים להעלות סיכון זה. הסיכון יהיה גבוה יותר:

- אם את בעודף משקל רב (BMI מעלה m^2/kg 30).
- אם לאחד מקרובי המשפחה שלך מדרגה ראשונה הינה קריש דם ברגל, בריאה או באיבר אחר בגיל צער יחסית (לפניהם גיל 50). במקרה זה יתכן כי יש לך הפרעה תורשתית במשפחה מושך בגל פצעה או מחלת, או לפחות אחת מהרגליים שלך מוקובעות (למשל נמצאות בגבבם). יתכן שהייה צורך להפסיק את השימוש בהרמוני כמה שבועות לפני הבניתו או בזמן שהתנתנוויות שלך מופחתת. אם את צריכה להפסיק את השימוש בהרמוני, שאל את הרופא מתי את יכולה להתחיל שוב ליטול הרמוני.
- עם העלייה בגיל (במיוחד מעלה גיל 35).
- אם ילדת או אם עברת הפללה בשליש השני להריון לפני מסגר שבועות.

הסיכון להיווצרות קריש דם גדל ככל שיש יותר ממצבים מגבריים סיכון.

טישה (מעל 4 שעות) עלולה להגבר את הסיכון לקריש דם באופן זמני, במיוחד אם יש לך ממצבים אחרים המגבירים את הסיכון. חשוב לציין בפני הרופא אם אחד מהמצבים המזוכרים מעלה רלוונטי עבורך, אפילו אם אין בטוחה. יתכן שהרופא יחליט כי יש להפסיק ליטול הרמוני. אם אחד או יותר ממצבים אלו משתנה בזמן השימוש בהרמוני, למשל קרוב משפחה מדרגה ראשונה חווה פקקת ללא סיבה ידועה או אם עליית הרבה במסקל, ספרי על כך לרופא.

פקקת עורקים

מה יכול לגרום אם נוצר קריש דם בעורק?

כמו קריש דם בווריד, קריש דם בעורק עלול לגרום לביעות חמורות. למשל הוא עלול לגרום להתקף לב או שbez.

גורמים המעלים את הסיכון שלך להיווצרות קריש דם בעורק:

חשוב לציין כי הסיכון להתקף לב או שbez כתוצאה מניטילת הרמוני נמוך מאוד אך הוא עלול לעלות:

- עם העלייה בגיל (במיוחד מעלה גיל 35).
- אם הינך **משענת**. מומלץ להפסיק לעשן כאשר הינך נוטלת אמצעי מניעת ההורמוני משולב כגן הרמוני. אם אין לך מצלילה להפסיק לעשן ואת מעלה גיל 35, יתכן שהרופא שלך ייעץ לך להשתמש באמצעות אמצעי מניעת מסוג אחר.
- אם את בעודף משקל.
- אם יש לך לדם גובה.
- אם לאחד מקרובי המשפחה שלך מדרגה ראשונה הינה התקף לב או שbez בגיל צער יחסית (מתוך גיל 50). אם זה המקרה, הסיכון להתקף לב או שbez מוחי עשוי להיות גבוה יותר עבורה.
- אם לך או ל亲属 משפחחה שלך מדרגה ראשונה יש רמת שומנים גבוהה בדם (קולסטרול או טריגליקידים).
- אם הינך סובל ממיגרנות, במיוחד במסתומים, הפרעת קצב הנקרআت פרפור פרזודרים.
- אם יש לך בעיה בלב (הפרעות במסתומים, הפרעת קצב הנקרআت فرفور فرزوذرums).
- אם את סוכרתית.

אם יש לך יותר מחד מהמצבים האלו או אם אחד מהם חמור במיוחד, הסיכון להיווצרות קריש דם עלול להיות אף גבוה יותר.

אם אחד מהמצבים האלו משתנה במהלך השימוש בהרמוני, למשל אם התחלת לעשן, קרוב משפחה מדרגה ראשונה חוות פקקת ללא סיבה ידועה או אם עלית הרבה במשקל, ספרי על כך לרופא.

גלאות למניעת הרישום רטרו

גורמי סיכון מבוססים להתקפות סרטן שד כוללים גיל, היסטוריה משפחתית, השמנת יתר, אישה שלא ילדה בעבר או איש שהרתהה וילדה לראשונה בגיל מאוחר.

סרטן השד אוביין בשכיחות מעט גבוהה יותר בקרב נשים שנוטלות גלולות, לעומת נשים שאינן נוטלות גלולות באותו גיל. עלייה מתונה זו במספר אוביוני סרטן השד נעלמת בהדרגה 10 שנים לאחר הפסקת נטילת הגלולה. לא ידוע אם ההבדל זהה נגרם בגלל השימוש בגלאלה. יתכן נשיות שנוטלות גלולות נבדקות בקפידה ולעתים קרובות יותר מאשר סרטן השד מתגלה מוקדם יותר. נטילת הגלולה עלולה להעלות גם את הסיכון לסרטן צואר הרחם אך זה לא חוכם מודיעין.

קיימים דיווחים נדירים על גידולים שפיריים בכבד בקרוב נשים אשר נטלו את הגלולה, ודיווחים נוספים נודרים יותר על גידולים ממאים בכבד בקרוב נשים אשר נטלו את הגלולה. הסיכון לפתח גידולים אלה עולה עם משך זמן נטילת הגלולה, אך למרות זאת הוא נשיר נマー.

מתי עליך לפנות לרופא?

בדיקות ועקב

הרופא ינחה אותך להגעה לבדיקות רפואיות באופן סדרי. כלל, תדיות ואופי הבדיקות יהיו מבוססים על גורמים רפואיים פרטניים. הרופא יעריך את המידיע שיקבל ויספק לך את ההסבירים הנחוצים לך.

פני מיד לרופא במקרים הבאים:

- אם את חוות סימנים של פקחת (ראי "איך להזנות כסמים של קריש דם" מעלה)
- אם את מריגישה שיש לך גוש בחזה או ליד החזה
- פני לרופא לפחות ארבעה שבועות מראש, אם את עמדת בפני ניתוח או אם הינך עתידה להיות במצב של חסור תנעה ממושך (ראי "הרמוני ופקחת (קרישי דם")
- אם ילדת או אם עברת הפליה בשליש השני להריון לפני מספר שבועות (ראי "הרמוני ופקחת (קרישי דם")
- אם יש לך דימום כבד ולא רגיל מהנרתיק
- אם את חשובה שיתיכן שתאת בהריון
- אם הוותת שלך לא מתחללה במהלך שבוע ההפסקה מנטילת הגלולה

תרופה אחרת והרמוני

אם את לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקחות.

כשרופא ירצה לך תרופה חדשה, כולל רופא שניינים, עליך לידע אותו שאתה נוטלת הרמוני. במקרים מסוימים, הרופא ייעץ לך להשתמש באמצעי מניעה נוספת לתקופה מסוימת, כל עוד אתה נוטלת את התרופפה.

תרופות מסוימות עלולות להקטין את יעילות הגלולה במניעת הירון, הן כוללות:

- תרופות מסוימות לטיפול באפילפסיה (פרימידון, פניטואין, ברביטורטים, טופירמאט, פנילבוטאצון, קרבמיצפין או פלבמט)
- גרייזופוליבין (תרופה לטיפול בזיהומים פטורייתיים)
- חלק מהתרופות לטיפול ב-HIV/AIDS (מעכבי פרוטאט) וזיהומים ויראליים אחרים (ריטונאוויר)
- ריפמיצין (טיפול בשחפת)
- תכשירים המכילים את הצמח היפריקום פרפרוטום (St. John's wort)
- מודפיניל (תרופה לטיפול בהפרעות שינה)
- דקסאמטазון (תרופה לטיפול במקרים של דלקתיות ואוטואימוניות מסוימות)

אמצעי מניעה שנלקחים דרך הפה יכולים להשפיע על תוצאות מעבדה מסוימות. תiedy עת הרופא שאתה לוקחת הרמוני אם את צריכה לעשות בדיקת דם.

אין להשתמש בהרמוני אם יש לך הפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית), ואת נוטלת תרופות המכילות: שילוב של אומבטאטוז/or פארטיאפירו/or/ ריטונאוויר , דאסאכיבור, גלקפירו/or/פיברנטנסו/or או סופיסבו/or/ ולפטסונו/or/ וקוטלפירו/or, משום שתכשירים אלו עלולים להוביל לעלייה בתוצאות של תפקודי כבד (עליה באגדימי כבד מסוג ALT) בבדיקות דם.

הרופא ירשום לך אמצעי מנעה אחרים לפני תחילת הטיפול בתרופות אלו. כשבועיים לאחר סיום הטיפול בתרופות אלו, ניתן יהיה להתחיל שוב את השימוש בהרמוני. ראי סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".

שימוש בתרופה ומזהן

ניתן ליטול הרמוני עם אוכל או שתייה.

הירין, הנקה ופוריות**הירין**

אין להשתמש בתרופה אם הינך בהירין, או כאשר קיים חסד להירין. אם הינך מתכנתת הירין, יש להיעזר ברופא או ברוקח.

הנקה

אין להשתמש בתרופה אם הינך מניקה.

נגייה ושימוש במכונות

לא נבדקה ההשפעה על היכולת לנוהג או להשתמש במכונות בזמן השימוש בהרמוני.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הרמוני מכילו לקטוז ווכרכוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך איסובילות לסטורם מסוימים, פנו לרופא לפני נטילת התרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

כל מגשיות של הרמוני מכילה 21 טבליות. כל טבילה מסוימת על גבי אריזת המגש בשם היום בשבוע בו יש ליטול אותה.

המינון המקורי בדרך כלל הוא: טבילה אחת בכל יום, בשעה קבועה, על פי סדר החיצים המורים על אריזת המגש, במשך 21 ימים. אין ליטול גלולות במהלך התקופה של 21 הימים בהם נטילת הרמוני. הדימום יתחל במהלך 7

הימים בהם אין ליטול גלולה (בדרכם כל בימי השישי לאחר נטילת הטבילה האחורה בмагשיות).

לאחר הפסקה בת 7 ימים, התחליל במגשיות הבאה ביום השmini, בין אם נפסק הדימום או לא. באופן זה נטילת כל מגשיות

נטילת הגוללה לא מיעדת לנשים שטרם קיבלו את הווסת הראשונה שלחהן או לנשים לאחר גיל המעבר.

יש לבלווע את הטבילה בשלמותה. אין מידע לגבי כתישה, ח齐יה או לעיסה של הטבילה.

התחלת החיפוי הראשוני

كيف תתחיל בחיפוי הראשוני כאשר בחודש האחרון לא השתמש באמצעות מניעת הורמוניים?
יש ליטול את הטבילה הראשונה ביום הראשון של הווסת בהתאם ליום בשבוע המסומן על גבי המגשיות. לדוגמה, אם הווסת ש郎 מתחילה ביום שני, יש ליטול את הטבילה המסומנת על גבי אריזת המגש בשם "FRI".

מעבר מגולות משולבות אחרות להרמוני
יש ליטול הרמוני ביום של Woche הגלולה הפעילה האחורה במגשיות הגולות הקודמת.

מעבר מגוללה המכילה פרוגסטרון בלבד להרמוני

אם עוברת מגוללה המכילה פרוגסטרון בלבד תוך יכולת יכולת להפוך את נטילת הגוללה המכילה פרוגסטרון בלבד ביום קלשו ולהתחיל ליטול הרמוני ביום של Woche. יש לשמש באמצעות מניעת נסוף לא הורמוני (כמו קונדום או קווטל זרע) במהלך שבועיים הראשונים לנטילת המגשיות הראשונה.

מעבר ממוצעי מניעת מזקרים או מושתלים או התקן תוך רחמי להרמוני

אם עוברת מזקרים למיניהם הירין, שתל או התקן תוך רחמי את יכולת להפוך את נטילת הגוללה המכילה פרוגסטרון בלבד ביום או ההתקן תוך רחמי או ביום בו אמרה להינמן הריקקה הבאה. יש לשמש באמצעות מניעת נסוף לא הורמוני (כמו קונדום או קווטל זרע) במהלך שבועיים הראשונים לנטילת המגשיות הראשונה.

אם עברת הפליה בשליש הראשון להירין
את יכולת להתחליל ליטול הרמוני מיד.

אם את אחר לידה או אם עברת הפליה בשליש השני להירין

הרופא יכול ליעץ לך להתחליל ליטול הרמוני מימים 28-28 לאחר הלידה או הפליה בשליש השני להירין. יש לשמש באמצעות מניעת נסוף לא הורמוני (כמו קונדום או קווטל זרע) במהלך שבועיים הראשונים לנטילת המגשיות הראשונה. אם כבר קיימת יחס' מין במהלך הזמן הזה, עליך לוודא שאין בהירין לפני שתתחליל ליטול הרמוני או לחכות עד להתחלת הווסת.

אם מופיע דימום לא צפוי

דימום לא צפוי (הכתומות) יכול ליקוטה בין ווסות, במיוחד בחודשים הראשוניים לנטילה. בדרך כלל, הדימום הלא רגיל זה מספיק כשהגופן מתרגל לגוללה (לאחר שלוש מגשיות). לעומת זאת, אם הדימום הלא צפוי ממשך או מופיע לראשונה לאחר שימוש ממושך בהרמוני, יש לפנות מיד לרופא.

אם לא מופיע דימום לאחר סיום המגשיות

אם לא התחליל דימום הווסת לאחר 7 ימים מהפסקת הגוללה ונטلت נכון את כל הגולות, זה לא סביר שאת בהירין. התחליל את המגשיות הבאה ביום השmini. אולם, אם לא התחליל דימום הווסת לאחר נטילת שתי מגשיות מלאות, יש לפנות לרופא מיד ולא להתחליל במגשיות הבאה עד לאישורו.

אם נטילת בטעות מינון גבוהה יותר של הרמוני

לא ידוע על מקרים של נזק חמור לאחר נטילת יותר מדי טבליות של הרמוני. נטילה של יותר מדי טבליות של הרמוני עלולה לגרום לבחלות, הקאות, כאב בطن, סחרחות, ישנוויות/עיפות, רגישות בשדיים, או דימום ויגני קל. ככל הנראה, אין צורך בטיפול מיוחד.

אם בטעות בלע' יلد מן התרופה, פנו מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והביי ארייזת התרופה איתך.

במקרה של מנת יתר, או כל שימוש לא רגיל, צרי קשר עם הרופא או הרוקח.

אם שכחת ליטול הרמוני

יעילות הגלולה במניעת הירין נשמרת רק במידה ועbero פחות מ-12 שעות מהמועד בו היה עליך ליטול את הטבילה. קחו טבילה מיד כשמחברת, והמשיכו לקחת את הטלויות הבאות לרוגיל.

אם עbero יותר מ-12 שעות מהמועד בו הייתה אמרה ליטול טבילה, או שפספסת יותר מטבילה אחת, יעלות הגלולה למניעת הירין עלולה להיות מופחתת. במקרה זה:

- טלי את הטבילה האחורה שכחית מידי כשנזכרת והמשיכו לקחת את שאר הטלויות לרוגיל, אפילו אם המשמעות היא נטלה של 2 טבליות באותו יום. המשיכו ליטול הרמוני עד לסיום המגשית.
- בנוסך, יש להשתמש באמצעי מנעה נוסף לא הרמוני (כמו קונדום או קווטל זרע) במשך 7 ימים. אם 7 הימים בהם דרש שימוש באמצעי מנעה נוסף, נמשכים מעבר ליום בו את נטילת את הטבילה האחורה במגשית הנוכחות, יש להתחיל את המגשת הבאה למורתה נטילת הטבילה האחורה של המגשיות הנוכחות (כלומר שלא הפסקה).

בכל מקרה יש להיוועץ ברופא.

אם הינך סובל משלשלים או הקאות

אם השלשלולים או הקאות מופיעים תוך 3-4 שעות מנטילת הטבילה, יתכן שהמרכיבים הפעילים בהרמוני לא נספגו במידה מספקת על ידי הגוף שלך. מצב זה דומה לשיכוח נטילת טבילה. לכן, לאחר ההקאה או השלשלות, יש ליטול טבילה נוספת מוגשת חרבית. אם השלשלולים או הקאות מתמשכים, יש להיוועץ ברופא.

אם ברצונך לפסיק ליטול הרמוני

כשהת מפסיק ליטול הרמוני יתכן שהווסת שלך לא תחזיר ספונטנית (אל-ווסת שלאחר טיפול). במקרה זה, יש להיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדק התווות והמנה בכל פעע שהירך נטלה תרופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצי ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהרמוני עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבחלי למקרא רשותת תופעות הללו. יתכן שלא תסבל מכך אחד מהן.

אם את סובלת מטופעת לוואי, במיוחד אם היא חמורה או מתמשכת או אם הינך חשש בשינוי כלשהו בבריאותך ואת חוששת שייתכן שהוא נובע שימוש בהרמוני, פני אל הרופא.

תופעות לוואי חמורות

עליה בסיכון להיווצרות קריש' דם בורידים (תסחיף פיקיני בורידיים) או בעורקים (תסחיף פיקיני בעורקים) קיימת עברו כל הנשים המשתמשות באמצעי מנעה הורמוניים מסוימים. למידע מפורט יותר ראי פרק 2 "לפני שימוש בתרופה".
תופעות הלואין החמורות הקשורות בשימוש בכללה מפורטות בפרק "הרמוני ופקתקת (קריש' דם)" ו-"గלאות למניעת הירון ורסתן". למידע נוסף, קראי את הפרקים האלה.

אנגיאודמה

פני לרופא מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים של אנגיאודמה : נפיחות הפנים, הלשון / או לוע / או קושי בבליעה או פירחה (סרפדת) שייתכן שיילו בקש" נסימה (ראי גם "ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה")

פני מיד לרופא אם אתה חווה באחד מהתסמינים הבאים:

- נפיחות באחת הרגליים או לאורך וריד או ברגל או בcpu הרגל
- קוצר נשימה פתאומי ולא מוסבר או נשימה מהירה
- שיעול פתאומי ללא סיבה אשר עלול להיות דמי
- כאב חד בחזה אשר עלול להתגבר עם נשימה עמוקה
- תחושת סחרור או חרחורות
- דופק מהיר או לא סדר
- כאב עד בבטן, כאב חריף בבטן (בטן חריפה)
- איבוד ראייה מיידי או טשטוש ראייה ללא כאב אשר יכול להתפתח לאיבוד ראייה, אשר לרוב יופיע בעין אחת
- תחושת כאב, חסור נוחות, לחץ, כבדות בחזה
- תחושת לחיצה או גודש בחזה, בذرוע או מתחת לעצם החזה
- תחושת מלאות, קושי בעיכול או תחושת חנק
- תחושת חסור נוחות בחלק העליון של הגוף המוקרנת לגב, ללסת, לגרון, לזרוע ולבטן
- העזה, בחליות או הקאות
- חולשה קיצונית, חרדה או קוצר נשימה
- חולשה פתאומית או היעדר תחושה בפנים, בזרוע או ברגל, במיוחד בצד אחד של הגוף
- בלבול פתאומי, קושי בדיבור או בהבנה
- קושי פתאומי בהיליכה, איבוד שיווי המשקל או קוורידינציה
- כאב ראש חמוץ או ממושך המופיע בפתאומיות ללא סיבה ידועה
- אובדן הכרה או עילפון עם או ללא פרכו
- נפיחות ויכילון קל בגפיים
- אם את מרגישה שיש לך גוש בחזה או ליד החזה

תופעות לוואי נספנות:

תופעות לוואי שכיחות מודר – תופעות שמופיעות ביוטר משתמשת אחת מעתה:

- כאב ראש, מיגרנה
- דימום בין וותי (הכתמות)

תופעות לוואי שכיחות – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשת מתוך 100:

- זיהום ויגנלי לרבות זיהום ויגנלי פטריאטי'
- שינויים במצב הרוח (לדוגמה דיכאון) או שינוי בדחף המני
- עצבנות או סחרחוורת
- בחילה, הקאה או כאב בטן
- אקנה
- כאב, לחץ, הגדלה והפרשה מהשדיים
- דימום וותי כאב או שינויים בזרימה הווסתית, היעדר וסת
- שינויים בהפרשות מצואור הרחם
- אצירת נזלים או בזקת
- עלייה או ירידת במשקל

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות ב-1-1,000 משתמשת מתוך 1,000:

- שינויים בתיאבון
- עוניותה בבטן, נפיחות
- פריחה, הופעת כתמים כהים על הפנים שעלולים להיות מתמשכים, שיעור יתר, אובדן שיער
- עלייה לחץ הדם, שינויים ברמות השומנים בדם

תופעות לוואי נדירות – תופעות שמופיעות ב-1-10,000 משתמשת מתוך 10,000:

- תגבות אלרגיות, כולל מקרים נדרירים מודר של סרפנדט, בזקת אלרגית של הפנים (אנגיאודמה), הפרעות חמורות בൺימה ובברימת הדם
- אי סבילות לאלקוז
- אי סבילות לעדשות מגע
- קריש דם בויריד או בעורק לדוגמה:
 - ברגל או בכף רגלי (פקחת ורידים عمוקה)
 - בריאה (תסחיף ריאתי)
 - התקף לב
 - שבח
 - שבח קטן או תסמינים חולפים דמיי שבח, תופעה הידועה בשם אירוע איסכמי חולף
 - במקרים נדרירים מודר, קריש דם בכבד, בKİבה/מעי, בכליות או בעין אחת הסיכון לקריש דם עלול להיות גבוה יותר אם יש לך אחד מהמצחים האחרים אשר מבקרים את הסיכון (ראי פרק 2 למידע נוסף על גורמים המגבירים את הסיכון לקריש דם ולתסמים של קריש דם).
- צהבת עקב חסימת צינורות מריה
- אדמנת קשרית (erythema nodosum) (Erythema nodosum)
- ירידת ברמות חומצה פולית בדם (חשוב מאד אם את נכנסת להירון מיד לאחר הפסקת Nutzung הרמוניט)

תופעות לוואי נדירות מודר – תופעות שמופיעות בפחות משתמשת אחת מתוך 10,000:

- סיכון מוגבר לגידול שפיר בכבד, גידול ממאייר בכבד
- החמרה של זאת אדמננטית
- החמרה של פורפיריה (הצטברות של פורפירין ברקמות)
- החמרה של כוריאה (הפרעה תונעטיבית)
- דלקת בעצב הראייה (עלול להוביל לעיוורון חלקי או מלא)
- החמרה במצב דליות ורידים
- דלקת בלבלב, דלקת של המעי הגס עקב חוסר חמצן
- אבנים בכיס המירה, הפחתה בהפרשה של נזלי מרה (הרמוניט עלולה להחמיר הפרעות קיימות בכיס המירה או לגרום להופעתן)
- פריחה עם שלפוחיות (אדמנת רב-צורתית)
- תסומנות המולטי-אומנית (מצב שבו קריש דם גורמים לכשל קליתי)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה:

- מחלה מעי דלקתית (קורואה), דלקת כיבית של המעי האגס
- נזק לכבד (לדוגמה דלקת בכבד, תפוקוד כבד ל��וי)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מהתופעות הלוואי מחייבת, או כאשר את סובלת מהתופעת לוואי שלא צינה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי לשדרט הביריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי"
שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י
כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את הטיפולה?

- **מניע הרעללה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרמי להקה לא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האrizה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקומות יבש, מתחת -25°C .
- יש לשמר את המ%">**מגשיות** באריזת הקרטון או בונרטיק הנשיאה על מנת להגן מאו.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Lactose hydrouse 80 Mesh, sucrose, maize starch, calcium carbonate, talc, polyethylene glycol 6000, povidone K-25, magnesium stearate, povidone K-90, wax pharma E.

כמו כן, כל טבילה מכילה 37.505 מ"ג לקטוז ו-19.661 מ"ג סוכרוז.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

- איזית קרטון המכילה מגשיות אחת של 21 טבליות בצע לבן.
- אריזת קרטון המכילה 3 מגשיות, כל מגשית מכילה 21 טבליות בצע לבן.

אריזת הקרטון מכילה נורתיק נשיאה הנועד להגן על המ%">**מגשיות** בה את משתמשת.

"תיכון שלא כל גודלי האריזות משווים".

בעל הרישום וכתובתו: פיבר פי אפ. אי פרמצטטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 121-88-30272

נערך ב-2023/05