

ناروسين

أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على:

ناروسين مونوبيوم 275 ملجم (Naproxen sodium 275 mg)

معلومات حول المركبات غير الفعالة ومبنيات الحساسية، انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية" أيضاً.

افرا النشرة ينتهي حتى نهايتها وذلك قبل بدء استعمال الدواء، تنتهي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلحة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك تناول المستحضر وفق التعليمات الواردة في بند الجرعة من هذه النشرة. استشر صيدلياً إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية.

علىك مراعاة الطبيب إذا استمرت الحرارة لأكثر من 3 أيام أو إذا استمرت الآلام لأكثر من 10 أيام.

1. لم أعد هذا النوع؟

الدواء مع تشكين الآلام الخففة حتى المعتدلة مثل: الآم الأسنان، الآم الظهر والألم الدورة الشهرية، لغضن الحرارة، لعلاج الالتهابات الروماتوидية، لعلاج التهابات الأوتار والعضلات في البطن العظمي.

الفصيلة العلاجية:

مسكن الآلام من مجموعة مضادات الالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs).

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال هذا الدواء:

إذا كانت لديك حساسية مفرطة أو حساسية:

• ناروسين، ناروسين مونوبيوم أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي

عليها الدواء (انظر قائمة المركبات في البند 6).

• للأسيبرين، قد تسبب الآلام أو الدواء من مجموعة NSAIDs (مثل:

ابوبروفين أو دوكسيفيلايك).

يمنع تناول الدواء إذا:

• كنت تعاني من مشكلة في المعدة أو الأمعاء مثل قرح أو نزيف.

• كان لديك في الماضي نزيف أو فرحة في الجهاز الهضمي أثناء تناول دواء من

NSAIDs.

• كنت تعاني من مشكلة حادة في الكلى، الكبد أو القلب.

• كنت في الثلث الأخير من الحمل.

تحذيرات خاصة متعددة باستعمال الدواء:

قبل العلاج ناروسين، أخير الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تعاني من مشكل في القلب، إذا عانيت في الماضي من سكتة دماغية أو إذا كنت تعانين أنك معرضاً لهذه الحالات (مثل: في حال كنت تعاني من ضغط مرتفع، سكري، مستوي كوليسترون مرتفع أو إذا كنت مدخناً).

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بناروسين إذا كنت تعاني من أحد

الاعراض التالية:

• الربو، الحساسية (مثل: حمى الكلا) أو إذا عانيت في الماضي من تورم الوجه، الشفتين، العينين، أو اللسان.

• ضغف (تحتل أنه ناج عن مرض) أو إذا كنت مسنناً.

• سلالق (أوعية الدموية) أو إذا كنت تعانين كثيراً، أو كنت تعاني من الركام، السداد الأنف أو تبقي

الأنف (التهاب الأنف) أو الكبد.

• اضطراب في أداء الكلى أو الكبد.

• اضطراب في أداء خثر الدم.

• مشكلات في الأوعية الدموية (الشرابين).

• فرط شحميات الدم (hyperlipidemia).

• أمراض المناعة الذاتية، مثل: النوبة الحاممية الجهازية (تنزدي إلى الآم في المفاصل، طفح جلدي، وحمى)، التهاب في الأمعاء الطيفية (colitis)، أو داء كرون (الذي يسبب التهاب الأمعاء، الماء في الأمعاء، إسهال، تقيؤات، وانخفاض الوزن).

الاستعمال لدى الأطفال:

هذا الدواء ليس معداً للأطفال دون سن 12 عاماً.

الفحوصات والتابعة:
أثناء استعمال ناروسين، سوف يرغب طبيبك في رؤيتك والتتأكد من أنك تتناول الجرعة الصحيحة ذلك، وإذا ثبت لديك أعراض جانبية، هذا الأمر هام بشكل خاص إذا كنت مسنناً.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تتناول، أو تتناول مخزناً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك، لا سيما إذا كنت تتناول:

• أدوية لتسكين الآلام مثل: أسيبرين، ايبوبروفين، دوكسيفيلايك، باراسيتامول.

• أدوية لتنبييع الدم، مثل: أسيبرين، وأفارلين، هيلارين أو كلوبيجيروجل.

• سولفونلوكسازيدات، مثل: هيدرو-فونيلوكسازيد، أسيتايزوكسازيد، إدايميد بما في ذلك مضادات

حيوية من مجموعة sulfonylureas (مضاد للثبات).

• سولفونلوكسازيد (السكري)، مثل: جليميد أو الجليبيزيد.

• مثبطات ACE أو أي دواء آخر لعلاج ضغط الدم المرتفع مثل سيلازايريل، إنالايريل أو بروبريلول.

• مثبطات مستقبل آنгиوتوتيسين II، مثل: كاتنديسراتان، إپروساركان أو لوسراتان.

- مذرات البول (علاج ضغط الدم المرتفع)، مثل: فورسيميد.
- جليكوزيدات القلب (علاج مشاكل القلب) مثل: ديجوكسين.
- ستربوريات (التورم والالتهاب)، مثل: هيدروكورتيزون، بريديزيلولون وديكساميثازون.
- مصاد حيوى من مجموعة الكوبالونات (مضاد للداعوى)، مثل: سيروبروكاسين أو موكسيفلوكاسين.
- أدوية معينة لاضطرابات النفسية، مثل: ليثيوم أو أدوية من مجموعة SSRIs، مثل:
- فلوكسين أو ستيالپورام.
- برونسينيد (الترقوس).

- ميتوروكسات (علاج مشاكل الحاد، التهاب المفاصل أو السرطان).
- سيلكسيبورين أو تاكروليموس (المشاكل في الجلد أو للعلاج بعد زرع عضو).
- زيتونوغيرين (العلاج ضد HIV-1).
- ميفيرينستون (يُستخدم لإيقاف الحمل أو لتسريع الولادة عند وفاة الجنين).

استعمال الدواء والغذاء:
يجب تناول ناروسين مع الطعام، أو بعد الوجبة فوراً.
الحمل، الرضاعة والخصوبة

- يمنع تناول ناروسين خلال أول 6 أشهر من الحمل إلا إذا كان ذلك ضرورياً وبنصوصية من طبيبه. إذا كنت بحاجة تناول ناروسين خلال أول 6 أشهر من الحمل أو أثناء محاولة الحمل، استعمل أقل جرعة ممكنة لافرقة فترة مكثنة. اختياراً من الأسبوع الـ 20 للحمل وما بعده، في حال تم تناول ناروسين لأكثر من بضم أيام، قد يسبب ناروسين ضرراً لكثيراً لدى الجنين ويؤدي إلى إعاقة ماء ملائمة أو تضيق المجرى المbowy المسمى في تلك الطفل (arteriosclerosis)، إذا كنت بحاجة لاستعمال هذا الدواء.
- يجنب انتشاره الطبيب.

- يمنع استعمال ناروسين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (الثلث الأخير)، بسبب خطر تعرق الجنين الصغير. قد يسبب العلاج الضرر الكلي وقلب الجنين ويؤثر على ميلك وميل الجنين للتزيف ويسبب ولادة متاخرة أكثر أو أطول من المتوقع.

- إذا كنت حاملة مرضعة أو تعتقدين أنك قد تكون حاملة أو تعاوين ان تسببي حاملاً، استشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.
- قد يودي ناروسين إلى صعوبات في أن تصبغي حاملاً. أخبر الطبيب إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كان من الصعب عليك أن تصبغي حاملاً.

الساقية واستعمال الماكولات:
قد يحجب ناروسين هذا الدواء إلى تعب، تناول، دوخة، اضطرابات في الرؤية والتوازن، وإلى شعور بالاكتئاب، وصعوبات في النوم. يجب استشارة الطبيب إذا كنت شعرت بهذه الأعراض وينصح الساقية أو استعمال الماكولات.

- معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء
- يحجب ناروسين على علىك لافرتك. إذا أخذت الطبيب بذلك تعاني من عدم القدرة على تحمل حساسية سكريات معيونة، توجه إلى الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- يحجب كل قرص على 24 ملجم تقريباً من الصوديوم المركب الأساسي في محل الطعام. يجب هذه الكمية 1.25% من الدلار الأقصى من الاستهلاك الغذائي الموصى به يومياً للبالغ.
- يحجب الدواء على بادرة صبغة أصفر غروب الشمس FCF (Sunset yellow FCF) التي قد تسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الموصى بها عادة هي:
البالغون فوق سن 12 عاماً: قرص واحد كل 12 ساعة، وفق الحاجة، أو

جرعة تتبع من قرصين على مدار 24 ساعة. لا يجوز تناول جرعة تتعدى قرصين خلال 24 ساعة.

البالغون فوق سن 65 عاماً: حتى 1½ قرص على مدار 24 ساعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

توقف عن استعمال الدواء، وراجع الطبيب إذا استمرت الحرارة لأكثر من 3 أيام أو إذا

قد تكون هناك علاقة بين تناول أدوية مثل ناروسين وبين ارتفاع الطفيف لحرارة الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يزداد هذا الخطر أثناء الاستعمال المتواصل وتناول جرعة عالية. لهذا لا يرجو تجاوز الجرعة وفترقة العلاج الموصى بهما.

طريقة الاستعمال:
يمنع صنع أو سحق الأقراص! يمكن شطر الأقراص عند خط الشطر.

يجب إبقاء الفرق مع كأس من الماء.

يجب تناول الدواء مع أو بعد الوجبة.

يجب تناول ناروسين كافية من السوائل أثناء استعمال الدواء، لا سيما إذا كنت تعاني من مشكل في الكلى.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتعل طفل كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه إلى الطبيب أو إلى عرقه الطواريء التابعة للمستشفى فوراً، مصطحبًا بوجبة الطعام معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناوله فوراً، مصطحبًا بوجبة الطعام معك في الوقت العادي. لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة تعيقها عن جرعة المدعى.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة أخرى تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية
جميع الأدوية يمكن أن يسبب استعمال ناروسين أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين.

لا تزعم عن فراء قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل أن تعياني من أي منها.

نقطة تكميلية

- ضربات قلب (palpitations)، انخفاض وتنبر القلب أو ضغط دم مرتفع.
 - مشاكل في تدفق الدم في الجسم أو ضرر في الأوعية الدموية. قد تكون علامات ذلك التعب، ضيق في التنفس، شعور بالإغماء، المُلأم.
 - الصدر
 - صعوبات في التنفس تشمل على ضيق في التنفس، صفير أثناء التنفس أو سعال.
 - الالهاب في الرئتين أو تورم الرئتين.
 - الحبل الشعري
 - طفح جانبي، يشمل على احمرار، طفح حاك (شرى)، حبوب وبثارات على الجسم والوجه.
 - علامات كبدية، حكة، تعرق، حساسية جلد مفرطة تجاه الشمس، تساقط الشعر.
 - جهاز البول
 - دم في البول، أو مشاكل في الكلى.
 - اعراض جانبية مختلفة:
 - عطش، حمى، تعب أو شعور عام سيء.
 - ألم في المعدة أو فروق في المعدة.
 - ألم أو ضيق في الصعوبات.
 - صعوبة في الحصول.
 - ذئبة حمامية جهازية: تشمل العلامات على حمى، طفح، مشاكل في الكلى، وألم في المفاصل.
 - إذا ظهر عرض جانبي، إذا ناقمك أحد من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبني لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.
 - الإبلاغ عن الأعراض الجانبية
 - يمكن إبلاغ وزارة الصحة عبر الأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بحسب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجبك إلى استنارة على الإنترونت لإبلاغ عن الأعراض الجانبية، وغير الدخول إلى الرابط <https://sideeffects.health.gov.il>
 - 5. كيف يجب تخزين الدواء؟**
 - تجنب التشتت: يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان معقول، بعيدًا عن متداول أيديه ومبالغاً في الأمانة أو الأطفال، وهكذا تتتجنب التسمم. لا يجب التقبيل دون تعليمات صرحة من الطبيب.
 - يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة.
 - تاريخ انتهاء الصلاحية يتبع إلى يوم الأخير من نفس الشهر.
 - يمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.
 - 6. معلومات إضافية**
 - إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:
 - Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Purified water, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, Sunset Yellow FCF aluminium lake (E110), Macrogol, Titanium dioxide.
 - كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:
 - فراش مستدير مطفي بلون برتقالي، مع خطر للشظر في جانب واحد.
 - كتوني كل عبوة على 10 أو 20 فراشًا في عبوة بليستر.
 - اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:
 - تبيغ إبريلين. م.ض.، شارع دفرا هنفيان 124، تل أبيب 6944020
 - تم تحرير هذه النشرة في نيسان 2024
 - رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 065.82.22004
 - لتبسيط قراءة هذه النشرة وتبسيتها ورد النص بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، الدواء معد لابناء كلا الجنسين.
 - يجيب التوقف عن تناول الدواء، والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية.
 - الإرشادات: ينصح أن تناول علاج طبي فوري:
 - اعتراض حالة في المعدة يمكن أن يؤدي إلى تقييد دموي أو تقييد قطع صغيرة تبدو كحببات القهوة.
 - تزيف من فتحة الشرج يمكن أن يؤدي إلى براز أسود وألزج أو إسهال دموي.
 - فرحتات وفقوس في المعدة أو الأمعاء. يمكن أن تكون العلامات على ذلك اتزاع في الطبطب، الألم في البطن، حمى، شباب، أو انتفاخ.
 - مشاكل في البنكرياس. تشمل العلامات على الام بطن شديدة تنتهي إلى منطقة الظهر.
 - تفاقم اعراض التهاب المعدة (colitis) أو داء كرون، التي تتعكس بالالم، إسهال، تقيؤات، وانفاسون الوزن.
 - ردو فعل تحسسينية
 - يمكن أن يؤدي إلى تورم مفاجئ في الوجه، الحنجرة، اليدين أو الساقين.
 - صعوبات في التنفس وسعفط في المعدة.
 - طفح جانبي، حكة وثبور.
 - طفح جانبي حاد
 - طفح شديد مع بثور أو تقرير الجلد، وقد تحدث ثبور في الفم، الحنجرة، أو العينين. يُعتقد أن انتشار في وقت ذاته حمى، صداع، سعال وألم عام.
 - ثبور عند عرض التهاب المعدة، تظهر تحديداً في الذراعين، الوجه، واليدين.
 - مشاكل في الكبد
 - اضطرابات الداء والعينين (يرقات).
 - تعب، نقص الشهية، غثيان أو تقيؤات، برأس (التهاب الكبد)، نتاج فحوصات دم تدل على مشاكل في الكبد (تشمل على التهاب الكبد).
 - نوبة قلبية
 - في المعدة قد يمتد باتجاه الرقبة، الكتفين، وفي الذراع اليسرى باتجاه الأسفل.
 - سكنة ملائمة
 - ضعف ونقص الإحساس في العضلات، قد يكون نقص الإحساس هذا في جانب واحد من الجسم.
 - تغيرات مفاجئة في راحة الشفط، الطعام، السمع، أو الرؤية، ارتجاع.
 - التهاب المعدة
 - حمى، غثيان أو تقيؤ، تبتسن الرقيقة، صداع، حساسية المضوء وارتياب (تحدث بوتيرة عالية لدى المرضى الذين يعانون من مرض مناعة ذاتي مثل الذئبة).
 - أعراض جانبية إضافية
 - المعدة والأمعاء
 - حرقة، حسر المضم، الألم في البطن، غثيان، تقيؤ، إمساك، إسهال، غازات.
 - جهاز الدم
 - مشاكل في الدم، مثل فقر الدم، أو تغيرات في عدد خلايا الدم البيضاء.
 - أمراض نسائية
 - صعوبات في النوم وتغييرات في انساط الأحلام.
 - اكتئاب.
 - ارتجاع، وحلوهسة (مشاهدة وسماع أمور غير موجودة).
 - الجهاز الصبغي
 - صداع.
 - تشنجات، دوخة، نعاس.
 - شعور بلسم ووخز أو نقص الإحساس في اليدين أو الساقين.
 - صعوبات في الذاكرة أو التذكر.
 - الميئين والآذنين
 - تغيرات في الرؤية، الم في العينين.
 - تغيرات في السمع، طنين في الأذنين (tinnitus) وفقدان السمع.
 - دوخة تؤدي إلى مشاكل في التوازن.
 - القلب والدورة المدمية
 - تورم اليدين، راحتي الققدمين أو الساقين (وذمة) قد يكون مصحوباً بالالم في الصدر، تعب، ضئنة في التنفس، افتل، قفل،