

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

פריזמה / פריזמה פורטה טబליות

הרכב:

כל טבליה של **פריזמה** מכילה:

Fluoxetine (as HCl) 20 mg פלאוקסטיין (כהידרוקלוריד) 20 מ"ג

כל טבליה של **פריזמה פורטה** מכילה:

Fluoxetine (as HCl) 60 mg פלאוקסטיין (כהידרוקלוריד) 60 מ"ג

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה פרק 6 "מידע נוספת" ופרק 2 "לפני השימוש בתרופה".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטראם תשתחמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופות נוגדות דיכאון וחרדה, מעלות את הסיכון להתנוגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים
ומבוגרים צעירים עד גיל 25.
עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרובייהם, לעקב אחר שינויים
התנהגותיים כגון: החמרה הדיכואית, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה.
במידה וחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

פריזמה / פריזמה פורטה מיועדת לטיפול ב:

מבוגרים:

- אפיוזודות דיכאון מג'ירות.
- הפרעה כפייתית טורדנית (OCD).
- בולמוס אכילה (בולימיה נרבואה): פלאוקסנטין ניתנת טיפול משלים לפסיקותרפיה לצורך הפחתה של התקפי זלילה בלתי נשלטים והפרעת הטהרות.

ילדים ומתבגרים מגיל 8 ומעלה:

- אפיוזודה ביןנית עד חמורה של דיכאון מג'ורי, אם הדיכאון לא הגיע לטיפול פסיכולוגי של 6-4 מפגשים. הילד או אדם צער עם דיכאון ביןוני עד חמור יש להציג תרופות נוגדות דיכאון רק בשילוב עם טיפול פסיכולוגי הנitin במקביל.

קובצתה תרפואיית: **פריזמה / פריזמה פורטה** שיר לקבוצת תרופות אנטי-דיכואניות מסווג מעכבים סלקטיביים של קלייטה חוזרת של סרוטונין (SSRI).

כיצד פריזמה / פריזמה פורטה עובדת:

במוחו של כל אחד מצוי חומר המכונה סרוטוניין. אצל אנשים שסובלם מדיכאון, מהפרעה טורדנית כפייתית או מבולימיה נרבואה יש רמות סרוטוניין נמוכות יותר בהשוואה לאנשים אחרים. אופן הפעולה של **פריזמה / פריזמה פורטה** ושל תכシリ SSRI אחרים אינו ברור במלואו, אך הם עשויים לסייע באמצעות העלאת הרמה של סרוטוניין במוח.

טיפול בהפרעות אלו הוא חשוב בכך לעזרך בשיפור מצבך. אם ההפרעה אינה מטופלת, היא עלולה שלא לחלוף והיא עלולה להפוך לחמורה יותר ולקשה יותר לטיפול.
יתכן כי תזדקק לטיפול במשך מספר שבועות או חודשים על מנת להבטיח כי התסמים שלך חלפו.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם אתה:

- רגש (אלרגי) לפלאוקסטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שמכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6 "מידע נסוף"). אם אתה מפתח פריחה או תגובה אלרגית אחרת (כגון גרד, נפיחות בשפתים או בפנים או קוצר נשימה), הפסיק מיד את נטילת הטబליות ונונה לרופא באופן מיידי.
- מוטל תרופות אחרות היוצאות כמיעבי מונומאי אוקסידאז בלתי היפכים שאינם סלקטיביים (AOIs), לאחר שעלוות להתרחש תגובה חמורות ואף קטלניות (למשל, איפרוניידים המשמש לטיפול בדיאנון). יש להתחיל בטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה אך ורק בחולף שבועיים לאחר הפסקת הטיפול ב-AOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי.
- אין ליטול כל AOI בלתי הפיך שאינו סלקטיבי במשך לפחות 5 שבועות לאחר הפסקת נטילת פריזמה/פריזמה פורטה. אם פריזמה/פריזמה פורטה נרשם לתקופה ארוכה / או במינון גבוה, על הרופא לשקלן מרוחך זמן ארוך יותר.
- מוטל מטופרולול (טיפול באיספיקת לב), לאחר שקיים סיכון מוגבר לכך שקצב הלב שלך יהפוך לאייטי מיידי.

ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה לפני הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה ספר לרופא אם אחד המרכיבים הבאים רלוונטי לגביך:

- בעיות לב.
- הופעת חום, נזיפות שרירים או רעד, שינויים במצב הנפשי כגון בלבול, עצבנות קייזונית; יתכן ווערת רוחות כי אתה סובל מ"תסמונת סרוטוני" או מ"תסמונת ניווילפטית ממארה". אף על פי שתסמונת זו מתרחשת לעיתים נדירות, היא עלולה להוביל למצבים שעלולים להיות מסכני חיים; פנה לרופא באופן מיידי לאחר שייתכן כי יש צורך בהפסקת הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה.
- מאניה כתעת או בעבר; אם אתה סובל מאירועmani, פנה לרופא באופן מיידי לאחר שייתכן כי יש צורך בהפסקת הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה.
- היסטוריה של הפרעות דם או הופעת חבות או דימום חריג, או אם אתה בהירין (ראי סעיף "הירין' הנקה ופוריות" בפרק זה).
- טיפול מתמשך בתרופות המدلילות את הדם (ראה סעיף "אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות" בפרק זה).
- אפילפסיה או פרכוסים. אם אתה סובל מפרכוס או מבחין בעלייה בתדרות הפרכוסים, פנה לרופא באופן מיידי. יתכן שיש צורך בהפסקת הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה.
- טיפול מתמשך בטומוקסיפן (משמש לטיפול בסרטן שד) (ראה סעיף "אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות" בפרק זה).
- מתחיל לחוש חסור מנוכחה ואני יכול לשבת או לעמוד ללא תחזזה (אקטניזיה). העלתה המינון של פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להחמיר זאת.
- סוכרת (ייתכן כי הרופא יצטרך להתאים את המינון של אינסולין או של טיפול נגד סוכרת).
- בעיותCBD (ייתכן כי הרופא יצטרך להתאים את המינון שלך).
- קצב לב איטי במנוחה / או אם ידוע לך שאתה עלול לסבול מחוסור במלח כתוצאה שלישול והקאות באופן חריג וממושך, או משימוש במשתנים.
- טיפול מתמשך במסתנים, במיוחד אם אתה קשייש.
- גלאוקומה (לחץ תוך-עיני מוגבר).

מחשבות על התאבדות והחמרת הדיכאון או הפרעות החרדה

אם אתה סובל מדיכאון / או מהפרעות חרדה, אתה עלול לעתים לסבול מחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות. תופעה זו עלולה להיות מוגברת כאשר מתחילים לראשו טיפול בנוגדי דיכאון, לאחר שלכל התרופות הללו נדרש זמן עזנת להתחיל לפעול, בדרך כלל כשבועיים אך לעיתים פרק זמן ממושך יותר. יותר סביר שתחשוב כך:

- אם סבלת בעבר מחשבות על התאבדות או פגיעה עצמית.
- אם אתה אדם בגיר צעיר. מידע מניסויים קליניים הראה סיכון מוגבר להתנהגות אובדנית במובגרים עם הפרעות פסיכיאטריות בני פחות מ-25 שנים אשר טיפולו בנוגדי דיכאון.
- אם אתה סובל מחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות בכל זמן, פנה מיד אל הרופא או לבית חולים.

"יתכן כי יעדור לך משפחה או לחבר קרוב שאתה סובל מדייכאון או מהפרעת חרדה ותבקש מהם לקרוא עלון זה. אתה יכול לבקש מהם לידע אותך אם הם חשובים שהדייכאון או החרדה שלך מחמירים, או אם הם מודאגים לגבי שינויים בהתנהגותך.

ילדים ומתבגרים מגיל 8 עד 18

מטופלים מתחת לגיל 18 נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מתופעות לוואי, כגון ניסיון התאבדות, מחשבות אובדניות ועינויים (בעיקר תוקפנות, התנהגות מתנוגדת וכעס) בעת נתילת תרופות מסווג זה. ילדים ומתבגרים מגיל 8 עד 18 יש להשתמש בפריזמה/פריזמה פורטה רק לטיפול באפיוזודות דייכאון מג'וריותBINONIOT עד חמורות (בשילוב עם טיפול פסיקולוגי) ואין להשתמש בתרופה זו לטיפול במצבים אחרים.

בנוסף, קיים רק מידע נזогע לבטיחות ארוכת הטווח של **פריזמה/פריזמה** פורטה לגבי גדייה, התבגרות וההתפתחות הנפשית, הרגשות וההתנהגויות בקבוצת גיל זו. למרות זאת, במידה ואתה מתחת לגיל 18, "יתכן כי הרופא שלך ירשום לך **פריזמה/פריזמה** פורטה לטיפול באפיוזודות דייכאון מג'וריותBINONIOT עד חמורות, בשילוב עם טיפול פסיקולוגי, מכיוון שהחליטה שזה לטובתך. אם אתה מתחת לגיל 18 והרופא שלך רשם לך **פריזמה/פריזמה** פורטה, אתה רוצה לדון בכך, אנא חזר לרופא שלך. במידה ואתה מתחת לגיל 18, עליך לידע את הרופא שלך אם אחד מהתרופות המפורטים לעיל מתחפה או מחמיר בעת נתילת **פריזמה/פריזמה** פורטה.

אין להשתמש בפריזמה/פריזמה פורטה בילדים מתחת לגיל 8.

הפרעות בתפקוד המיני

תרופות כמו **פריזמה/פריזמה** פורטה (שנקראות SSRI) עלולות לגרום לתסמינים של תפקוד מיני לקוי (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). במקרים מסוימים, התסמינים הללו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.

אינטראקציות/תגובה בין תרופיות
אם אתה לוקחת, או אם לך תhatt לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופתך.

אין ליטול פריזמה/פריזמה פורטה עט:

- תכשירים מסוימים מסווג **מעכבי מונואמין אוקסידאז בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים (MAOIs)**, שחילקים משמשים לטיפול בדייכאון. אין להשתמש ב-MAOIs בלתי הפיכים שאינם סלקטיביים עם פריזמה/פריזמה פורטה מאחר שעולות להתרחש תגובהות חמורות או אף קטלניות (تسمונת סרוטוניין) (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם אתה" בפרק זה). אפשר להתחילה בטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה אך ורק בחילוף שבועיים לאחר הפסקת הטיפול ב-MAOI בלתי הפיר שאינו סלקטיבי (לדוגמא טרנילציפרומין -tranylcypromine). אין ליטול כל מעכבי מונואמין אוקסידאז בלתי הפיר שאינו סלקטיבי במשך 5 שבועות לאחר הפסקת נתילת פריזמה/פריזמה פורטה. אם **פריזמה/פריזמה** פורטה נרשם לתקופה ממושכת ו/או במינון גבוה, ייתכן כי הרופא יצטרך לשקל מרוחז זמן ממושך יותר מ-5 שבועות.
- **מטופרולול (Metoprolol)** (Isoproterenol) כאשר הוא משמש לטיפול באירוע רפואי לב; קיים סיכון מוגבר לכך שקצב הלב שלך יהפוך לאיטי מדי.

פריזמה/פריזמה פורטה עלול להשפיע על אופן הפעולה של התרופות הבאות (תגובה):

- **טמוקסיפין (Tamoxifen**, משמש לטיפול בסרטן השד); לאחר שפריזמה/פריזמה פורטה עלולה לשנות את הרמות של תרופה זו בدم, דבר העולם להוביל להפחתה אפשרית בהשפעת טמוקסיפין. ייתכן כי הרופא יצטרך לשקל רישום של טיפול אחר נוגד דייכאון.
- **מעכבי מונואמין אוקסידאז A (A-A-MAOI)** לרבות מוקלובמיד (moclobemide), לינזolid, (linezolid), תרופה אנטיבiotית) ומתיל תיוניניום קלורייד (chloride) methylthioninium המcona גם בשם מתילן בול, תרופה המשמשת לטיפול במטהמוגלבינמייה כתוצאה מחשיפה לתרופה או לחומר כימי: בשל הסיכון לתגובהות חמורות או אף קטלניות (تسمונת סרוטוניין). ניתן להתחילה בטיפול בפלואוקסטין ביום שלאחר הפסקת הטיפול ב-MAOIs הפיכים, אך ייתכן כי הרופא ירצה לעקוב אחריך בקפידה ולהשתמש במינון נמוך יותר של תרופה ה-A-MAOI.
- **מקוויטאזין (mequitazine**, לטיפול באלהריגיות), לאחר שנטילת תרופה זו עם **פריזמה/פריזמה** פורטה עלולה להגבר את הסיכון לשינויים בפעולות החשמלית של הלב.

- פניטואין (phenytoin, לטיפול באפילפסיה), לאחר שפריזמה/פריזמה פורטה עלול לשנות את הרמות של תרופה זו בدم, יתכן כי הרופא יctrיך בהתחילה את הטיפול בפניטואין בזיהירות רבה יותר ולבצע בדיקות מעקב בעת מתן עם פריזמה/פריזמה פורטה.
- ליתיום (lithium), סלגיילין (selegiline), היפריקום (St. John's Wort), טרמדול (tramadol), משך כאבים, טריפטנים (tryptans), לטיפול במיגרנה) וטריפטופן (tryptophan): קיימ סיכן מוגבר לתסמנות סרוטוני מותונה, כאשר תרופות אלו ניתןות עם פריזמה/פריזמה פורטה. יתכן כי הרופא יבצע בדיקות מעקב תכופות יותר.
- תרופות העוללות להשפיע על קצב הלב, כגון תרופות נגד הפרעות קצב מהקבוצה IA ו-III, תרופות אנטי-פאסיקטיות (כגון נגזרות פנוטיאזין (phenothiazine), פימוזיד (pimozide), האלופרידול (haloperidol)) נוגדי דיכאון טריציקליים, תכשירים אנטי-מיירוביילים מסוימים (כגון: ספרפלוקסצין (sparfloxacin), מוקסיפלאוקסצין (moxifloxacin) (moxifloxacin), אריתרומיצין במתן תוך וריד IV), טיפול נגד מלריה, בפרט הלופנטרין או אנטי-היסטמינים מסוימים (אסטמיזול (astemizole) (halofantrine) מיזולאסטין (mizolastine)), לאחר שנטילת אחת או יותר מבין התרופות הללו עם פריזמה/פריזמה פורטה עלול להגבר את הסיכון לשינויים בעקבות החשמלית של הלב.
- נוגדי קריישה (כגון ארבפרין (warfarin)), נוגדי דלקת שאים סטרואידים – NSAID (כגון איבופרופין (ibuprofen), דיקלופנאק (diclofenac)), אספירין ותרופות אחרות היכולות לדלול את הדם (לרבות קלוזאפין (clozapine)) המשמש לטיפול בהפרעות נפשיות מסוימות. פריזמה/פריזמה פורטה עלולה לשנות את השפעתן של תרופות אלו על הדם. אם אתה מתחילה או מפסיק את הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה כאשר אתה נוטל ארבפרין, יתכן שהרופא יctrיך לבצע בדיקות מסוימות, להתאים את המינון של נוגד הקריישה ולבדוק אותך לעתים תכופות יותר.
- ציירוהפטדין (cyproheptadine) (הויל באלהגיוט), לאחר שהוא עלול להפחית את השפעתה של פריזמה/פריזמה פורטה.
- תרופות המפחיתות את רמות הנתרן בدم (לרבות תרופות המגבירות את מתן השתן, דסמורפsein (desmopressin), קארבאמאזפין (carbamazepine) ואוקסקרבזפין (oxcarbazepine)), לאחר שתרופות אלו עלולות להגבר את הסיכון לרמות נתרן נמוכות מדי בדם כאשר הן נלקחות יחד עם פריזמה/פריזמה פורטה.
- נוגדי דיכאון כגון נוגדי דיכאון טריציקליים, מעכבי ספייגט סרוטוניים (SSRIs) אחרים או בופרופין (bupropion), מפלוקווין (mefloquine) או כלורוקווין (chloroquine) או מושמשות לטיפול במלריה), טרמדול (tramadol), משמשת לטיפול בכאוב חמור) או תרופות אנטי-פאסיקטיות (כגון פנוטיאזינים (phenothiazines) או בטוטרופנונים (butyrophenones), לאחר שפריזמה/פריזמה פורטה עלולה להגבר את הסיכון לפרקטיים בעת נתילה עם תרופות אלו.
- פלקאייניד (flecainide), פרופא芬ון (propafenone), נביבולול (nebivolol) או אנקאייניד (encaainide), לטיפול בעבויות לב), קארבאמאזפין (carbamazepine), לטיפול באפילפסיה), אטומוקסטיין (atomoxetine) או נוגדי דיכאון טריציקליים (לדוגמת אימיפראמין (imipramine) (desipramine) (desipramine) ואמיטריפטילין (amitriptyline) או ריספרידון (risperidone), לטיפול בסכיזופרניה), לאחר שפריזמה/פריזמה פורטה עלול לשנות את רמות התרופות הללו בדם, יתכן כי הרופא יctrיך להפחית את המינון שלهن בעת מתן עם פריזמה/פריזמה פורטה.

שימוש בתרופה ומזון

אתה יכול לטול פריזמה/פריזמה פורטה עם או ללא מזון, בהתאם להעדרתך.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

עליך להימנע מאלכוהול בעת נתילת תרופה זו.

הירין, הנקה ופוריות

אם את בהירין או מיניקה, חושבת שאתה עשוי להיות בהירין או מתכונת להרות, פני לרופא או לרוקח לייעוץ טרם נתילת תרופה זו.

הירין

שוחחי עם הרופא בהקדם האפשרי אם את בהירין, אם את עשויה להיות בהירין או אם את מתכונת להרות. מחקרים מסוימים תיארו סיכון מוגבר למולדים הפוגעים בלב בתינוקות של אימהות שנטלו פלאוקסטין במהלך חודשי ההירין הראשוניים. באוכלוסייה הכללית, כ-1 מתוך 100 תינוקות בלבד עם מום לבבי. שכיחות זו עלתה לכ-2 מתוך 100 תינוקות בקרב אימהות שנטלו פלאוקסטינן.

כאשר נלקחות במהלך הירון, בפרט ב-3 החודשים האחרונים להירון, תרופות כגון פלאוקסטין עלולות להגביר את הסיכון להפרעה חמורה בתינוקות, המכונה יתר לחץ דם ריאתי מתמשך של היילוד (PPHN), אשר גורם לנשימה מהירה ולמראה כחלחל אצל התינוק. תסמינים אלה מופיעים בדרך כלל במהלך 24 השעות הראשונות לאחר לידת התינוק. אם הדבר מתרחש אצל התינוק בלבד, עליך לפנות לאחות המילדת ואו לרופא באופן מיידי.

אם את נוטלת פריזמה/פריזמה פורטה לאחר סוף הירון, ישנו סיכון מוגבר לדימום כבד מהנרטיקן מייד לאחר הלידה, בעיקר אם סבלת בעבר מהפרעות דימום. הרופא או המילדת צריכים להיות מודעים לכך שאת נוטלת פריזמה/פריזמה פורטה, כך שיוכלו לסייע לך.

רצוי לא להשתמש בטיפול זה במהלך הירון, אלא אם כן התועלת הפוטנציאלית גוברת על הסיכון הפוטנציאלי. לפיכך, את הרופא עשויים לחייב על הפסקה הדרגתית של הטיפול בפריזמה/פריזמה פורטה במהלך ההירון או לפני ההירון. עם זאת, בהתאם לנסיבותך בלבד, הרופא עשוי להצעיך רצוי שתמשיכי ליטול פריזמה/פריזמה פורטה.

יש לנווג במשנה זהירות בעת שימוש בהירון, במיוחד בשלבי ההירון המאוחרים או מייד לפני הלידה, לאור התופעות שלhallן אשר דוחו בילדים: עצבנות, רעד, חולשת שרירים, וכי מתמשך וקשה יניקה או שינה.

הנקה
פלאוקסטין מופרש בחלב אם ועלול לגרום לתופעות לוואי בתינוקות. עליך להניקה אך ורק אם ההנקה היא הכרחית בהחלט. אם ההנקה נשכחת, יתכן כי הרופא ירשום מינון נמוך יותר של התרופה.

פוריות
הודגם כי פלאוקסטין מפחית את איקות הזרע במחקרם בבעלי חיים. באופן תיאורטי, הדבר עלול להשפיע על הפוריות, אך עד כה לא נמצאה השפעה על הפוריות בבני אדם.

ניגזה ושימוש במכונות
תרופות פסיקטורופיות, כגון פריזמה/פריזמה פורטה עלולות להשפיע על השיפוט או הקואורדינציה שלך. אין לנווג או להשתמש במכונות עד אשר תדע כיצד פריזמה/פריזמה פורטה משפיע עליך.

3. כיצד תשמש בתרפיה

יש להשתמש בתרפיה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

מבוגרים

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- **אפיוזדות דיאנון מג'ורי** – המינון המקביל הינו 20 מ"ג ליום. הרופא עשוי לשנות את המינון בהתאם לצורך במשך 3-4 שבועות מתחילת הטיפול. במידת הצורך, המינון עשוי לעלות בהדרגה עד למקסימום של 60 מ"ג ליום. יש להעלות את המינון בדזירות, על מנת להבטיח שnitן המינון האפקטיבי הנמוך ביותר. יתכן ולא תרגיש בשיפור מייד לאחר תחילת הטיפול בתרפיה. זה דבר רגיל כי בדרך כלל שיפור בתסמיני הדיאנון אינו קורה עד לאחר שעוברים מספר שבועות מתחילת הטיפול. יש לטפל במטופלים שסובלים מדיכאון לפחות 6 חודשים לפחות.
- **בולמוס אכילה (בולימייה נרבוצה)** – המינון המקביל הינו 60 מ"ג ליום.
- **הפרעה כפיפות טורדנית (OCD)** – המינון המקביל הינו 20 מ"ג ליום. הרופא עשוי לשנות את המינון בהתאם לצורך לאחר שבועיים של הטיפול. במידת הצורך, המינון עשוי לעלות בהדרגה עד למקסימום של 60 מ"ג ליום. אם לא יהיה שיפור תוך 10 שבועות, הרופא ישקול החלפת הטיפול.

שימוש בילדים וمتבגרים מגיל 8 עד 18 הסובלים מדיכאון:

יש להתחיל בטיפול ולהיות תחת השגחה של רופא מומחה. המינון ההתחלתי הוא 10 מ"ג/יום פלאוקסטין (כהידרוכורט) הנitin כטמייה פומית (יש טיפול של חברה אחרת, שmagua כתמייה).

לאחר 2-1 שבועות, יתכן כי הרופא יעלה את המינון ל-20 מ"ג/יום. יש להעלות את המינון בזהירות כדי להבטיח שאתה מקבל את המינון האפקטיבי הנומך ביותר. ילדים במשקל נמוך עשויים להזדקק למינונים נמוכים יותר. אם ישנה תגובה משמעותית רצון לטיפול, הרופא יבדוק את הצורך בהמשך הטיפול מעבר ל-6 חודשים. אם אין שיפור במשך 9 שבועות, הרופא יעיר מחדש את הטיפול שלו.

- **קשישים** - יש להעלות את המינון בזהירות יתרה והמיןון היומי בדרך כלל לא יעלה על 40 מ"ג. המיןון המקסימלי הינו 60 מ"ג ליום.

• **פרעונות בתפקודי הגוף** – אם הנר סובל מבעיות בכבד או שהנर משתמש בתרופות אחרות שעולות להשဖיע על **פריזמה/פריזמה פורטה**, יתכן והרופא יחליט על מינון נמוך יותר, או יותרן לRICTOL **פריזמה/פריזמה פורטה** פעם ביוםיים.

אין לעבור על המנה המומלצת!

יש לבלווע את הטబליות עם מים. במידת הצורך ניתן לחוץ את הטבליה לשימוש מיידי. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוהה יותר אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. התסמינים של מינון יתר כוללים: בחילות, הקאות, פרכוסים, בעיות לב (כגון קצב לב בלתי סדיר ודום לב), בעיות ריאתיות ושינויים במצב הנפשי הנע מסערת רוחות עד תרדמת.

- אם שכחת לRICTOL תרופה זו בזמן המועד
- אם החמצת מנה, אל תדאגו. עירך לRICTOL את המנה הבאה למחזרת, במועד הרגיל. איןRICTOL מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.
 - נטילת התרופה באוטה השעה כל יום עשוי לעזור לך לRICTOL אותה באופן סדרי. יש להתמיד בטיפול כפי שהומליך על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

- אין להפסיק את נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה** מבל' להתייעץ עם הרופא תחילה, גם כאשר אתה מתחילה לחוש בשיפור בהרגשתך. חשוב שתמשיך לRICTOL את התרופה שלך.
- הקדד להימנע מצב בו יש לך מחסור בטబליות.

אם תפסיק את נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה**, אתה עלול להבחן בתופעות שלhallan (תופעות גמilia): סחרחות, תחושות עקצוץ כגון סיכות ומחטפים, הפרעות שינה (חולומות שנראים מאוד מציאותיים, סיוטי לילה, אי-יכולת לישון), תחושת חוסר מנוחה או סערת רוחות, עיפות חריגה או חולשה, תחושת חרדה, בחילות/קאות, רעד, כאבי ראש.

מרבית האנשים מגלים כי כל התסמינים הכרוכים בהפסקת נטילת **פריזמה/פריזמה פורטה** הם מתונים וחולפים תוך מספר שבועות. אם אתה חוות תסמינים כאשר אתה מפסיק את הטיפול, פנה אל הרופא.

בעת הפסקת הטיפול ב**פריזמה/פריזמה פורטה**, הרופא יעזר לך בהפחחת מינון איטית לאורך שבוע או שניים- הדבר אומר לעזר בהפחחת הסיכוי להופעת תופעות גמilia.

אין לRICTOL תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לואן

כמו לכל תרופה, השימוש בפריזמה/פריזמה פורטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

- אם אתה סובל מחשبات על פגיעה עצמית או התאבדות במועד כלשהו, **פנה מיד לרופא או לבית חולים** (ראה סעיף 2 "מחשבות על התאבדות והחמרת הדיכאון או הפרעות החרדה").
- אם אתה מפתח פריחה או תגובה אלרגית כגון גרד, נפיחות בשפטיים/בלשן או צפוצים/קוצר נשימה, **פסיק מיד את נתילת הטבליות ודוחה לרופא באופן מיידי**.
- אם אתה חש חסר מנוחה ואין יכול לשבת או לעמוד ללא תזוזה, **יתכן כי אתה סובל מאקטיזיה הגברת המינון של פריזמה/פריזמה פורטה עלולה להחמיר את הרגשותך**. אם אתה מרגיש כמתואר לעיל, **פנה לרופא**.
- **דוחה לרופא מיידי** אם העור מתחיל להאדמים או אם העור מתחיל להתקף. תופעה זו היא נדירה מאוד. מפתחות שלפוחיות על פני העור או אם העור מתחיל להתקף. תופעה זו היא נדירה מאוד.

תופעות הלואן השכיחות ביותר (תופעות שמוויות ביותר מ-1 מתוך 10 משתמשים): נדודי שינה, כאב ראש, שלשול, בחילות ותשישות.

- חלק מהמטופלים סבלו מהתופעות שללן:
- **שילוב תסמיינים** (הידועים כ"טסמנת סרוטוניין") לרבות חום בלתי מוסבר עם קצב נשימה או קצב לב מהירים, הצעה, נוקשות שרירים או רעד, הבלבול, סערת רוחות קיצונית או ישנניות (במקרים נדירים בלבד).
 - **תחושים של חולשה**, נמנום או בלבול בעיקר באנשים קשישים ובאנשים קשישים הנוטלים משתנים.
 - **זקפה ממושכת ומכאה**.
 - **עצבנות וסערת רוחות קיצונית**.
 - **בעיות לב**, כגון קצב לב מהיר או בלתי סדיר, עילפון, התמוטטות או סחרחות בעת קימה לעמידה, אשר עלולה להיעד על תפוקוד לקוי של קצב הלב.

אם תסבול מכך מבין תופעות הלואן המפורטו לעיל, עלייך לדוחה לרופא באופן מיידי.

תופעות לוואי נוספת נספotta

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמוויות ב-1-10 מתוך 100 משתמשים):

- **חוור תחושים רעב, ירידה במשקל.**
- **עצבנות, חרדה.**
- **אי-שקט, כושר ריכוז לקו.**
- **תחושים מתח.**
- **ירידה בחשך המיני או בעיות בתפקוד המיני** (לרבות קושי בשימור הזקפה לצורך פעילות מינית).
- **בעיות שינה, חלומות חריגים, עייפות או ישנניות.**
- **סחרחות**
- **שינויי בחוש הטעם.**
- **תനועות רעד בלתי נשלotas.**
- **ראיה מוטשטשת.**
- **תחושים של פעים לב מהירות ובלתי סדיות.**
- **סומך**
- **פיהוקים**
- **קשה עיכול, הקאות.**
- **יובש בפה**
- **פריחה, סרפדת, גרד.**
- **הצעה מופרצת**
- **כאב במפרקים**
- **מתן שחן תכווף יותר.**
- **DIMOM וGINI בלתי מוסבר.**
- **תחושים רעד או צמרמות.**

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שימושיות ב 10-1 מתוך 1000 משתמשים):

- תחושת ניתוק עצם.
- חשיבה מוזרה
- מצב רוח מרומם באופן חריג.
- הפרעות בתפקוד המיני, כולל בעיות ארגזמה, שלעיגים נמשכות לאחר הפסקת הטיפול.
- מחשבות על התאבדות או פגיעה עצמית.
- חיריקת שניינים
- עוויות שרירים, תנעות בלתי רצוניות או בעיות שיווי משקל או קוואורדינציה.
- הפרעת זיכרון
- אישונים מוגדים (מורחבים).
- צלצול באוזניים
- לחץ דם נמוך
- קוצר נשימה
- דימומיים מהרף
- קשיי בליעה
- נשירת שיער
- נתיחה מוגברת לחבורות.
- חברים או דימומיים בלתי מוסברים.
- זעה קרה
- קושי במתן שתן
- תחושת חום או קור.
- תוצאות חריגות בבדיקות כבד.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שימושיות ב 10,000-1 מתוך 10,000 משתמשים):

- רמות נמוכות של מלח בדם.
- ירידה במספר הטסיות בדם, אשר מגבירה את הסיכון לדימום או לחבורות.
- ירידה בספירת תאי דם לבנים.
- התנהגות פרטיאית שאינה טיפוסית.
- הדיזות
- הרגשה סוערת
- התקפי פניקה
- בלבול
- גמגום
- תוקפנות
- פרכוסים
- וסקוליטיס (דלקת בכלי דם).
- נפיחות מהירה ברקומות סביב הצוואר, הפנים, הפה ו/או הגרון.
- כאב בצוואר המוביל מזון או מים לקיבת.
- דלקת כבד
- בעיות ריאתיות
- רגישות לאור השימוש.
- כאב בשירים
- בעיות במתן שתן.
- "צורך חלב".

שכיחות שאינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- דימום כבד מהנרטיק זמן קצר לאחר הלידה (postpartum hemorrhage), ראי סעיף 2"הרין", הנקה ופוריות".

שברים בעצמות- סיכון מוגבר לשברים בעצמות נצפה במטופלים הנוטלים תרופות מסווג זה.

מרבית תופעות הלואוי הללו צפויות להחלוף עם המשך הטיפול.

בילדים ומתבגרים (18-8 שנים):

בנוסף לתופעות הלואן האפשרות המפורחות לעיל, **פריזמה/פריזמה פורטה** עלול להאט את קצב הגידלה או אולי לעכב את התגובה המינית. התנהגוויות הקשורות להتابדות (ניסיון התאבדות ומחשבות אובדניות), עיינות, מאניה ודימומים מהאף דוחו גם הן בדרך כלל בילדים.

אם הופעה תופעת לואן, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לואן
שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לואן

ניתן לדוח על תופעות לואן למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "[דיווח על תופעות לואן עקב טיפול רפואי](#)" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופע המKeySpec לדיווח על תופעות לואן, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.
בנוסף, ניתן לדוח לחברת [אוניפארם בעמ](#).

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם או טווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מואר.
- אין להשאיר תרופות לביב או לאשפפה הביתי. היועץ ברוקח כיצד להשמד תרופות שאין בהן עוד צורך. נקייטה באמצעות אלו תס"ע בשמירה על איכות הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, opadry OY-6503 (blue), opadry OY-6478 (yellow).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

פריזמה: הטבליות ארוזות בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה של **פריזמה** יש 10, 15, 20, 30 או 1,000 טבליות. יתכן ולא כל גדי הארץז מושווים. הטבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן עם קו ח齐יה מצדין אחד, בצבע ירוק בהיר.

פריזמה פורטה: הטבליות ארוזות בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה של **פריזמה פורטה** יש 14, 20, 28 או 30 טבליות. יתכן ולא כל גדי הארץז מושווים. הטבליות מצופות, מאורכota (בצורת קפסולה), עם קו ח齊יה מצדין אחד, בצבע ירוק בהיר.

בעל הרישום וכותבות: אוניפארם בעמ, ת.ד. 16545 16 ת"א, 6116401.
שם היצרן וכותבות: אוניפארם בעמ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פריזמה: 01 28423 01 100 63

פריזמה פורטה: 01 109 71 29386

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך במאי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.