

ميموريت 10

أقراص

المادة الفعالة وكيمييتها:

يحتوي كل قرص من ميموريت 10 على:
10 ملغ من دونبيپيريل هيدروكلورايد

Donepezil Hydrochloride 10 mg

المواد غير فعالة ومواد التحسasse في المستحضر:
أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"
والفقرة 6 "معلومات إضافية" في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلطة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
احفظ هذه النشرة، من الجائز أن ترتفع في المucken بها تائياً.
وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا أن حاليهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟
لعلاج الخرف الخفيف حتى المتوسط لمرض ألزهايمر.

الفصيلة العلاجية: من مثبطات الإنزيم أسيتيل كولين إستران.
يتدخل الأسيتيل كولين بمسيرات الذاكرة في الدماغ. دونبيپيريل يرفع كمية الأسيتيل كولين وذلك بتثبيط عملية تفككه التي تتم بواسطة أسيتيل كولين إستران. يستعمل دونبيپيريل لعلاج أمراض ألزهايمر مثل تزاييف فقدان الذاكرة، إرتباك وتعيرات سلوكيّة، التي تتحقّق الضّرر بمنطّع الحياة السليم للمتعلّجين.
الدواء مخصوص للذكور فقط.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
• كنت حساساً (أيبرجي) للمادة الفعالة دونبيپيريل
هيدروكلورايد، المشتقّات الـ بيبيديدين أو وكل واحد من
المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء [أنظر الفقرة
6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة].

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
قبل الدراج بـ ميموريت 10 إحلل للطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

• ترقّحات في المعدة أو في الإثنان عشر.
• نوبات أو شنقفات.

• مرض قلبي (نظم قلب غير منتظم أو بطيء جداً، قصور القلب أو إحتشاء عضلة القلب).

• حالة قلبية تسمى "إطالة مقطع QT" أو سابقة لم الشكّة في نظم القلب تسمى "تورساد دي بوانت (Torsade de Pointes)." QT

• إنخفاض نسب المغنتيزيوم أو البوتاسيوم في الدم.

• ربو أو مرض رئوي مزمن آخر.

• مشاكل في الكبد أو التهاب في الكبد (hepatitis).

• صعوبة في التبول أو مرض كولي معден.

بالإضافة لذلك، إحكى للطبيب إذا كنت حاملاً أو تعقددين

بأنك حامل.

بإمكان المعالجين الذين لديهم مرض كولي إستعمال

ميموريت 10، لكن يجب استشارة الطبيب.

المعالجون الذين لديهم مرض كولي خفيف حتى متوسط

يكتّم إستعمال ميموريت 10، ولكن يجب استشارة الطبيب.

لا يوصى بإستعمال الدواء لدى معالجين لديهم مرض شديد

في الكبد.

الأطفال والراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما

في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية،

أو حمل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، لأن هذه الأدوية قد

تؤثر على جاذبية ميموريت 10، بالعكس إذا كنت تتناول:

أدوية لاصطربات نظم القلب، مثل أميدوراون، سوتالول.

أدوية مضادة للاكتئاب، مثل سيتالوپرام، إيسیتاپورام،

اميترپيتلين، فلاؤكسيتين.

أدوية مضادة للأضطرابات النفسية مثل بيموزيد، سيرتیندول،

زيباراسيدون.

مضادات بويرو، مثل كلاريتروميسين، إيدريتروميسين،

ليفوافوكساسيين، موکسیفلوكساسيين، روپافاميسين.

أدوية لعلاج الفطريات مثل كيتوكونازول.

أدوية أخرى مثل أرثرايبر، مثل جلاتاماتين.

مسكّنات الآلام أو أدوية لعلاج التهاب المفاصل، مثل أسيبرين،

إيبوبروفين أو بيكوفيناك صوديوم.

أدوية مضادة للغفل الكوليئي، مثل تولتيرودين.

أدوية مضادة للإختلالات (الصرع)، مثل فينি�توين أو

كاربامازيبين.

أدوية لعلاج الأمراض القلبية، مثل كيندين أو حاجبات بيتا

(متالاً بروپانولول وأپينتولول).

أدوية لإرخاء العضلات، مثل دازيبام، سوكسيدين كولي.

أدوية للتهدير العام.

أدوية بدون وصفة طبية بما في ذلك النباتات الطبية.

في حال كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية تتطلب التخدير

العام، يجب إبلاغ الطبيب المُحدّر والطبيب المعالج بذلك

تناول ميموريت 10. قد يؤثّر ميموريت 10 على كمية

المادة المخدرة اللازمة.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي من هو مُعالجه. بإمكان

العاجل مساعدتك على تناول الأدوية كما ينبع.

استعمال ميموريت 10 مع الطعام

لا يوجد للطعام ثأثير على عمل الدواء.

استعمال ميموريت 10 واستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول أثناء العلاج - ميموريت 10. قد

يؤثر الكحول على عمل الدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخطفين

الحمل، فيجب استشارة الطبيب قبل إستعمال ميموريت 10.

لا يجوز إستعمال ميموريت 10 خلال فترة الرضاعة.

السيادة واستعمال الماكولات

لا يجوز السيادة أو تنشيف الماكولات الخطيرة أثناء إستعمال

الدواء وذلك لأن مرض ألزهايمر قد يضيق من فدكتك على

السيادة أو تنشيف ماكولات أو أحجزة خطيرة، من أجل سلامتك،

ممنوع عليك القيام بذلك الشاشات، إلا إذا ممك للكليب بذلك.

ذلك، فإن ميموريت 10 قد يسبب إرهاق، دور ونفقات

عضلية، في حال ظهور هذه الأعراض، فلا يجوز السيادة أو

تشغيل ماكولات أو أحجزة خطيرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز. إذا قبل لك من قبل طبيبك بأنك

حساس لسكرات معيينة، فيجب استشارة الطبيب قبل بدء

العلاج - ميموريت 10.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

• يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

• عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً

بخصوص المقدار الدوائي وطريق العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريق العلاج يحددان من قبل الطبيب

فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو:

مقدار الدوائي الإعتيادي عادة يجب تناول نصف قرص من

ميموريت 10 (5 ملجم) كل ليلة. بعد شهر، من الجائز أن

يوصي لك الطبيب بتناول ميموريت 10 (10 ملجم) كل ليلة.

قد يتغير عيار الدواء وقوض الفترة الزمنية التي تتناول فيها

الدواء وحسب توصية الطبيب.

- المقدار الدوائي الأعظمي الموصى به هو 10 ملغ ميموريت

10 كل ليلة.

- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به! لا يجوز

تغير المقدار الدوائي بدون تعليمات من الطبيب.

يجب المواطنة على العلاج - ميموريت 10 كما أوصي

به من قبل الطبيب.

مدة العلاج بـ ميموريت 10:

عليك التوجه إلى الطبيب من حين آخر خلال العلاج وذلك

لتقييم الأعراض والعلاج.

طريقة التناول:

يجب تناول قرص ميموريت 10 بشكله الكامل مع القليل

من الماء قبل النوم.

في حالات اضطرابات النوم التي تشمل أحلام غريبة، كوابيس أو

أرق يجب التفكير في تناول أقراص ميموريت 10 في الصباح.



- التبيّل عن أعراض جانبية**
بالإمكان التبيّل عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الخطط على الرابط [١]التبيّل عن أعراض جانبية عقب صدوره على الملفة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبيّل عن أعراض جانبية. أو عن طريق تصفّح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.ض.".

(5) كيفية تخزين الدواء؟

 - تجنب التسمم: يجب حفظ الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عنتناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الاطفال، وذلك لفاداري إصابةتهم بالتسنم.
 - التفتيّق دون تعليمات صريحة من الطبيب.
 - لا يجوز إستعمال الدوا بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على علبة الكرتون وعبوة البليستير.
 - يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
 - يجب تخزين الدواء درجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان محظى من الضوء.
 - لا يجوز إقاء أدوية إلى مياه المجاري أو القمامات المنزلية.
 - إسال الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية لم تعد بحاجتها. إن إخاذ هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة العاملة أيضاً على:

Microcrystalline Cellulose, Lactose (anhydrous), Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Opadry Y-1-7000.

يحتوي قرص ميموريت 10 على 80 ملء لكتوز لا مائي.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص ميموريت 10 مطلية، بيضاء، مستديرة، محدبة الجانبيين ذات خط للشرط في جانب واحد.

ميموريت 10 معيناً ضمن لوحيات (بيسيدت) يتم إدخالها داخل قلة هدوء، سلوك عداونى، إغماء، دوار، اتزاع في البطن، مفعح، قلة السيطرة على التبول، أم، حوادث (متungan) يملون أكثر للسقوط والإصابة).

أعراض جانبية شائعة (common) تظهر بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 10:

تقاصات ضلائية، إرهاق، أرق، رعش، هلوات (روبة) وسامع أشياء غير موجودة فعلياً في الواقع، أحلام، غريبة تتشكل كوايس، قلة هدوء، سلوك عداونى، إغماء، دوار، اتزاع في البطن، مفعح، قلة السيطرة على التبول، أم، حوادث (متungan) يملون أكثر للسقوط والإصابة).

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) تظهر بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 100:

تباكي، نظم القلب، تزايد إفراز اللعاب.

أعراض جانبية نادرة (rare) تظهر بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 1,000:

تصلب، رجفان، حرکات لا إرادية بالأخص للوجه واللسان بل للطرف أيضاً.

أعراض جانبية شيوها غير معروف (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

غيرات في شباط القلب التي يمكن ملاحظتها في التخطيط الكهربائي (القلب - ECG) - "طالة مقطع QT".

زيادة في الرغبة الجنسية، فرط النشاط الجنسي.

متلازمة بيزنا ("Pisa syndrome") التي تتجلى بقلصن لا إرادى للعضلات، مع ميل شاذ للجسم والرأس إلى جانب واحد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تتعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• اختلالات أو تشنجات (ظهور بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 100).

• سخونة متقدمة تترافق بتصبص العضلات، تعرق أو تدنس مستوى الوعي (اضطراب يسمى متلازمة مصادفات NMS=Neuroleptic Malignant [Syndrome]) (ظهور بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 10,000).

• ضعف حساسية أو ألم في العضلات، خاصة إذا شعرت في نفس الوقت بذلك مرض، لديك سخونة أو ميل داكن. هذه العلامات قد تكون سبباً لها حالة غير طبيعية لتفكير النسيج العضلي، التي قد تشكل خطراً على الحياة وتسبب مشاكل في الكلى (هذه الحالة تسمى إنحلال العضلات المخططة، أو rhabdomyolysis) (ظهور بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 10,000).

• بضم سريع، غير منتظم وإنما، يمكن أن تكون أعراضًا حالات تشكل خطراً على الحياة والتي تعرف باسم تورساد دي بوانت (Torsade de Pointes)، لا يمكن تقييم الشيوخ من المعلومات السريرية المتوفرة.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10:

إسهال، صداع.

في حال توقيف عن تناول ميموريت 10:

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء، إلا إذا أوصى الطبيب بفعل ذلك. في حال توقيف عن تناول ميموريت 10، فإن فوائد العلاج تناقص تدريجياً، لكن التوقف عن العلاج يجب مناقشة الطبيب أو الصيدلي حول العواقب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال ميموريت 10، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميموريت 10 قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز لأن تعانى أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

عليك التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الخطيرة التالية، غالباً ما تتحاجن لعلاج طبي طارئ:

ضرر الكبد إلى إثبات الكبد (hepatitis). (أعراض التهاب الكبد هي: غثيان، تقيؤات، فقدان الشهية للطعام، شعور عام سيء، سخونة، حكة، إصفار الجلد والعينين وبول بلون داكن (ظهور بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 1,000).

قرحات في المعدة أو في الإثناعشر. الأعراض هي: ألام في البطن وإنزعاج (الشعور بمشاكل في الهضم) في منطقة البطن بين السرة وعظم الصدر (ظهور بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 100).

نزف في المريء بفتحة الشرج (ظهور بشيوع قدره حتى مستعمل واحد من بين 100).

إذا دعت الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الغوري. لا توفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً أو وائياً أكبر من ميموريت 10:

أو إذا إلزام طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجيه فوراً إلى الطبيب أو إلى النشرة الطبية وما تبقى من الأقراص. مركب علىة الدوا، النشرة الطبية وما تبقى من المقدار المفترض من ميموريت 10 يمكن أن تشمل غثيان وتققيؤات، سيلان اللعاب، تعرق، نظم قلب بطيء، إختناق ضغط الدم (الوقف)، صعوبة في التنفس، فقدان الوعي، اختلالات أو تشنجات.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول ميموريت 10 في الوقت المحدد، فلا يجوزتناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسى. تناول المقدار الدوائي القادر في الوقت الإعتيادي واستشارة الطبيب. إذا نسيت تناول ميموريت 10 لفترة تزيد عن الأسبوع، استشر الطبيب قبل أن تعاود تناول ميموريت 10. يجب المواظفة على العلاج بالدواء ميموريت 10 حسب توصية الطبيب. لا يجوز إيقاف الملاجء بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.