

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 -

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

זווים רליף דואל רליס

כמוסות, 75 מ"ג

חומר פעיל:

כל כמוסה מכילה:

דיקלופנאק סודיום 75 מ"ג

25] מ"ג.דיקלופנאק סודיום עמיד לחומציות הקיבה (לשחרור מיידי) + 50 מ"ג דיקלופנאק סודיום בשחרור מושהך].

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה להשתמש בתרופה זו?

סוויס רליף דואל רליס הינו תכשיר נוגד דלקת שאינו סטרואידי ומשכך כאבים המשמש לטיפול בתסמינים של: דלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis), דלקת מפרקים ניוונית (osteoarthritis), דלקת חוליות קמפחט (ankylosing spondylitis), הפרעות הריות של מערכת השרירים והשלד, כגון דלקת סובבת מפרק (periarthritis), דלקת הגיד (tendinitis), דלקת במעטפת הגיד (tenosynovitis), דלקת הכתם (bursitis), נקעים, מתחונת ופריקה, שיכוך כאבים הנגרמים כתוצאה ממשרבים, כאבי גב תחתון, נידודן (gout) חרף, מחלת מפרקים ספחית(psoriatic arthopathy).

דיכופנאק בכאב ובדלקת הקשורים לניתוחים אורתופדיים, דנטליים ומינוניים.

מאחר שהשחרור של החומר הפעיל דיקלופנאק משהך, סוויס רליף דואל רליס אינו מתאים לטיפול במצבים בהם נדרשת השפעה מהירה של התרופה.

קבוצה תרופוטית: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דיקלופנאק סודיום או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אמו מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף" בעלון).

אתה סובל כעת או שסבלת אי פעם מכיב חזרן בקיבה או בתריסריון (כיב פפטי) או דימום במעי (לפחות 2 אי-רועים שונים מוכחים של כיבים או דימומים).

סבלת בעבר מתגובה אלרגית לחומצה אצטיל-סליצילית (אספירין) או לנכסלים NSAIDs אחרים. התגובה יכולה לכלול אסתמה, נפיחות של הרקמה היררית באף או תגובות עוריות.

אתה סובל מהפרעה בלתי מוסכרת במערכת הדם.

סבלת אי פעם מדימומים או מהתנקבות במערכת העיכול הקשורים לטיפול קודם ב-NSAID.

אתה סובל מדימום מוחי (דם צרברי-וסקולרי) או מדימום פעיל אחר.

אתה סובל ממחלה חמורה של הכבד או הכליות.

אובחנת עם מחלה לבבית ו/או מחלת כלי דם מוחיים (צרברי-וסקולרית), לדוגמה אם עברת התקף לב, אירוע מוחי (שבץ) או אירוע מוחי חולף (TIA), אם הינך סובל מחסימות בכלי הדם המובילים אל הלב או המוח או עברת ניתוח לפתיחת חסימות או למעקב חסימת שכלכה.

אתה סובל או עברת מבעיות ברימת הדם (מחלת של העוקבים העיניים).

אתה סובל מאי ספיקת לב חמורה.

הינך בשליש האחרון להיריון.

התרופה אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים מאחר שתכולת החומר הפעיל בה היא גבוהה מדי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בסוויס רליף דואל רליס, ספר לרופא אם אתה:

- מעשן.
- סובל מסוכרת.
- סובל מתערקת חזה, קרישי דם; יתר לחץ דם, רמה גבוהה של כולסטרול או טריגליצרידים בדם.
- עומד לעבור או עברת לאחרונה ניתוח בקיבה או במעי לפני ניתוח סוויס רליף דואל רליס, היות שלעיתים התרופה עלולה לעכב את ריפוי הפצעים במעי לאחר הניתוח.

חושב שאתה עלול להיות רגיש (אלרגי) לדיקלופנאק סודיום, אספירין, איבופרופן או לתכשירי NSAIDs אחרים או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של סוויס רליף דואל רליס (המפורטים בסוף עלון זה). סימנים של תגובה אלרגית כוללים:

התנחול של הפנים והפה (אנגיאדומה), קשיי נשימה, כאב בחזה, נזלת, פריחה בעור או כל תגובה אלרגית אחרת.

ביטוח במערכת העיכול:

יש להימנע מנטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תכשירי NSAIDs אחרים, לרבות מעכבי COX-2 (cyclo-oxygenase-2).

ניתן להפחית את תופעות הלוואי באמצעות נטילת המינון היעיל הנמוך ביותר למשך פרק הזמן הקצר ביותר הדרוש להקלה על התסמינים.

מטופלים קשישים:

במטופלים קשישים, תופעות הלוואי הן שכיחות יותר לאחר נטילת תכשירי NSAIDs, במיוחד דימומים והתנקבות בקיבה ובמעי, אשר עלולות להיות מסכנות חיים. לפיכך, במטופלים קשישים נדרש מעקב קפדני של הרופא במהלך הטיפול.

דימומים, כיבים והתנקבויות במערכת העיכול:

דימומים, כיבים והתנקבויות במערכת העיכול, שיכולים להיות קטלניים, דווחו בעת שימוש בכל תכשירי NSAIDs. זהו יכולים להתרחש בכל שלב במהלך הטיפול, עם או ללא תסמינים אזהרה קודמים או היסטוריה של אירועים חמורים בעבריים. העיכול.

מטופלים בעלי היסטוריה של כיבים, במיוחד עם סיבוכים מלווים בדימום או בהתנקבות (ראה סעיף 2 "מידע נוסף" בתרופה אם) ו/או קשישים, השכיחן דימומים, כיבים והתנקבויות במערכת העיכול גבוה יותר בכל שהמינון של תשכיר ה-NSAID גבוה יותר. במקרים אלה, על המטופלים להתחיל טיפול במינון הנמוך ביותר האפשרי.

עבור מטופלים אלה, וכן במקרים בהם הטיפול כולל חומצה אצטיל-סליצילית (אספירין) במינון נמוך או תרופות אחרות העלולות להגביר את הסיכון לתופעות אלו, צריעות מלולות דם כגון וארפרין או לשקול טיפול משולב עם תרופות המגנות על רירית הקיבה (כגון מיסופרוסטול או מעכבי משאבת הפרוטונים).

אם יש לך היסטוריה של תופעות לוואי במערכת העיכול, במיוחד אם אתה קשיש, עליך לדווח על כל התסמינים הבטניים החריגים (במיוחד דימום במערכת העיכול), במיוחד בחילות, טפולים.

מומלץ לנהוג במשנה זהירות אם אתה נוטל בו-זמנית תרופות העלולות להגביר את הסיכון לכיבים או לדימום, כגון קורטיקוסטרואידים במתן דרך הפה, תרופות מדלולות דם כגון וארפרין או מעכבי סלקטיביים של ספיגה צומדת של טסיות דם כגון אספירין (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופותיה").

יש להפסיק את נטילת סוויס רליף דואל רליס במקרה של דימום או כיב במערכת העיכול.

יש לנהוג משנה זהירות בעת נטילת תכשירי NSAIDs במטופלים בעלי היסטוריה של מחלת מערכת העיכול (דלקת כיבית של המעי הגס, מחלת קרוהן) מאחר שמצבם עלול להחמיר (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

השפעות על הלב וכלי הדם:

יתכן שנטילת תרופות כגון סוויס רליף דואל רליס יכולה להיות מיוחסת לעלייה קטנה בסיכון להתקף לב או שבץ. בכיב כיב הטיפול גבוה יותר במינונים גבוהים ובטיפול ממושך. אין לעבור על המינון או משך הטיפול המומלצים.

אם אתה סובל מבעיות לב, או אם היה לך שבץ או שאתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון למצבים אלו (לדוגמה, אם אתה סובל מלחץ דם גבוה, סוכרת או מחלת כולסטרול גבוהות, או אם אתה מעשן), יש להיוועץ ברופא לגבי הטיפול.

אסור להעלות מינון מעבר ל-100 מ"ג ליום, אם אתה מטופל למשך יותר מארבעה שבועות, מאחר שהסיכון להתקדידיוסנקוזיס עלולים לעלות עם העלייה במנה ומשך הטיפול. יש להשתמש במינון היעיל הנמוך ביותר למשך הזמן הקצר ביותר.

הגברת עורריות:

תגובות עורריות חמורות, חלקן קטלניות (דרמטיטיס אקספוליאטיבית- דלקת עור עם דלקתולפת ונירית של העור, תסמונת סינטיב-ד'אוסון[ונמק [קרוקיליון] טוקי של אספירין/סומן/סומנת ליליל) דווחו במקרים נדירים מאוד בעת טיפול ב-NSAIDs (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). נראה כי הסיכון הגבוה ביותר לתגובות מסוג זה מתחילת הטיפול, כאשר במרבית המקרים, תגובות זאת התרחשו במהלך החדש הראשון לטיפול. יש להפסיק לטול סוויס רליף דואל רליס ולהיוועץ ברופא או במיידית עם הפועת הסימנים הראשונים באופן קפדני.

במטופלים עוברים, נגעים בקרומים הירריים או סימנים אחרים של שלשהם יש רגישות יתר.

השפעות על הכבד:

אם המטופל סובל מבעיות כבד, יש לשוחח עם הרופא לפני תחילת הטיפול. היות שהטיפול בדיקלופנאק עלול לגרום להחמרת כאשר ניתן לטיפול ממושך או חזר בסוויס רליף דואל רליס, הרופא ינטר באופן סדיר את תפקוד הכבד ואת כאמצעי זהירות.

אם מתפתחים סימנים קליניים חריגים או לחמלת כבד, יש להפסיק באופן מיידי את הטיפול בסוויס רליף דואל רליס.

מידע נוסף:

יש להשתמש בסוויס רליף דואל רליס אך ורק לאחר הערכת זהירה של יחס סיכון/תועלת במקרה של:

הפרעה מולדת במערכת הדם (כגון acute porphyria – intermittent) סופרייריה מפורחה המתרחשת לסיורגין.)

זאבת אדמנית במערכתית, מחלת רקמת חיבור מפוצלת או מחלה דומה.

פינוק רפואי קטנה בנפש:

○ מייד לאחר ניתוח משמעותי.

○ במטופלים עם אלרגיות, אסתמה, תגובות עוריות לתרופות אחרות, סוכרת, גודות (החתן), נפיחות כרומית של הרקמה היררית באף או מחלה נשמית כרונית הכרוכה בהצרת דרכי האוויר.

○ גמבוטופלים עם בעיות בכליה או בכבד.

תגובות רגישות יתר חריפות חמורות כגון שוק אנאפילקטי דווחו במקרים נדירים מאד. יש להפסיק לטול סוויס רליף דואל רליס עם תופעות הסימנים הראשונים של תגובת רגישות יתר ולקוות בליכים הנדרשים על מנת להקל על התסמינים.

דיקלופנאק יכול להפחית באופן זמני את היכולת של הדם להיקרש. לפיכך מטופלים הסובלים מהפרעות קרישה חייבים להיות מנוטרים באופן קפדני על ידי הרופא.

בדומה ל-NSAIDs אחרים, דיקלופנאק יכול למשך את הסימנים והתסמינים של זיהום. אם הינך מבחין בסימנים אלה (כגון אודם, נפיחות, תחושת חום, כאב וחום גבוה) או החמרה של זיהום קיים במהלך נטילת סוויס רליף דואל רליס, יש לפנות לרופא מייד.

אם אתה נוטל תרופות נוגדות קרישה או הורדת רמות הסוכר בדם, הרופא ינטר באופן סדיר את הרמות בדם כאמצעי זהירות.

במהלך שימוש ממושך בסוויס רליף דואל רליס, הרופא ינטר באופן סדיר את תפקוד הכליות ונטילת בדיקת הרמות בדם.

אם אתה נוטל סוויס רליף דואל רליס לפני ניתוח, דווח על כך לרופא או לרופא השניים.

שימוש ממושך במשככי כאבים יכול לגרום לכאבי ראש. אין לטפל בכאבי ראש במינונים מוגברים של התרופה, שוחם עם הרופא שלך אם אתה סובל מכאבי ראש תכופים במהלך נטילת סוויס רליף דואל רליס.

אם אתה נוטל משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

לדומה לתרופות אחרות המכשככים ניתוח פרוטסטגלדין, סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

ילדים ובמתבגרים

ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.

● ישמשו בילדים ובמתבגרים, ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

אינטראקציות/תגובות בין תרופות, או אתה לוקח, או אתה לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ולרופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

● דיגוקסין (לחיווך הלב), פניטואן (טיפול בפרכוסים) או ליתיום (לטיפול במחלות נפשיות). נטילת סוויס רליף דואל רליס בו-זמנית עם תרופות אלו יכולה להעלות את ריכוזן של תרופות אלו אם את סובלת מקשי לחרות.

● נטילת משככי כאבים בו-זמני עם קבוצת תכשירי משככי כאבים, עלולה להוביל לנזק תמידי לכליות לואי ספיקת כליות (analgesic nephropathy) – נגיעה כלייתית בשל נטילת משככי כאבים).

● סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לך לקשת לחרות. עליך לדווח לרופא אם את מנסה להרות או אם את סובלת מקשי לחרות.