

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקנירים) התשמ"ג - 1986
התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד.

**אנברל[™] 25 מ"ג תמייסה להזרקה
אנברל[™] 50 מ"ג תמייסה להזרקה**
תמייסה מוכנה להזרקה תת עורית

החומר הפעיל וכמותו:

אנברל 25 מ"ג תמייסה להזרקה: אטנרספט 50 מ"ג/מ"ל etanercept 50 mg/ml
אנברל 50 מ"ג תמייסה להזרקה: אטנרספט 50 מ"ג/מ"ל etanercept 50 mg/ml
חומרם בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העlion עד סופו בטרם תשתחם בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה/עבור ידך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם
נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעיון, לתקנירים אנברל 25 מ"ג תמייסה להזרקה ואנברל 50 מ"ג תמייסה להזרקה קיימים
כרטיסים מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחות חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת
הטיפול ובמהלך הטיפול באנברל 25 מ"ג תמייסה להזרקה או באנברל 50 מ"ג תמייסה להזרקה
ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיסים מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצריכן בטרם תחילת השימוש
בתקניר. יש לשמר את הכרטיסים לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

אנברל מיועדת לטיפול במוגרים להתוויות הבאות:

- **דלקת מפרקים שיגרונית (rheumatoid arthritis)** פעילה במוגרים בהם טיפול עם תרופות
אנטי ריאומטיות המשפיעות על מהלך המחלה (DMARDs), כולל מתוטרקסאט, אינו מספק; ניתן
להשתמש באנברל בשילוב עם מתוטרקסאט במטופלים אשר לא הגיעו לצורך מספקת לטיפול
עם מתוטרקסאט בלבד.
- **דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis)** פעילה ומתקדמת במוגרים בהם טיפול עם
תרופות אנטי ריאומטיות המשפיעות על מהלך המחלה (DMARDs) אינו מספק.
- **דלקת חוליות (axial spondyloarthritis):**
 - **דלקת חוליות ללא עדויות דיזוגרפיות (non radiographic axial spondyloarthritis)** פעילה וחמורה במוגרים שלא הגיעו לצורך מספקת לטיפול עם תקנירים נגד דלקת שאינם
סטרואידים (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs).
 - **דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis)** חמורה ופעילה, במוגרים אשר לא
הגיעו לצורך מספקת לטיפול מוגבל אחר.
- **ספחת רוביית (plaque psoriasis)** מתונה או חמורה במוגרים אשר מועמדים לטיפול
סיסטמי (מערכת) או טיפול באור.

אנברל מיועדת לטיפול בילדים ומוגרים להתוויות הבאות:

• דלקת מפרקית אידיופטית של גיל הילדות (juvenile idiopathic arthritis):

- רב שיגרון (polyarthritis) [גורם ריאומי חיבובי או שלילי] ואוליגו-ארתריטיס נרחבת
(extended oligoarthritis), בילדים ומוגרים מגיל שנתיים אשר לא הגיעו לצורך מספקת
لطיפול עם מתוטרקסאט או שאינם יכולים לקבל מתוטרקסאט.
- דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis) בילדים ומוגרים מגיל 12 אשר לא הגיעו
בצורה מספקת לטיפול עם מתוטרקסאט או שאינם יכולים לקבל מתוטרקסאט.

- דלקת מפרקים נלוית לאנטזיטיס (enthesitis related arthritis), ילדים ומתבגרים מגיל 12, אשר לא הגיעו לצורה מספקת לטיפול או שאינם יכולים לקבל טיפול מקובל אחר.
- **ספחת רובדית (psoriasis plaque psoriasis)** חמורה כרונית ילדים ומתבגרים מגיל 6 אשר לא הגיעו לצורה מספקת, או שאינם יכולים לקבל טיפול סיסטמי (מערכת), או טיפול באור.

קבוצה רפואיית: חסם TNF ומדכא סלקטיבי של מערכת החיסון

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה/הילד רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אטנרספט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6). אם אתה/הילד חש בתגובה אלרגית כגון לחץ בחזה, צפופים, סחרורת או פריחה, אין להמשיך בהזרקה אנברל ויש לפנות לרופא מיד.
- אתה/הילד סובל מזמן חמור בדם או נמצא בסיכון לפתח זיהום חמור בדם הנקרא ספסיא (אלהם דם).
- אתה/הילד סובל מזמן חמום מסווג כלשהו.

ażhorot miyohdot haengutot leshimush batrufah:

- **ניסיiges bagil haforiot:** יש להשתמש באמצעות מנעה בתקופת הטיפולanganerl ובמשך שלושה שבועות לאחר סיום הטיפולanganerl. ראי מידע נוסף בסעיף "הירון והנקה".
- **יש לפנות לרופא מיד אם** אתה/הילד חש בתגובה אלרגית כגון לחץ בחזה, צפופים, סחרורת או פריחה. במקירה זה אין להמשיך בהזרקה אנברל.
- **ספר לרופא אם** יש לילד היסטוריה של זיהומים חוזרים ונשנים, או אם אתה/הילד סובל מסוכרת או מצב אחר העולם להגביר את הסיכון לדיזום.
- **יש לפנות לרופא מיד אם** אתה/הילד נסעת לאחרונה לחו"ל ואתה/הילד מפתח תסמיין זיהום כגון חום, צמרמות או שיעול. יתכן שהרופא יחליט על המשך מעקב אחרי זיהומים לאחר סיום הטיפולanganerl.
- **לפני התחלת הטיפולanganerl** הרופא יבודק תסמיין וסימני שחפת מכיוון שדווחו מקרים, שחפתה במטופליםanganerl. הבדיקה לשחפת יכולה לכלול סקרת ההיסטוריה הרפואית, צילום רנטגן ובדיקה מנטו.
- **ספר לרופא אם** אתה/הילד סובל או סבל/ת משחפת או אם אתה או הילד הייתה/היה בפגע עם אדם שסובל או סבל משחפת.
- **יש לפנות לרופא מיד אם** מופיעים תסמיין שחפת (כגון שיעול ממושך, ירידת בمشקל, עייפות וחום מתון) או תסמים של כל זיהום אחר בתקופת הטיפולanganerl או לאחר סיום הטיפולanganerl.
- **יש לפנות לרופא מיד אם** מופיעים תסמיין שחפת (כגון חום ממושך, כאב גרון, נתיחה לשטפי דם תת עורית, דימום או חיוורון. תסמים אלו עלולים להצביע על הפרעות דם מסכנות חיים הדורשות הפסיקת טיפולanganerl.
- **ספר לרופא אם** ליר/ילד יש הפטיטיס B או אם היה ליר/ילד הפטיטיס B בעבר.
- **לפני התחלת הטיפולanganerl** הרופא יבודק הימצאות של דלקת כבד נגיפית מסווג B (הפטיטיס B).
- הטיפולanganerl עלול לגרום לחזרה של המחלת למטופלים שנדרבקו בעבר בוירוס ההפטיטיס B. במקרה של חזרת המחלת, יש להפסיק את הטיפולanganerlanganerl.
- **ספר לרופא אם** אתה/הילד סובל מדלקת כבד נגיפית מסווג C (הפטיטיס C). יתכן שהרופא יעקוב אחר הטיפולanganerlanganerl במקרה והזיהום חממיר.
- **ספר לרופא אם** אתה/הילד סובל מטרשת נפוצה, מדלקת בעצב הראי או מדלקת בחות השדרה בכדי שהיא ניתן לקבוע האם הטיפולanganerlanganerl מתאים עבורך.
- **ספר לרופא אם** יש ליר/ילד היסטוריה של אי ספיקת לב גdotsית מפני שיש לנוקוט בזיהירות במקרה זה.

- **ספר לרופא אם אתה/הילד נחשף/ת לאבעבועות רוח בתקופת הטיפול באנברל.** הרופא יקבע אם יש צורך בטיפול מונע.
- **לפני התחלת הטיפול באנברל ספר לרופא אם ידועה למשתמש או לאדם שמצריך את התויטה רגישות יתר (אלרגיה) לטלקס מפני שכיסוי המחת של המזרק עשוי מלטיקס (גומי טבעי יבש).**
- **ספר לרופא אם יש לך/לילד היסטוריה של התמכרות לאלכוהול.** אין להשתמש באנברל לטיפול בהפטיטיס אלכוהולי.
- **ספר לרופא אם אתה/הילד סובל מדלקת כליה דם מסוג וגנר (eosinophilic granulomatosis, wegener's granulomatosis), מפני שאנברל לא מומלצת לטיפול במחלת נדירה זו.**
- **ספר לרופא אם אתה/הילד סובל מסוכרת /או נוטל תרופות לטיפול בסוכרת.** הרופא ישකול האם יש צורך בההתאמת מינוני התרופות לסוכרת בתקופת הטיפול באנברל.
- **לפני התחלת הטיפול באנברל, ספר לרופא אם אתה/הילד חוללה בסרטן (לדוגמא לימפומה) או אם יש לך/לילד היסטוריה של סרטן.** אנברל עלולה להעלות את הסיכון ללקות הסרטן.
- **מטופלים הסובלים מדלקת מפרקים שיגרונית חמורה במשך תקופה ארוכה עלולים להיות בסיכון מגבר לפתח לימפומה.**
- **ילדים ומבוגרים המטופלים באנברל עלולים להיות בסיכון מגבר לפתח לימפומה או כל סרטן אחר.**
- **מספר ילדים ומתבגרים אשר טופלו באנברל או בכל תרופה אחרת הפועלת בצורה דומה לאנברל, פיתחו סרטן, כולל סוגים חריגיים של סרטן, שלעיתים גרם לממות.**
- **דווחו מספר מקרים שבהם חולמים הנוטלים אנברל פיתחו סוגים שונים של סרטן העור. לכן, יש להיות במעקב צמוד של הרופא המטפל ולבצע בדיקות עור תקופתיות. יש לפנות לרופא מיד במקרה אתה מבחין בשינויים בעורך/עור היד.**

ילדים ומתבגרים

- **מומלץ לילדים ייחסנו טרם התחלת הטיפול באנברל. ספר לרופא אם אתה/הילד עומד לקבל חיסון. אין לתת חיסונים מסוימים (כגון פוליו במתן דרך הפה) בתקופת הטיפול באנברל.**

תגובהות בין תרופתיות
אם אתה/הילד לוקח או אם לוקח/לוקח לאחרונה, תרופות אחרות יכול תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיחוד אם אתה/הילד לוקח:

- **סולפאסאלדין** המוצע לטיפול במקרים דלקתיות של המעי ובדלקת מפרקים שיגרונית.
- **אבטאטספט** המוצע לטיפול בדלקת מפרקים שיגרונית.
- **אנאקינירה** המוצע לטיפול בדלקת מפרקים שיגרונית.

אין להשתמש בתקופת הטיפול באנברל בתכשירים המכילים את החומרים הפעילים **אנאקינירה** או **אבטאטספט**.

שימוש בתרופה, מזון ושתייה
ניתן להשתמש באנברל ללא קשר למזון ושתייה.

הירין והנקה

ניתן להשתמש באנברל במהלך ההירון רק אם יש צורך בכך. על נשים בגיל הפרוות להשתמש באמצעות מניעה בתקופת הטיפול באנברל ובמשך שלושה שבועות לאחר סיום הטיפול. אם את בהירון, חשוב שיתיכון שתא בהירון או מתכנתה להרות, פני לרופא שלך לקבלת יעוץ. אם נעשה שימוש באנברל במהלך ההירון, התינוק עלול להיות בסיכון מגבר לדיזומות. בנוסף, במחקר אחד נמצא כי כאשר האם קיבלה במהלך ההירון נמצא יותר מומדים מולדים בהשוואה לאימהות שלא קיבלו אנברל או תרופות דומות (אנטיגוניסטים-ל-TNF), אך לא דווח על מומדים מסוימים. מחקר אחר מצא כי אין עלייה בסיכון למומים מולדים כאשר האם קיבלה אנברל בהירון. הרופא שלך יעזר לך להחליט האם התרונות של הטיפול עלולים על הסיכון הפטנציאלי לתינוק.

יש לפנות לרופא אם את רוצה להניך במהלך הטיפול עם אנברל.

טרם חיסון התינוק, חשוב לידע את הרופא והצוות הרפואי שמטפלים בתינוק על כך שהיא שימוש באנברל במהלך ההריון וההנקה.

נהיגה ושימוש במכונות
אנברל לא צפיה להשפייע על יכולת הנהיגה ושימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
אנברל מכילה נתרן.
תרופה זו מכילה פחוט מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל יחידת מינון, כלומר נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
אנברל ניתנת בזריקה תת עורית. אין לבולע.
יש לשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן נטילת התכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

הרופא יחליט את משך הטיפול ואם יש צורך בטיפול נוספת בהתאם לתגובה.
אם לא נראית הטבה לאחר 12 שבועות טיפול באנברל, יתכן שהרופא יחליט על הפסקת הטיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש:
הוראות הזרקה מפורטות - ראה פרק "הוראות שימוש". על מנת לזכור באיזה יום/ימים בשבוע
עליך להזיריק אנברל, מומלץ לנוהל יומן מעקב.

אם הזירק בטעות מינון גבוה יותר יש לפנות לרופא מיד. אם בטעות בלבד לצד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה אותה.

אם שכחת להזיריק את מנת האנברל בזמן הקצוב, יש להזיריק מנת מיד כשנזכרת (אם המנה הבאה אמרורה להינתן למחירתה, יש לדלג על המנה שהוחמזה). לאחר מכן יש להמשיך להזיריק את התרופה ביוםים הבאיםים. אם לא נזכרת שכחת מנת עד ליום שבו אמרורה להינתן המנה הבאה, אין להזיריק מנת כפולה בכך לפיצות על המנה החסירה.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה תסמיini המחלת עלולים לחזור. יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לגבי הפסקת הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי
כמו בכל תרופה, השימוש באנברל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שאתה/הילד לא תסבול/יסבול מ一封 אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או לטיפול רפואי אם אתה/הילד חש באחד מהתסמיini אלרגיה חמורה הבאים:
• קושי בבליעה או בנשימה
• נפיחות של הפנים, הצואר, הידיים או כפות הרגליים
• עצבנות או חרדה, דפוקות לב מהירות, אדמומיות פתאומית בעור /או תחושת חמיימות

- **פריחה חמורה, גרד חמור או סרפתת חמורה (אורטיקרייה):** תופעה המתאפיינת בנגעים אדומיים או חיוורים, בולטים ומגרדים בעור.

- יש לפנוט לרופא מיד אם אתה/הילד חס באחד מהתסמים החמורים הבאים המעידים על תופעות לוואי נדירות, שלעיתים עלולות להיות **קטלניות**:**
- סימנים של **זיהומיים** חמורים כגון חום גבוה היכול להיות מלאה בשיעול, קוצר נשימה, צמרמוורות, חולשה או אзор חם, אדום, רגש, כאב בעור או במפרקים.
 - סימנים של **הפרעות בדם** כגון דימום, נתיחה לשטפי דם תחת עוריים או חיוורון.
 - סימנים של **הפרעות עצביות** כגון חוסר תחושה או תחושת נימול, שינויי בראייה, כאב עיניים או פיתוח חולשה ביד או ברגל.
 - סימני **אי ספיקת לב** או החמרה של **אי ספיקת לב** כגון עייפות או קוצר נשימה בזמן פעילות, נפיחות בקרסולאים, תחושת מלאות בצוואר או בבטן, קוצר נשימה או שיעול בשעות הלילה, צבע כחלחל בציגורניים או בשפטים.
 - סימנים של **סרtan**: סרטן יכול להשפיע על כל חלק בגוף, כולל העור והדם,oSימנים אפשריים יהיו תלויים בסוג ומיקום הסרטן.
 - סימנים אלו יכולים לכלול ירידה במשקל, חום, נפיחות (עם או בלי כאבים), שיעול מתמשך, נוכחות של גושים או גידולים על העור.
 - סימנים של **תגובהות אוטואימוניות** (בהן נוגדים עלולים לפגוע ברקמות תקיןות כגון כאב, עקצוץ, חולשה, נשימה לא תקינה, חשיבה חריגה או ראייה לא תקינה).
 - סימנים של **צבתת או תסמנות דמיית צבתת** כגון שינויים במשקל, פריחה מתמשכת, חום, כאבי פרקים או שרירים, או עייפות.
 - **סימנים של דלקת כלי דם** כגון כאבים, חום, אדומותיות או חמיימות של העור, או גרד.

توفעות לוואי נוספת

توفעות לוואי שכיחות מוד (עשויות להופיע ביותר מ-1 מכל 10 אנשים):

- **זיהומיים** (כולל התקרכרות, סינוסיטיס, ברונכיטיס, זיהומיים במערכת השתן, זיהומיים בעור)
- **תגובהות באטר ההזרקה** (כולל דימום, שטפי דם תת עוריים, אדום, גרד, כאב או נפיחות).
- **توفעות אלו שכיחות בדרך כלל בתחום השימוש, ולרוב שכיחותן יורדת לאחר כחודש.**
- **מספר מטופלים** פיתחו תגובה באטר ההזרקה לאחר הזריקה באותו מקום שבו הזריקו לאחרונה.
- **כאב ראש.**

توفעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע ב-עד 1 מכל 10 אנשים):

- **תגובהות אלרגיות**
- **חום**
- **פריחה**
- **gard**
- **נוגדים המכוונים נגד רקמות תקיןות.**

توفעות לוואי שאין שכיחות (עשויות להופיע ב-עד 1 מכל 100 אנשים):

- **זיהומיים חמורים** (כולל דלקת ריאות, זיהומיים ברקמות עמוקות בעור, זיהומיים במפרקים, זיהום בדם וזיהומיים באזוריים מגוונים)
- **החמרה של אי ספיקת לב ג澹תית**
- **ספיראה נמוכה של תאי דם אדומיים**
- **ספיראה נמוכה של תאי דם לבנים**
- **ספיראה נמוכה של ניטרופילים (סוג של תאי דם לבנים)**
- **ספיראה נמוכה של טסיות דם**
- **סרtan עור – שאינו מלנומה**
- **نפיחות מקומית של העור (אנגיאודמה)**
- **סרפתת (אורטיקרייה)** תופעה המתאפיינת בנגעים אדומיים או חיוורים, בולטים ומגרדים בעור
- **דלקת עיניים**
- **הופעה או החמרה של פסוריАЗיס**
- **דלקת כלי דם המשפיעה על מספר איברים**

- עליה בתפקודי כבד בבדיקות דם (במטופלים המטופלים גם עם מתוטרקסאט, השכיחות של עליה בתפקודי כבד בבדיקות דם היא שכיחה)
- התכווציות וכabi בטן, שלשול, ירידה במשקל או דם בצוואה (סימנים המעידים על בעיות בעיים).

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע ב-עד 1 מכל 1,000 אנשים):

- תגבורות אלרגיות חמורות (כולל נפיחות מקומית חמורה של העור וצפופים)
- לימפומה (סוג של סרטן דם)
- לויקמיה (سرطان המשפיע על מערכת הדם ומה העצם)
- מלנומה (סוג של סרטן עור)
- שילוב של ספירה נמוכה של טסיות, תאי דם לבנים ותאי דם אדומים
- הפרעות במערכת העצבים (המלחות בחולשת שרירים חמורה ותסמיינים וסימנים הדומים לטרשת נפוצה או לדלקת בעצב הראייה או בחוט השדרה)
- שחפת
- הופעה של אי ספיקת לב ג澹תית
- פרכוסים
- זאבת או תסמנת דמוית זאבת (תסמים כגן פריחה ממושכת, חום, כאב מפרק ועייפות)
- פריחה בעור העולה להוביל לש לפוחיות חמורות וקלוף העור
- ילתת (תגובה ליכנואידית) (פריחה אדמדמה-סגולה מגדת ו/או קווים דמו"י חוטים בצלע לבן-אפור על קרום ריר)
- דלקת של הכלב הנגרמת על ידי המערכת החיסונית של הגוף (הפטיטיס אוטואימוני), בחולים המקבלים גם מתוטרקסאט תופעת הלואוי אינה שכיחה
- הפרעות במערכת החיסון העוללות לפגוע בריאות, בעור ובבלוטות לימפה (סרקoidozis)
- דלקת או ה策טלוקות של הריאות (בחולים המקבלים גם מתוטרקסאט תופעת הלואוי של הדלקת או הה策טלוקות של הריאות אינה שכיחה)
- נזק למנסנים הצעירים בתוך הכליות הגורם לתפקוד קליתי לקוי (גלומורולונפריטיס, דלקת של פקיעות הכליה).

תופעות לוואי נדירות מאוד (עשויות להופיע ב-עד 1 מכל 10,000 אנשים):

- כשל של העצם לייצר תאי דם חיוניים.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה:

- סרטן עור מסווג merkel cell carcinoma
- סרקומה ע"ש קפושי, Kaposi's sarcoma (سرطان נדיר הקשור לחיום עם human herpesvirus 8). סרקומה ע"ש קפושי לרובה מופיעה כנגעים סגולים על העור)
- פעילות מוגברת של תאי דם לבנים הקשור לדלקת (macrophage activation syndrome)
- חזזה של הפטיטיס B
- החמרה במצב הנקריא דרמטומיזיטיס (דלקת שרירים וחולשה המלווה בפריחה עורית).

תופעות לוואי נוספת בילדים ובמבוגרים

תופעות הלואוי ושכיחותן הנראות בילדים ובמבוגרים דומות לאלה המתוארות מעלה.

אם הופיura תופעת לוואי, אם אתה מתופעת הלואוי מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעת לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אחר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו מאשר ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי איחסון:** אחסן בקירור 2°C - 8°C (טווח טמפרטורת זה שורר על פי רוב במקרר בית). אין להקפי. אחסן באזינה החיצונית על מנת להגן מאור. לאחר הוצאת המזרק מהמקרר יש להמתין 15-30 דקות בכך לאפשר לתמיסה להגיע לטמפרטורת החדר. מומלץ להשתמש מיד לאחר מכן. אין לחמם את התרופה!
- ניתן לאחסן את התכשיר מחוץ למקרר בטמפרטורה עד מаксימום של 25°C לתקופה בודדת של עד 4 שבועות (לא יותר מאשר מתאריך התרופה), אין לקרר מחדש את תקופת זו. אם לא השתמש בתכשיר תוך 4 שבועות מתאריך הוצאתו מקריר, יש להשליך את התכשיר ואין להשתמש בו.
- מומלץ לרשום את התאריך בו התחלה לאחסן את התכשיר מחוץ למקרר, ואת התאריך אחריו אין להשתמש בתכשיר (לא יותר מ-4 שבועות מתאריך הוצאתו מקרר).
- לפני השימוש, בדוק את התמיסה. התמיסה צריכה להיות צוללה או מעט חלבית, חסרת צבע עד מעט צהבהבה או צבע חום בהיר ויכולת להכיל חלקיקים קטנים של חלבון בצביע לבן או כמעט שקוף.
- אין להשתמש בתמיסה שצבעה שונה מהמתואר לעיל, בתמיסה עכורה או בתמיסה המכילה חלקיקים מסווג אחר מהמתוארים לעיל. אם אין בטוח לגבי מראה התמיסה, התייעץ עם הרוקח.

6. מידע נוסף

• נסוך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, sodium chloride, L-Arginine hydrochloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, water for injections.

• כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה

↳ אנברל 25 מ"ג Tamishe להזרקה:

כל מזרק מכיל 0.5 מ"ל Tamishe צוללה וחסרת צבע עד מעט צהבהבה או צבע חום בהיר.
כל אריזה מכילה מגש ובו 4 מזרקים ו-4 מטליות אלכוהול.

↳ אנברל 50 מ"ג Tamishe להזרקה:

כל מזרק מכיל 1 מ"ל Tamishe צוללה וחסרת צבע עד מעט צהבהבה או צבע חום בהיר. כל אריזה מכילה מגש ובו 4 מזרקים ו-4 מטליות אלכוהול.

• בעל הרישום וכתובתו:

פיצר פרמצטטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אנברל 25 מ"ג Tamishe להזרקה: 142-52-31949
אנברל 50 מ"ג Tamishe להזרקה: 142-53-31950

**הוראות שימוש
הזרקת אנברל תמייסה להזרקה
במזרק מוכן מראש**

הוראות אלה מחולקות לחתתי הפרקים הבאים:

שלב 1: הכנה לזרקת הזרקה

שלב 2: בחירת האזור המועד להזרקה

שלב 3: הזרקה של תמייסת האנברל – תמייסה מוכנה להזרקה

שלב 4: השמדת ציוד

הקדמה

הוראות אלה מסבירות כיצד להכין ולהזריק אנברל תמייסה מוכנה להזרקה. אנא קרא בעיון ובצע את הפעולות על פי סדר הופעתן.

הרופא שלך או האחות ידריכו אותך בטכניות ההזרקה העצמאיות או כיצד להזריק לך. אל תנסה להזריק את התויפה לפני שאתה שבעוני כיצד להכין ולהזריק את המנה. אין לערבות את תמייסת האנברל עם תרופות אחרות.


שלב 1: הכנה לזרקת הזרקה

1. בחר משטח עבורה שטוח, נקי ומואר היטב.
2. הוציא את האריזה המכילה את המזרקים מהמקרר והנץ על משטח עבורה שטוח. משור את כיסוי הניר מאתה הפינות העליונות של המגש והוציא מזרק אחד ופד אלכוהול אחד והנץ אותו על משטח העבודה. אל תונער את המזרק המכיל את התמייסה (להלן "המזרק").
cosa בחזרה את המזרקים בכיסוי הניר והחזיר למקרר את האריזה עם שאר המזרקים.
ראה פרק 5 "איך לאחסן את התויפה?" בנוגע לאחסן אנברל תמייסה מוכנה להזרקה. אם יש לך שאלות לגבי אחסון התויפה אנא פנה לרופא, לאחות או לרוקח שלך לצורך הנחיות נוספת.
3. **המטען 30-15 דקומות על מנת לאפשר לתמייסה במזרק להגיע לטמפרטורת החדר. אל תסיר את כיסוי המטען בזמן ההמתנה.**
ההמתנה להגעת התמייסה לטמפרטורת החדר תגרום לכך שההזרקה תהיה יותר נוחה עבורך. אל תחמס את אנברל תמייסה מוכנה להזרקה בשום צורה אחרת (כגון: במיקרוגל או במים חמים).
4. אסוף את הציוד הנוסף החדש לחזרקה.
הפריטים הנוספים הם: פד אלכוהול וצמר גפן או גaza.
5. רחץ את ידיך במים חמים וסובן.
6. לפני השימוש, בדוק את התמייסה. התמייסה צריכה להיות צלולה או מעט חלבית, חסרת צבע עד מעט צהבהבה או בצבע חום בהיר ויכולת להכיל חלקיקים קטנים של חלבון בצבע לבן או כמעט שקופה. אין לשימוש בתמייסה שכבעה שונה מהמתואר לעיל, בתמייסה עכורה או בתמייסה המכילה חלקיקים מסווג אחר מהמתוארים לעיל. אם אין לך גביה מראה התמייסה, התייעץ עם הרוקח.

שלב 2: בחירת האזור המועד להזרקה

1. שלושת האזוריים המומליצים להזרקה של אנברל תמייסה מוכנה להזרקה הם: (א) אמצע החלק הקדמי של הירך; (ב) בטן, מלבדאזור של 5 סנטימטרים מסביב לטבור; (ג) האזור החיצוני של החלק העליון בזרועות (ראה איור 1).
אם אתה מזריק אנברל תמייסה מוכנה להזרקה לעצמך, אין לבחור באזור החיצוני של החלק העליון בזרועות כמקום המועד להזרקה.

איור 1




2. כל מנה חדשה יש להזריק באזור אחר. ודא שהמנה מוזרקת למרחק של 3 סנטימטרים לפחות ממקום ההזרקה הקודם.
אל תזריק באותו מקום שבו העור רגish, חבול, אדום או קשה. הימנע מהזרקת המנה למקומות עם צלקות או סימני מתיחה (היעזר בעירכת רישום האתרים הקודמים שבהם הזרקה).
3. אם אתה או ילך סובל ממפסורייזיס, אין לנסות להזריק באופן ישיר לאזור נגוע כגון: עור בולט, עבה, אדום או סדוק (פצעי עור הנובעים ממפסורייזיס).

שלב 3: הזרקה של תמיסת האנברל – תמיסה מוכנה להזרקה


1. נגב את אזור ההזרקה עם פד אלכוהול תוך תנועה מעגלית. אל תיגע באזור זה לאחר החיטוי ולפני ההזרקה.
2. הרם את המזרק ממשטח העבודה השטוח. הסר את כיסוי המחט על ידי משיכת חזקה וישראל של הכיסוי מהמחט (ראה איור 2).
היזהר לא לכופף או לעוות את הכיסוי בזמן הסרתתו בכדי למנוע נזק למחט.
לאחר הסרת כיסוי המחט, יתכן שתיהיה טיפת נזול בקצה המחט; מצב זה נורמלי. אל תיגע במחט ואל תאפשר למחט לבוא במגע עם משטח כלשהו. אל תיגע בבוכנת המשאבה של המזרק. דבר זה עלול לגרום לנזול לדלוף החוצה.

איור 2



3. לאחר שאזור ההזרקה הנקה התקיבש, צבוט והחזק את אזור ההזרקה ביד אחת. ביד השנייה החזק את המזרק כמו עיפרון.
4. בתנועה מהירה וקצרה, דחוף את המחט לתוך העור בזווית שבין 45 מעלות ל-90 מעלות (ראה איור 3).
עם הניסיון, אתה תמצא את הזווית הנוחה ביותר עבורך או עבור ילך.
היזהר לא לדחוף את המחט לעור לאט מדי או עם כוח רב.

איור 3



5. כאשר המחט מוחדרת באופן מלא לתוך העור, שחרר את העור שאתה מחזיק. בידך החופשית החזק את המזרק קרוב לבסיס שלו על מנת ליצב אותו. כעת דחוף את הבוכנה על מנת להזריק את כל התמיסה בקצב איטי וקבעו (ראה איור 4).

איור 4



6. כשהמזרק ריק, הוציא את המחט מהעור, תוך הקפדה על שמירת הזווית בה הכנסת את המחט. יתכן שהייה דימום קל באזור ההזרקה. אתה יכול להצמיד לאזור ההזרקה צמר גפן או גaza למשך 10 דקות. אל תעשה את מקום ההזרקה. אפשר להשתמש בפלسطר במידת הצורך.

שלב 4: השמדת ציוד

המזרק נועד לשימוש חד פעמי.

אל תעשה שימוש חוזר במזרק ובמחט.

אין לכוסות את המחט לאחר ההזרקה.

זרוק את המחט והמזרק בהתאם להוראות שניתנו לך על ידי הרופא, האחות או הרוקח שלך.

אם יש לך שאלות, אנא פנה אל הרופא, האחות או הרוקח, אשר מכירים היטב את אונברל Tamishe מוכנה להזרקה.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

.06/2024 עדכן ב-