

## עלון לצרכו לפי תקנות הרווחחים (תכשירים) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**פרגבלין אינובמד 25 מ"ג**

**פרגבלין אינובמד 50 מ"ג**

**פרגבלין אינובמד 75 מ"ג**

**פרגבלין אינובמד 150 מ"ג**

**פרגבלין אינובמד 300 מ"ג**

**כמוסות**

**חומר פעיל:**

**Pregabalin 25, 50, 75, 150, 300 mg                          פרגבלין 25, 50, 75, 150, 300 מ"ג**

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתחמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע המציין על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקה.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבוק, אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרופאי דומה לך.

תרופה זו אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

לטיפול בכאב ממך נוירופאטי (עצב) במבוגרים, לטיפול בדאות שרירים (פיבромיאלגיה – Fibromyalgia –) ולטיפול בהפרעת חרדה מוגבלת במבוגרים.

**קבוצת תרפואית:**

אנלוג לחומצה גאמא-אמינובוטירית (gamma-aminobutyric acid)

### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורט בסעיף 6).

אזורות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

פנה לרופא שלך לפני נטילת התרופה:

- חלק מן החולמים הנוטלים פרגבלין אינובמד דווחו על תופעות אלרגיות. תופעות אלו כוללות נפיחות בפנים, בשפה, בלשון ובלוע וכן פריחה עורית מפותשת. אם אתה חוות אחת או יותר מטופעות אלו, عليك לפנות לביטחון רפואי לרופא.

- פריחות עוריות חמורות, כגון תסמנת סטיבנס-ג'ונסון ונמק אפידרמי רעלני, דווחו בהקשר של השימוש בפרגבלין אינובמד. יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם אתה חוות אחד או יותר מהתסמינים הקשורים

בתופעות העוריות החמורות המתוארות בסעיף 4.

- התרופה עלולה לגרום לשחרורת ולישנונות, כך שהולמים מבוגרים הנוטלים את התכשיר הינם בסיכון מוגבר לנפילות ולפצעות. יש לנוקוט בזיהירות עד שתתרגל להשפעת התרופה עלייך.
- התרופה עלולה לגרום לטשטוש או אובדן ראייה או שינויים אחרים בראייה, שרובם חולפים – יש להודיע לרופא באופן מיידי על כל שינוי שלך בראייה.
- בחולי סוכרת מסויימים, העולים במשקל תחת הטיפול בתכשיר, ייתכן צורך בהתאם מינון התרופות להורדת רמת הסוכר בדם.
- תופעות לוואי מסוימות, כגון ישנונות, עשוות להיות יותר שכיחות, כיוון שהולמים עם גישה בעמוד השדרה עשויים ליטול תרופות נוספות, לטיפול בכאוב וספסטיות, של汗ן תופעות לוואי דומות לאלו של פרגבלין אינובייד וחומרתן עשויה לגרום כאשר אלו ניטלות יחד.
- במספר חולמים שנטלו פרגבלין אינובייד דווח על כשל לבבי, בעיקר אצל מבוגרים בעלי מחלות לב וכלי דם. לפניה תחילת השימוש בתרופה, יש לידע את הרופא אם הין סובל או סבלת בעבר ממחלת לב.
- קיימים מספר דיווחים של כשל קליני על רקע טיפול בפרגבלין אינובייד. אם במהלך הטיפול הין מבחן בהשתנה מופחתת, יש לדוח על כך לרופא, שכן הפסקת הטיפול התרופתי עשויה להביא לשיפור.
- בחולים מסוימים, לטפלו בתרופות אנטיאפילפטיות כגון פרגבלין אינובייד, דווח על מחשבות על גישה עצמית או מחשבות אובדן או שהראו התנהגות אובדן. במקרה של הופעת מחשבות או התנהגות מסווג זה בכל שלב, יש לפנות לרופא מיד.
- שימוש פרגבלין אינובייד עם תרופות אחרות (כגון סוגים מסוימים של משככי כאבים) העשוות לגרום לעצירות, עלול לגרום לביעות במערכת העיכול (כגון: עצירות, חסימת או שיתוק מעי). יש להודיע לרופא אם הין סובל מעzierות, במיוחד אם קיימת נטייה לעzierות.
- לפניה תחילת השימוש בתרופה, יש לידע את הרופא אם הין סובל או סבלת בעבר ממלחות או התמכרות למשקאות חריפים, לסמים או לתרופות כלשהן. במצב זה יתכן שיש לך סיכון גבוה יותר לפתח תולות בפרגבלין אינובייד.
- במהלך השימוש בתרופה או מיד לאחר הפסקתה עלולות להופיע עוויות – יש להודיע לרופא באופן מיידי אם הין סובל מעוויות.
- במספר חולמים עם מחלות רקע נוספות דווח על ירידה בתפקוד מוחי (אנצלופתיה). יש לידע את הרופא אם ידוע על מצב רפואי בעל השלכות משמעותית, כולל מחלות כבד או כליות.
- קיימים דיווחים על קשיי נשימה. אם יש לך הפרעות במערכת העצבים, הפרעות נשימה, ליקוי קליני או שהין מעל גיל 65, ייתכן שהרופא יושם לך משטר מינון אחר. היועץ ברופא אם יש לך קשיי נשימה או נשימות שתוות.

#### תלוות

אנשים מסוימים יפתחו תולות בפרגבלין אינובייד (צורך להמשיך לקחת את התרופה). הם עלולים לפתח תסמיini גמiliaה בהפסקת השימוש בפרגבלין אינובייד (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" ו-"אם אתה מפסיק את נטילת התרופה"). אם קיים חשש שאתה עלול לפתח תולות בפרגבלין אינובייד, חשוב שתחייען עם הרופא.

- אם הבחנת באחד מהסימנים הבאים בזמן נotel בפרגבלין אינובייד, זה יכול להיות סימן שפיטה תולות:
- אתה צריך ליטול את התרופה לתקופת זמן ארוכה יותר מאשר שונרשהה עברוך
  - אתה מרגיש שאתה צריך ליטול יותר מהמנה שונרשהה עברוך
  - אתה משתמש בתרופה מסיבות שונות מאלו אשר עברון היא נרשמה לך
  - היו לך נסיבות חוזרים ולא מוצלחים להפסיק או לשנות בשימוש בתרופה
  - כאשר אתה מפסיק ליטול את התרופה אתה מרגיש לא טוב, ואתה מרגיש טוב יותר לאחר נטילת התרופה שוב

אם אתה מבחן בכל אחד מסימנים אלו, פנה אל הרופא והתייעץ איתו לגבי הטיפול המטיב עבורך, כולל מתי יש להפסיק לקחת את התרופה ואיך לעשות זאת בביטחון.

#### תగוכות בין תרופתיות

אם אתה לוקה או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקה.

לפרגבלין אינובמד ולתרופה מסוימות אחרות עלולות להיות השפעות הדדיות על הפעולות.  
אם פרגבלין אינובמד נלקחת במקביל לתרופה מסוימת בעלות השפעות מרוגיעות (כולל אופיאטים), פרגבלין אינובמד עלולה להגבר השפעות אלו ולהוביל לכשל נשימי, לתרדמת (קומה) ולמוות. עצמת הסחרחות, ישנות, וירידה בריכוז עלולים לעלוות אם פרגבלין אינובמד נלקחת במקביל ל:

אוקסיקודון – תרופה לשיכוך כאבים  
לוראזופאם – תרופה לטיפול בחרדה  
אלכוהול

ניתן לטיפול פרגבלין אינובמד עם גלולות למניעת הירון.

**שימוש בפרגבלין אינובמד ומזון**  
ניתן לטבול את התרופה ללא קשר לארוחות.

**שימוש בפרגבלין אינובמד וצריכת אלכוהול**  
אין צורך אלכוהול במהלך הטיפול בתרופה.

hiryon, הנקה ופוריות  
אין להשתמש בפרגבלין אינובמד במהלך ההריון או בתקופת ההנקה, אלא בהוראת הרופא, לאחר התיעצות עמו. השימוש בפרגבלין במהלך 3 חודשים ההריון הראשונים עלול לגרום למומים מולדים בעקבות הדורשים טיפול רפואי. במהלך שיטר שスクר נתונים ממדיניות אשר נטלו פרגבלין במהלך 3 החודשים הראשונים של ההריון, 6 תינוקות מתוך 100 סבלו ממומים מולדים כאלה. זאת בהשוואה ל- 4 תינוקות מתוך 100 שנולדו לנשים שלא טופלו בפרגבלין במהלך. דוח על חריגות בפנים (שסעים בפנים ובפה), בעיניים, במערכת העצבים (כולל במוח), בכליות ובאיורי המין.

נשים העשויות להרות במהלך הטיפול בתרופה חייבות להשתמש באמצעות מניעה ייעילים.  
אם את בהריון או מניקה, חושבת שתא בהריון או מתכונת להיכנס להריון, היועצץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

**נהייה ושימוש במכונות**  
אין לנוהג או להפעיל מכונות מסוימות עד שתדע כיצד התרופה משפיעה عليك, בכלל שהשימוש בתרופה זו עלול לגרום לסחרחות, לנמנום או לירידה בריכוז.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן ככמוסה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### 3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. عليك לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.  
**אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש לבולע את הכמוסה בשלמותה. אסור לפתח ולפזר את תוכן הכמוסה, היה שצורות מתן אלו לא נבדקו. יש לבולע את התרופה עם מים.

אם נשלת מנת יתר או אם בטיעות בלבד ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיעון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. אתה עלול להרגיש ישנו, מבולבל, מודאג או חסר מנוחה כתוצאה מניטילת מינון יתר של פרגבלין אינובמד. כמו כן דוחו התפקידים של עוויתות (פרוכסים) ואיובוד הכרה (תרדמת).

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד החשוב ליטול את התרופה בכל יום בשעה קבועה. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אין ליטול מנה כפולה. קה את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק את נשילת התרופה**  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. אם הוחלט על הפסקת טיפול, הרופא יסביר לך איך לעשות זאת. הפסקת הטיפול בתרופה חיונית להיות הדרגתית, במשך תקופה של שבועיים לפחות.

לאחר הפסקת הטיפול בתרופה (בין אם טיפול ארוך או קצר טווח) ייתכן שתחווה תסמינים מסוימים שנקרוים תסמיini גמילה. תסמיינים אלו כוללים: נדודי שינה, כאבי ראש, בחילות, חרדה, שלשול, סימפטומים דמוני שפעת, עוויתות, עצבנות, דיכאון, מחשבות על פגיעה עצמך או התאבדות, כאבים, הזעה וסחרורות. ככל שתרופה ניטלת במשך זמן ארוך יותר, תופעות אלו עשויות להיות שכיחות וחמורות יותר. אם אתה חוות תסמייני גמילה, יש לפנות לרופא. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעע שהינך גוטל תרופה. הרוב משקפיים אם הינך זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקט.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה השימוש בפרגבלין אינובייד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואוי. ייתכן ולא תסבול אף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם הינך סובל מנקודות פנימיות או בלשון או מתגובה עורית חמורה (העור מאדים ומתכסה שלפוחיות או מתקלף).

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – שימוש יתר משתמש אחד מתוך עשרה הן:  
• סחרחות, תחושת נמנום, כאבי ראש.

תופעות לוואי שכיחות (common) – שימוש שימוש בעוד משתמש אחד מתוך 10:  
• תיאבון מוגבר.

• תחושת המתרומות רוח, הבלבול, קשיי התמצאות, ירידת בחשך המיני, עצבנות.

• הפרעה ברכיזו או בזיכרון, אייבוד זיכרון, גמלוניות, רעד, הפרעה בדיור, תחושת עקצוץ, חוסר/קלהות בתחושה, סძיה, רדמת, נדודי שינה, עייפות, תחושה משונה.

• טשטוש ראייה, ראייה כפולה.

• ורטיגו, הפרעות בשינוי המשקל, נפילות.

• יובש בפה, עצירות, הקאות, גזים, שלשול, בחילות, בטן נפוצה.  
• בעיות זקופה.

• נפיחות של הגוף, כולל האגן.

• תחושת שכרות, סגנון הליכה חריג.

• עליה במשקל.

• התכווצויות שריריים, כאב מפרקים, כאבי גב וגפיים.

• כאב גרון.

תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon) – שימוש שימוש בעוד משתמש אחד מתוך 100:

• אובדן תיאבון, ירידת במשקל, ירידת ברמת הסוכר בدم, עלייה ברמת הסוכר בדם.

- **שינויי בתפיסת האדם את עצמו, אי שקט, דיכאון, חרדה, שינוי מצב רוח, קושי במציאת מיללים, הזיות, חלומות משונים, התקפי פאניקה, אפתיה, תוקפנות, מצב רוח מרומם, הפרעה נפשית, קושי בחשיבה, עליה בחשך המני, בעיות בתפקוד המני, כולל חוסר יכולת להציג לפורקן מני, עיכוב בשפיכה.**
- **שינויים בראייה כולל אובדן ראייה היקפית, ריזוך עיניים, הבזקי אור, תנועות קופצניות, ירידת בתגובהות רפלקס, פעולות, סחרחות בעמידה, רגשות עורית, איבוד טעם, תחושת צריבה, רעד בתנועה, ירידת ברמת ההכרה, אובדן הכרה, עילפון, רגשות מגברת לרعش, תחושת מחלת.**
- **עיניים יבשות, נפיחות או כאב בעין, חולשת עיניים, עיניים דומות, גירוי בעין.**
- **הפרעות בקצב הלב, קצב לב מוגבר, לחץ דם נמוך או גבוה, שינויים בדופק, כשל לבבי.**
- **הסמה, גלי חום.**
- **קושי בנשימה, יובש באף, אף סתום.**
- **יצירת רוק מגברת, צרבת, חוסר תחושה מסביב להפה.**
- **הזהה, פריחה, צמרמותה, חום.**
- **עווותות שרירים, נפיחות במפרקים, קשייה שרירים, כאב כולל כאב שרירים, כאב צוואר.**
- **כאב בשדיים.**
- **קושי או כאב במתן שתן, בריחת שתן.**
- **חולשה, צמא, לוז בחזה.**
- **שינויים בבדיקות דם ותפקודי כבד (עליה בקריאטין פוספוקינאז בדם, עליה באנזימי כבד, ירידת בטסיות הדם, נוטרופניה, עליה בקריאטינין בדם, ירידת באשלגן בדם).**
- **רגשות יתר, נפיחות בפנים, גרד, חרלה, נזלת, דימום מהאף, שיעול, נהירות.**
- **כאבים במחזור החודשי.**
- **ידים ורגליים קרות.**

**טופעות לוואי נדירות (rare) – טופעות שמייפות בעד משתמש אחד מתוך 1,000:**

- **חוש ריח חריג, תנודתיות בראייה, שינוי בתפיסת העומק, בהירות הזרתית, איבוד ראייה.**
- **אישונים מורחבים, פזילה.**
- **זיעה קרה, גירוי בגרון, לשון נפואה.**
- **דלקת לבלב.**
- **קושי בבלעה.**
- **תנוועתיות גופ איטית יותר או מופחתת.**
- **קושי בכתיבה.**
- **בצקות באזור הבطن.**
- **נוולים בריאות.**
- **עוויותות.**
- **שינויים בא.ק.ג התואמים להפרעות קצב לב.**
- **נזק לשדריר.**
- **הפרשה מהשדים, הגדלת שדים חריגה, הגדלת שדים אצל גברים.**
- **הפרעות במחזור החודשי.**
- **כשל כליתי, ירידת בנפח השתן, אצירת שתן.**
- **ירידה בספרת האי הדם הלבנים בבדיקה דם.**
- **התנהגות חריגה, התנהגות אובדןית, מחשבות אובדןיות.**
- **תגובהות אלרגיות (עשויות להתבטא בא: קשיי נשימה, דלקת בקרנית), ותגובהות עוריות חמורות המופיעות בכתמים עגולים, אדמדמים, לא מוגבהים באזור הגוף, אשר לעיתים קרובות מלווים בשלפוחיות במרכום, התקלפות העור, כיבים בפה, בגרון, באף, באברי המין ובכעינים. לתופעות עוריות חמורות אלו יכולות להיות תופעות מקדיות, כגון חום ותסמיינים דמווי שפעת [תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמלי רעלני].**
- **צහבת (צහבה של העור ולובן העיניים).**
- **פרקיןסוניזם, כלומר תסמיינים שדומים למחלת הפרקינסון כמו: רעד, ברדייקינזיה (ירידה ביכולת התנועה) וקשיחות (nockשות שרירים).**

**תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות ש一百多 שנים אחד משתמש אחד מותקן 10,000:**

- כשל כבד.

- דלקת כבד (הפטיטיס).

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**

- פיהוה תלות בפרגבלין אינובמד לאחר הפסקת הטיפול בפרגבלין אינובמד (בין אם טיפול קצר או ארוך טווח) ניתן שתהווה תסמים מסוימים שנקרוים תסמייני גמילה. (ראה סעיף 3 "אם אתה מפסיק את נטילת הטרופה").  
תופעות לוואי מסוימות, כגון ישנות, עשוות להיות יותר שכיחות, כיון שהחולמים עם פגעה בעמוד השדרה עשויים ליטול תרופות נוספות לבכיב וספסטיות, שלහן תופעות לוואי דומות לאלו של פרגבלין אינובמד וחומרתן עשוייה לגבר כאשר אלו ניטלות ייחד.

תופעות הלואאי הבאות דווחו לאחר שיוקה של הטרופה: קושי נשימתני ונשימות שטוחות.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי חמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דווחה על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המוקון לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לkishorot:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את הטרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנאי אחסון:**

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Starch pregelatinized (maize), Gelatin, Purified water , Talc , Titanium dioxide (E171), Sodium lauryl sulfate.

**כמוסות פרגבלין אינובמד 75 מ"ג ו- 300 מ"ג מכילות גם:** Iron oxide red (E172)

**כיצד נראה הטרופה ומה תוכן האריזה:**

**פרגבלין אינובמד 25 מ"ג** – כמוסה בצבע לבן אטום, על המכסה מוטבע 'PG' ועל גוף הכמוסה מוטבע '25'.

**פרגבלין אינובמד 50 מ"ג** – כמוסה בצבע לבן אטום, על המכסה מוטבע 'PG' ועל גוף הכמוסה מוטבע '50'.

**פרגבלין אינובמד 75 מ"ג** – כמוסה בצבע אדום/לבן אטומים, על המכסה מוטבע 'PG' ועל גוף הכמוסה מוטבע '75'.

**פרגבלין אינובמד 150 מ"ג** – כמוסה בצבע לבן אטום, על המכסה מוטבע 'PG' ועל גוף הכמוסה מוטבע '150'.

**פרגבלין אינובמד 300 מ"ג** – כמוסה בצבע אדום/לבן אטומים, על המכסה מוטבע 'PG' ועל גוף הכמוסה מוטבע '300'.

**גודל האזיה: התרופה מסופקת באזיה כמפורט:**  
אזריזת קרטון המכילות 4 מגשים/בליסטרים עם 14 כמוסות, סך הכל 56 כמוסות באזיה קרטון. על אזיה הקרטון  
מופיע מספר הממוסות.

**בעל הרישום וכותבו:** אינובמד בע"מ רח' באר גנים 55, ת.ד. 62, אבן יהודה 40500.

**שם הייצן וכותבו:** אינטס פרמציאוטיקלס בע"מ, אהמראבאד, גוזאראט, הודו.

נערך ביוני 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פרגבין אינובייד 25 מ"ג –	156-14-34772
פרגבין אינובייד 50 מ"ג –	156-15-34726
פרגבין אינובייד 75 מ"ג –	156-16-34773
פרגבין אינובייד 150 מ"ג –	156-17-34774
פרגבין אינובייד 300 מ"ג –	156-18-34738

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.