



וִי 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבָע מודיעה על העדכוניים הבאים בעלונים לרופא ולצרכן של התכשיר:

הקסאקפרון® טבליות

HEXA KAPRON® TABLETS

Contains: Tranexamic Acid 500 mg

התוויה כפי שאושרה בתעוזת הרישום:

Treatment of hemorrhage occurring in some forms of surgery, including prostatectomy.

Hematuria.

Menorrhagia.

Hereditary angioneurotic edema.

ברצוננו להודיע שהעלונים עודכנו, בפירוט שלහן כוללים העדכוניים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום):

עדכוניים בעלון לצרכן

2. לפני השימוש בתרופה

اذהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

נהיגר ו שימוש במכונות
لتרופה השפעה מועטה או אין השפעה על היכולת לנהוג. יחד עם זה הפרעה בראייה יכולה להופיע לאחר נטילת חומצה טראנסקסאמית (החומר הפעיל בתרופה).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

אם נטלת בטיעות מינון גבoga יותר אם נטلت בטיעות מנת יתר או אם בטיעות בלבד מלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.
נטילת מינון יתר של חומצה טראנסקסאמית עלולה לגרום **לשלשול**, בחילה, הקאה, סחרחות או סחרור בעת קימה לעמידה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהקסאקפרון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

פסיק ליטול את התרופה ופנה מיד לחדר מין אם אתה חווה אחת מתופעות הלואוי הבאות:

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמוסיפות בפחות משמש 1 מתוך 1,000):

קריש דם ברגל או בריאות, התס敏ים האפשריים הם:

- כאב, נפיחות או אודם ברגל
- קושי לנשומת או קוצר נשימה
- כאב בחזה, שועלול להחמיר בזמן הנשימה

תופעות לוואי נדירות מאד (תופעות שמויפות בפחות ממשתמש 1 מתוך 10,000):
תגובה אלרגית, התסמנים האפשריים הם: **נפיחות של האגן או הלשון; קושי לנשום או קצר נשימה; קושי בבלעה, לחץ בגרון או צרידות; צפופים, שיעול או נשימה רועשת; פריחה נפוצה, מורמת או מגרדת**

הפסק ליטול את התרופה ופנה לרופא מיד אם אתה חווה אחת מתופעות הלואוי הבאות:
תופעות לוואי נדירות (תופעות שמויפות בפחות ממשתמש 1 מתוך 1,000):

- עור مجرد, אדום או נפוץ
- בעיות בריאות, במינוחן בראית צבעים
- קריש דם בעין. הדבר עלול לגרום לדימום בעין או לאיבוד ראייה

תופעות לוואי נדירות מאד (תופעות שמויפות בפחות ממשתמש 1 מתוך 10,000):

- קריש דם בכלי הדם (מצב הנקרא פקקת - תרומבוזיס)
- בחילה, הקאה, שלשול - תופעות אלה בדרך כלל קללות וחולפות מהר מאד, אך אם הן ממשיכות, ספר על כך לרופא שלך או לרוקח.

תופעת לוואי שכיחותה אינה ידועה (לא ניתן לקבוע את השכיחות מהמידע הנוכחיים):
פרכוסים, במינוחן במרקם של שימוש לרעה

עדכונים בעלון לרופא

4 CLINICAL PARTICULARS

[...]

4.7 Effects on ability to drive and use machines

Hexakapron Tablets has no or negligible influence on the ability to drive and use machines. **Visual disturbances may occur following administration of tranexamic acid.**
[...]

4.9 Overdose

Signs and symptoms may include nausea, **diarrhea**, vomiting, orthostatic symptoms and/or hypotension, dizziness, headache and convulsions. Initiate vomiting, then stomach lavage, and charcoal therapy. Maintain a high fluid intake to promote renal excretion. There is a risk of thrombosis in predisposed individuals. Anticoagulant treatment should be considered.