

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) – 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ليريكاTM 25 ملغ

ليريكاTM 50 ملغ

ليريكاTM 75 ملغ

ليريكاTM 100 ملغ

ليريكاTM 150 ملغ

ليريكاTM 200 ملغ

ليريكاTM 225 ملغ

ليريكاTM 300 ملغ

كبسولات

المادة الفعّالة:

پريجابالين 25، 50، 75، 100، 150، 200، 225، 300 ملغ

Pregabalin 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg

المواد غير الفعّالة ومولدات الحساسية: انظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية شبيهة.

هذا الدواء غير مخصص للعلاج لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لمعالجة الألم عصبي المنشأ (اعتلال عصبي) لدى الكبار، لعلاج الألم العضلي الليفي (ألم عضلي ليفي – Fibromyalgia)، ولعلاج اضطراب القلق العام لدى البالغين.

الفصيلة العلاجية:

قرين للحمض جاما أمينوبوتيريك (gamma-aminobutyric acid).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أليرجي) للمادة الفعّالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

توجه لطبيبك قبل تناول الدواء.

- لقد بلغ بعض المرضى الذين يتناولون ليريكا عن حدوث أعراض تحسسية. هذه الأعراض تشمل حدوث إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان وفي البلعوم وكذلك طفح جلدي منتشر. إذا قاسيت من واحد أو أكثر من تلك الأعراض، عليك التوجه فورًا للطبيب.

- تم الإبلاغ عن حالات طفح جلدي حاد، مثل متلازمة ستيفنز جونسون وتقرُّش الأنسجة المتموتة البشروية التسممي، عند استعمال ليريكسا. يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا اختبرت واحداً أو أكثر من الأعراض المرتبطة بالأعراض الجلدية الحادة، الوارد وصفها في البند 4.
- قد يسبب الدواء دوار ونعاس، بحيث يكون المرضى الكبار الذين يتناولون المستحضر معرضين لخطورة أكبر لحدوث سقوط وإصابات. يجب توخي الحذر إلى أن تتعود على تأثير الدواء عليك.
- قد يسبب الدواء تشوش أو فقدان الرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية، التي يزول أغلبها – يجب إبلاغ الطبيب على الفور عن أي تغيير يطرأ على الرؤية.
- لدى بعض مرضى السكري، الذين يزداد وزنهم نتيجة العلاج بالمستحضر، من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي للأدوية الخافضة لنسبة السكر بالدم.
- أعراض جانبية معينة، مثل النعاس يمكن أن تكون أكثر شيوعاً، لأن المرضى الذين يعانون من إصابة بالعمود الفقري من شأنهم أن يتناولوا أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبية مشابهة لتلك الخاصة بـ ليريكسا ويمكن أن تزداد خطورتها عند تناولها سوياً.
- لقد بُلغ لدى بعض المرضى الذين تناولوا ليريكسا عن حدوث فشل قلبي، خاصة لدى الكبار الذين يعانون من أمراض في القلب والأوعية الدموية. قبل بدء استعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض في القلب.
- هناك عدة تقارير عن حدوث فشل كلوي على خلفية العلاج بـ ليريكسا. إذا كنت تلاحظ أثناء العلاج بالدواء بقلة التبول، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك، لأن من شأن التوقف عن العلاج بالدواء أن يؤدي لتحسن.
- لقد بُلغ لدى بعض المرضى، الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل ليريكسا، عن أفكار عن إلحاق ضرر ذاتي أو حدوث أفكار إنتحارية أو أنهم أبدوا سلوكاً انتحارياً. في حال ظهور أفكار أو سلوك من هذا النوع في أية مرحلة، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب.
- إن مشاركة ليريكسا مع أدوية أخرى (مثل أنواع معينة من مسكنات الألم) التي من شأنها أن تسبب الإمساك، قد يؤدي لحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل: إمساك، إندداد أو شلل الأمعاء). يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني من إمساك، خاصة إذا وجد ميل لحدوث إمساك.
- قبل بدء استعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من التعلق أو الإدمان على المشروبات الروحية، المخدرات أو على أدوية أياً كانت. في مثل هذه الحال قد يكون لديك احتمال أعلى لتطوُّر التعلق بـ ليريكسا.
- قد تظهر تشنجات خلال استعمال الدواء أو حالاً بعد إيقافه – يجب إبلاغ الطبيب في الحال إذا كنت تعاني من تشنجات.
- بُلغ لدى عدد من المرضى الذين لديهم أمراض أساسية إضافية عن حدوث انخفاض في الأداء الوظيفي الدماغي (encephalopathy). يجب إبلاغ الطبيب فيما إذا كنت تعلم بوجود حالة طبية لها أبعاد ملحوظة، بما في ذلك أمراض الكبد أو الكلى.
- هناك تنبيلات عن صعوبات في التنفس. إذا كانت لديك اضطرابات في جهاز الأعصاب، اضطرابات في التنفس، اعتلال في الكلى أو إذا كان عمرك أكثر من 65 عاماً، قد يصف لك الطبيب نظام جرعات آخر. استشر الطبيب إذا كانت لديك صعوبة في التنفس أو إذا كان تنفسك سطحياً.

التعلُّق

يطور بعض الأشخاص تعلقاً بـ ليريكسا (الحاجة إلى متابعة تناول الدواء). قد يطورون أعراضاً انسحابية عند التوقف عن استعمال ليريكسا (انظر البند 3، "كيفية استعمال الدواء؟" و "إذا توقفت عن تناول الدواء"). إذا كان هناك خوف من أن تطور تعلقاً بـ ليريكسا، من المهم أن تستشير الطبيب.

إذا اختبرت إحدى العلامات التالية أثناء تناول ليريكسا، فهي قد تكون علامة تدل على تطور التعلُّق:

- عليك تناول الدواء لوقت أطول من الوقت الذي وُصف لك
- تشعر أن عليك تناول جرعة أكبر من الجرعة التي وُصفت لك
- كنت تستعمل الدواء لأسباب تختلف عن تلك التي وُصف الدواء لك من أجلها
- كانت لديك محاولات متكررة وفاشلة في التوقف عن أو السيطرة على استعمال الدواء
- عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بشعور سيء، وتشعر أفضل عند تناوله ثانية

إذا اختبرت أيًا من هذه العلامات، توجه إلى الطبيب واستشره حول العلاج الأفضل لك، بما في ذلك حول متى عليك التوقف عن تناول الدواء، وكيف تقوم بهذه الخطوة بأمان.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

قد يكون لـ ليريكأ وأدوية معينة أخرى تأثيرات متبادلة على الفعالية.
إذا تم تناول ليريكأ بالتزامن مع أدوية معينة ذات تأثيرات مهدئة (بما فيها الأفيونيات)، قد يزيد ليريكأ هذه التأثيرات، وقد يؤدي إلى فشل تنفسي، غيبوبة (Coma) وإلى الوفاة. قد تزيد حدة الدوار، الميل إلى النوم، وتدني التركيز إذا تم تناول ليريكأ بالتزامن مع:
أوكسيكودون – دواء لتسكين الآلام
لورازيبام – دواء لعلاج القلق
الكحول

بالإمكان تناول ليريكأ مع أقرص منع الحمل.

استعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء بدون علاقة بوجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز استهلاك الكحول خلال فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز استعمال ليريكأ خلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة، إلا بتعليمات من الطبيب وبعد استشارته. قد يسبب استعمال بريجابالين خلال أول 3 أشهر من الحمل تشوهات خلقية لدى الجنين، والتي تستدعي العلاج الطبي. في إطار بحث قام بعرض معطيات أخذت من نساء من الدول الشمالية، ممن تناولن بريجابالين خلال أول 3 أشهر من الحمل، 6 أطفال من كل 100 عانوا من مثل هذه التشوهات الخلقية. هذا بالمقارنة مع 4 أطفال من بين كل 100 طفل ولدوا لنساء لم يتم علاجهن بواسطة بريجابالين في إطار البحث. تم الإبلاغ حالات استثنائية في الوجه (شقوق في الوجه والفم)، في العينين، في الجهاز العصبي (وبضمن ذلك الدماغ)، في الكلى وفي الأعضاء التناسلية.

يتوجب على النساء اللواتي من شأنهن الحمل أثناء العلاج بالدواء استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل.
إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقد أنك حامل أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات الخطرة إلى أن تعرف كيفية تأثير الدواء عليك، لأن استعمال هذا الدواء قد يؤدي إلى دوار، نعاس أو تناقص التركيز.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

المستحضر يحتوي على لاكتوز مونوهيدرات. إذا قيل لك في الماضي من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في الكبسولة، لهذا يعتبر في الواقع "خالياً من الصوديوم" من ناحية جوهريّة.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الكبسولة بشكلها الكامل. يمنع فتح وبعثرة محتوى الكبسولة، لأن هذه الأشكال من الإعطاء لم تفحص. يجب بلع الدواء مع الماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلّغ طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. قد تشعر بميل إلى النوم، مرتبك، قلق أو قليل الراحة نتيجة تناول جرعة دوائية مفرطة من ليريكسا. كذلك يُبلغ عن نوبات تشنج (إختلاجات) وفقدان الوعي (سبات).

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد من المهم تناول الدواء كل يوم في ساعة محددة. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إذا تقرر إيقاف العلاج، يشرح لك الطبيب كيف تقوم بذلك. فإن التوقف عن العلاج بالدواء يجب أن يكون تدريجياً، خلال فترة أسبوع على الأقل.

بعد التوقف عن العلاج بالدواء (سواء كان علاجاً قصير الأمد أو طويل الأمد) من الجائز أن تقاسي من بعض الأعراض التي تدعى أعراضاً انسحابية. تشتمل هذه الأعراض على: أرق، صداع، غثيان، قلق، إسهال، أعراض تشبه الإنفلونزا، تشنجات، عصبية، اكتئاب، أفكار بشأن إيذاء نفسك أو الانتحار، آلام، تعرق وحالات دوخة. من شأن تلك الأعراض أن تكون أكثر شيوعاً وخطورة، كلما تم تناول الدواء خلال فترة أطول. إذا اختبرت أعراضاً انسحابية، توجه إلى الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابِج الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضدّ النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ليريكسا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا عانيت من انتفاخ في الوجه أو في اللسان أو من رد فعل جلدي خطير (احمرار الجلد واكتسائه بحويصلات أو حدوث تقشر).

أعراض جانبية شائعة جداً: تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص
دوار، الشعور بنعاس، صداع.

أعراض جانبية شائعة: تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص

- شهية زائدة للطعام.
- شعور بمعنويات عالية، ارتباك، توهان، تناقض الرغبة الجنسية، عصبية.
- اضطرابات في التركيز أو في الذاكرة، فقدان الذاكرة، بلادة، رجفان، اضطراب في النطق، شعور بوخز، خدر / فتور في الإحساس، تهدئة (sedation)، نؤام، أرق، إرهاق، شعور غريب.
- تشوش الرؤية، رؤية مزدوجة.
- ترنج (فيرتيجو)، اضطرابات في التوازن، سقوط.
- جفاف في الفم، إمساك، تقيؤات، غازات، إسهال، غثيان، انتفاخ البطن.
- مشاكل في انتصاب القضيب الذكري.
- انتفاخ الجسم، يشمل الأطراف.
- الشعور بثقل، أسلوب مشي شاذ.
- زيادة في الوزن.
- تقلصات عضلية، ألم في المفاصل، آلام في الظهر والأطراف.

- ألم في الحنجرة.

أعراض جانبية غير شائعة: تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص

- فقدان الشهية للطعام، تناقص الوزن، انخفاض نسبة السكر في الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- تغيير النظرة إلى الذات، قلة هدوء، اكتئاب، قلق، تغيرات في المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، هذيان، أحلام غريبة، نوبات من الهلع، لا مبالاة، عدوانية، مزاج مرهف، اضطراب نفسي، صعوبة في التفكير، زيادة الرغبة الجنسية، مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى النشوة الجنسية، تأخر القذف.
- تغيرات في الرؤية بما في ذلك فقدان الرؤية المحيطية، تراقص العينين، ومضات من الضوء، حركات قفزية، تناقص الإستجابة للمنعكسات، نشاط، دوار عند الوقوف، حساسية جلدية، فقدان المذاق، الشعور بحرق، رجفان أثناء الحركة، تدني مستوى الوعي، فقدان الوعي، إغماء، زيادة الحساسية للضجيج، الشعور بوعكة.
- جفاف العينين، انتفاخ أو ألم في العين، ضعف العينين، تدمع العينين، تهيج العين.
- اضطرابات في نظم القلب، زيادة نظم القلب، انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، تغيرات في النبض، فشل قلبي.
- تورد، هبات من الحر.
- صعوبة في التنفس، جفاف في الأنف، انسداد الأنف.
- زيادة إنتاج اللعاب، حرقان، خدر من حول الفم.
- تعرق، طفح، قشعريرة، سخونة.
- تشنجات عضلية، انتفاخ المفاصل، تصلب العضلات، ألم يشمل ألم عضلي، ألم في العنق.
- ألم في الثديين.
- صعوبة أو ألم أثناء التبول، سلس بولي.
- ضعف، عطش، ضغط في الصدر.
- تغيرات في فحوص الدم ووظائف الكبد (ارتفاع في الكرياتين فوسفوكيناز في الدم، ارتفاع إنزيمات الكبد، انخفاض الصفائح الدموية، قلة العدلات، ارتفاع الكرياتينين في الدم، انخفاض البوتاسيوم في الدم).
- حساسية زائدة، انتفاخ الوجه، حكة، شرى، رشح، رعاف، سعال، شخير.
- آلام بالدورة الشهرية.
- برودة اليدين والرجلين.

أعراض جانبية نادرة: تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص

- شذوذ بحاسة الشم، اهتزاز في الرؤية، تغير في إدراك العمق، سطوع بصري، فقدان الرؤية.
- توسع الحدقتين، حَوْل.
- تعرق بارد، تهيج في الحنجرة، انتفاخ اللسان.
- إلتهاب البنكرياس.
- صعوبة في البلع.
- تباطؤ أو تناقص حركات الجسم.
- صعوبة في الكتابة.
- وذمات في منطقة البطن.
- سوائل في الرئتين.
- تشنجات.
- تغيرات في التخطيط الكهربائي للقلب تطابق اضطرابات نظم القلب.
- تضرر العضل.
- إفراز من الثديين، تضخم شاذ للثديين، تضخم الثديين لدى الرجال.
- اضطرابات في الدورة الشهرية.
- فشل كلوي، تناقص حجم البول، احتباس البول.
- تناقص تعداد خلايا الدم البيضاء في فحوص الدم.
- سلوك شاذ، سلوك انتحاري، أفكار انتحارية.
- ردود فعل تحسسية (يمكن أن تتجلى بـ: صعوبات في التنفس، التهاب العينين [التهاب القرنية]، وردود فعل جلدية حادة تتجسد ببقع مستديرة، حمراء، غير بارزة في منطقة جذع الجسم، تكون مصحوبة أحيانا بحويصلات في المركز، تقشر الجلد، تقرحات في الفم، الحنجرة، الأنف، الأعضاء التناسلية والعيون. يمكن أن تكون لهذه الأعراض الجلدية الحادة أعراض مسبقة، مثل الحمى وأعراض شبيهة بالإنفلونزا (متلازمة ستيفنز جونسون، وتقرش الأنسجة المتموتة البشروية التسممي).
- يرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).

- الباركنسونية، أي أعراض تشبه مرض الباركنسون (الشلل الرعاش)، مثل: الرعشة، بطء الحركة (تراجع القدرة على الحركة) والتصلب (تصلب العضلات).

أعراض جانبية نادرة جدًا: يمكنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 شخص

- فشل كبد.
- التهاب كبد (Hepatitis).

أعراض جانبية وتيرة انتشارها غير معروفة:

- تطوّر التعلّق بليريكيا

بعد التوقف عن العلاج بليريكيا (سواء كان علاجاً قصير الأمد أو طويل الأمد) قد تختبر بعض الأعراض التي تُدعى أعراضاً انسحابية. (انظر بند 3 "إذا توقفت عن تناول الدواء").

أعراض جانبية معينة، مثل النعاس، يمكن أن تكون أكثر شيوعاً، لأن المرضى الذين يعانون من إصابة بالعمود الفقري من شأنهم أن يتناولوا أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبية مشابهة لتلك الخاصة بليريكيا ويمكن أن تزداد خطورتها عند تناولها سوية.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية بعد تسويق الدواء: صعوبة في التنفس وتنفس سطحي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال ومجال رؤيتهم و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Lactose, monohydrate, Maize starch, Talc, Gelatin, Water, Titanium dioxide, Sodium lauryl sulphate, Silica colloidal anhydrous.

كبسولات ليريكيا 75 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ، 225 ملغ و 300 ملغ تحتوي أيضاً:

Red iron oxide.

المستحضر يحتوي على لاكتوز مونوهيدرات:

ليريكيا 25 ملغ - 35 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 50 ملغ - 70 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 75 ملغ - 8.25 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 100 ملغ - 11 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 150 ملغ - 16.5 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 200 ملغ - 22 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 225 ملغ - 24.75 ملغ لاكتوز مونوهيدرات، ليريكيا 300 ملغ - 33 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ليريكيا 25 ملغ: كبسولة ذات لون أبيض مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 25" من الجانب الثاني.

ليريكا 50 ملغ: كبسولة ذات لون أبيض وخط أسود مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 50" من الجانب الثاني.
ليريكا 75 ملغ: كبسولة ذات لون أبيض - برتقالي مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 75" من الجانب الثاني.
ليريكا 100 ملغ: كبسولة ذات لون برتقالي مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 100" من الجانب الثاني.
ليريكا 150 ملغ: كبسولة ذات لون أبيض مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 150" من الجانب الثاني.
ليريكا 200 ملغ: كبسولة ذات لون برتقالي فاتح مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 200" من الجانب الثاني.
ليريكا 225 ملغ: كبسولة ذات لون أبيض - برتقالي فاتح مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 225" من الجانب الثاني.
ليريكا 300 ملغ: كبسولة ذات لون أبيض - برتقالي فاتح مطبوع عليها الكلمة "Pfizer" من جانب واحد و- "PGN 300" من الجانب الثاني.

يتوفر الدواء بعلبة ذات 14، 21، 28، 56، 84، 100، 112 كبسولة.

من الجائز ألا تسوق جميع أحجام العلب.

صاحب الامتياز وعنوانه: فايزر بي إف إي لصناعة الأدوية إسرائيلية م.ض.، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتواح 46725.

أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ليريكا 25 ملغ:	132.97.31185
ليريكا 50 ملغ:	132.98.31186
ليريكا 75 ملغ:	132.99.31187
ليريكا 100 ملغ:	133.01.31188
ليريكا 150 ملغ:	133.02.31189
ليريكا 200 ملغ:	133.03.31190
ليريكا 225 ملغ:	148.19.33471
ليريكا 300 ملغ:	133.04.31191

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحريرها في 03/2024