

سترون® 1 ملг

أقراص مطلية بفيلم

يحتوي كل قرص مطلية بفيلم على 1 ملغ جرانيسترون (كهيديروكلورايد)

Granisetron 1 mg (as hydrochloride)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في الدواء - انظر الفقرة 2 "معلومات

هامة عن بعض مركيبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية" في

النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أ杰لك. لا تعطه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لمنع الغثيان والتقيؤات الناتجة عن علاجات تبييض الخلايا.

الفصيلة العلاجية: من مضادات مستقبلات 5-HT3 (السيروتونين) -

مضادات الغثيان والتقيؤات.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كُنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة چرانيسترون أو لكل واحد من المركيبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

○ قبل العلاج بـ سترون 1 ملغ، إحدى الطبيب إذا:

• وُجد لديك إنسداد في الأمعاء الذي يسبب أعراضًا مثل ألم في البطن، غازات، غثيان أو تقيؤات، أو إمساك.

• وُجد لديك مشاكل في القلب، كنت تتناول دواء لعلاج السرطان الذي يُعرف بأنه ضار للقلب أو لديك مشاكل في نسب الأملاح في الجسم مثل: پوتاسيوم، صوديوم أو كالسيوم (عدم سلامة نسب الشوارد الكهربائية).

• كنت تتناول أدوية أخرى من فصيلة "مضادات مستقبلات 5-HT3". هذه الأدوية تشمل مثلاً الأدوية أوندانيسترون ودولاسيسترون وتستعمل بالمشابه لـ سترون. لمنع الغثيان والتقيؤات.

• إن إستعمال بوبرينورفين سوية مع سترون يمكن أن يؤدي إلى حدوث متلازمة السيروتونين، حالة قد تتشكل خطراً على الحياة (انظر فقرة "التدالخالت/التفاعلات بين الأدوية").

إن متلازمة السيروتونين عبارة عن رد فعل غير شائع، لكنها قد تتشكل خطراً على الحياة، حيث قد تحصل عند تناول سترون (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). قد تؤدي هذه المتلازمة إلى تغيرات جدية في نشاط الدماغ، العضلات والجهاز الهضمي لديك. رد الفعل يمكن أن يحدث إذا كنت تتناول فقط سترون، لكنه من المرجح أكثر أن يحدث عند الإستعمال المشترك لـ سترون مع أدوية معينة إضافية (خاصة فلوأوكسيتين، باروكسيتين، سيرترالين، فلوفووكسامين، سيتالوپرام، إستيتالوپرام، ثينلافاكسين، دولوكسيتين). عليك إعلام الطبيب، الممرضة أو الصيدلي حول كافة الأدوية التي تتناولها.

الحمل والإرضاع

لا يجوز تناول أقراص سترون إذا كنت حاملاً، تحاولين الحمل أو مرضعة، إلا إذا أوصاك الطبيب بتناولها.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتدين بأنك حامل أو تحاولين الحمل، إستشيري الطبيب، الممرضة أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

السيادة وإستعمال الماكنتات

من غير المفترض أن يؤثر سترون على القدرة على السيادة أو تشغيل الماكنتات.

معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز (نوع من السكر). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، مثل اللكتوز، توجه للطبيب قبل بدء إستعمال الدواء.

يحتوي كل قرص على أقل من 23 ملг صوديوم، وبالتالي يعتبر الدواء خالٍ من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الموصى به يتغير من متعالج لآخر. يتعلق المقدار الدوائي بعمر المتعالج وبوزنه.

يتم تناول قرص واحد مرتين في اليوم أو قرصين إثنين مرة في اليوم، لفترة أقصاها أسبوع بعد علاج كيميائي أو علاج إشعاعي، حيث يتم تناول المقدار الدوائي الأول قبل حوالي ساعة من العلاج.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة كيغماً حدد من قبل الطبيب المعالج. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة التناول

يجب بل الأقراص بشكلا الكامل مع الماء.

السحق/ الشطر /المضغ: لا يجوز مضغ /سحق /شطر القرص لأنه مطلي.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. أعراض فرط المقدار الدوائي تشمل صداع معتدل. سيتم علاج وفقاً للأعراض لديك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، يجب إستشارة الطبيب أو الممرضة. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسى.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء قبل إنتهاء العلاج. إذا توقفت عن التناول، فإن الأعراض قد تعود. إذا رغبت في التوقف عن تناول الدواء، تحدث عن ذلك مع طبيبك أولاً.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا تتوفر لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سترون قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهبش من قائمة الأعراض الجانبية. من الحالات لأن تعاني أي منها.

• يجب التوجيه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من ردود فعل تحسسية (صدمة إستهدافية). الأعراض من شأنها أن تشمل: انتفاخ في الحنجرة، في الوجه، في الشفتين وفي الفم، صعوبة في التنفس أو في البلع.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):

• صداع.

• إمساك. يقوم طبيبك بمراقبة حالتك.

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

• أرق (insomnia).

• تغيرات في وظائف الكبد التي تتجلى في فحوص الدم.

• إسهال.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

• طفح جلدي أو رد فعل تحسسي في الجلد أو شرى (urticaria). علامات ذلك قد تشمل تنوءات حمراء وحكة على سطح الجلد.

• تغيرات في نظم القلب وتغيرات التي تتجلى في فحوص ECG (مخطط النشاط الكهربائي للقلب).

• حرکات شاذة لا إرادية مثل: إرتجاف، تصلب العضلات وتكلسات عضلية.

- متلازمة السيروتونين. الأعراض قد تشمل: إسهال، غثيان، تقيؤات، سخونة وضغط دم مرتفعين، تزايد التعرق وتسارع نظم القلب، قلة هدوء (هيجان)، إرثابا، هلسة، إرتجاف، رجفان عضلي، تقلصات عضلية مفاجئة، تشنج أو تصلب العضلات، فقدان التنسق، وعزم راحة.

- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداچيس بواسطة العنوان التالي:
Padagis.co.il

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال / أو الرضيع، وذلك تفادياً إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة واللوبيحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان بارد، ما دون 25 درجة مئوية.

(6) معلومات إضافية

- يحتوى الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate (type A), opadry (consists of: hydroxypropylmethylcellulose, titanium dioxide, macrogol 400, polysorbate 80), hydroxypropylmethylcellulose, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

علبة تحتوي على 10 أقراص مستديرة مطلية بفيلم ذات لون أبيض حتى أوف - وابت (off-white) مطبوع عليها 'GS' من جانب واحد والجانب الآخر أملس.

صاحب الإمتياز والمستورد: وكالات باداچيس إسرائيل م.ض، شارع راكيفيت 1، شوهم.

تم إعدادها في تشرين الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 108-57-29244

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.