

רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת פאדאגיס מבקשת ליידע אתכם על עדכון העלונים לרופא ולצרכן של התכשיר:

Setron 1 mg film coated tablet

סטרון טבליות מצופות פילם

החומר הפעיל בתכשיר וחוזקו:

1 mg granisetron (as hydrochloride)

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Prevention of nausea and vomiting induced by cytostatic therapy.

מהות העדכון:

עדכוני בטיחות ועדכונים נוסח בהתאם לעלון האסמכתא, תנאי הרישום ובהתאמה להנחיות משרד הבריאות.

ברצוננו לציין כי חלו החמרות בעלון לצרכן:

[...]

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, **כגון ללקטוז**, פנה לרופא לפני תחילת השימוש בתרופה. כל טבליה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן, ולכן התרופה נחשבת כנטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המומלץ משתנה ממוטופל למטופל. המינון תלוי בגיל המטופל ובמשקלו. נוסלים טבליה אחת פעמיים ביום או 2 טבליות פעם ביום, למשך עד שבוע לאחר טיפול כימותרפיה או רדיותרפיה, כאשר את המנה הראשונה לוקחים כשעה לפני הטיפול. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

צורת הנטילה

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם מים. כתישה/חצייה/לעיסה: אין ללעוס/לכתוש/לחצות את הטבליה מכיוון שהיא מצופה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד **או מישהו אחר** מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר המיון של בית חולים **הקרב והבא אריזת התרופה איתך** - **קח את האריזה ואת שאריות הטבליות איתך**. התסמינים למנת יתר כוללים **כאבי ראש קלים מתונים**. אתה תטופל בהתאם לתסמינים שלך.

[...]

העלונים המעודכנים לרופא ולצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#/byDrug>

בברכה,

פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ