

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים
(תקנירם) התשנ"ג - 1986

התווצה משוקחת ללא מרשם רפואי.

יודיפלור משחה

1. שם התכשיר וצורתו: Iodiflor Ointment.
יודיפלור משחה

2. הרכב: החומרים הפעילים וכמותם/רכיביהם:
PVP-Iodine 10% equivalent to 1% iodine

מרכיבים בלתי פעילים:

PEG 400, PEG 4000,
Purified water, Trisodium phosphate.

3. קבוצה טיפולית: תכשיר לדוחה לחיטוי.

4. פעילות רפואיות: חיטוי העור.

5. התווצה מיועדת ל: חיטוי זיהומי עור,

פצעים וכוויות השחיתות.

6. מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה ריגושים לאחד
מרכיבי התכשיר ובמיוחד לדוחה!

7. אין להשתמש בתווצה בגין להיוועץ

ברופא לפני התחלת הטיפול: אם היין
סובלן או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד
בלוותת התנים (טירואיד).

8. אזהרות: אם גורת ריששה למבחן כלשונה
لتווצה כלשהן, עליך להודיע על-כך לרופא
לפני טיפול התווצה.

יש להימנע שימוש על אזורים נרגבים של
עור פגוע. יש להיזהר עליון צחצחו ברפואה לפני
בפצעים עמוקים או כוויות קשות.
אי להשתמש בתווצה זו לעיטם קרובות או
תקופה ממושכת בעלי להיוועץ לרופא.

9. תగובות ב-нт-תרופתיות: אם היין נוטל/
תנווצה נוספת, או אם גורת זאת עתה טיפול
בתווצה נוספת, עליך לדוחה לרופא המטפל
כדי למנוע סיכונים או א-יעילות הנובעים
מתגובהות ב-нт-תרופתיות.

10. תופעות לוואי: בנוסף לפעלויות הרציניה
של התווצה, כגון התווצה בה עלולות להופיע
תופעות לוואי, כגון: פריחה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעליל מין
התווצה, פנה/י מיד לחדר מין של בית-חולום,
והבא/י אריזת התווצה איתך.
אין לגרותם להקה ללא הוואה מפורשת
מרופא!

16. אונטילול תרופות בחושך יש לבדוק את
התווצה והמנה **בכל פעע** שהינך נוטל/ת
הרפה.

יש להרכיב משקפיים אם היין זקוק/ה להם.
17. אחסנה: במקום קרייר
(בטמפרטורה עד 25°C).

ניתן להשתחמם בתכשיר עד 12 חודשים מרגע
פתיחהו. גם לפני תגאי הארייה/האחסנה
הומולצים, תרופות נשמרות לתוקפה מוגבלת
בלבד. אך לשים לב לתאריך התווצה של
התכשיר! במל מקרה של ספק, עליך להיזהר
ברוקח שיספיק לך את התווצה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה ארייה.

עלון זהה נערך ב-08.2022 בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.

מספר רישום התווצה: 00 31802 02 141 02
ישראל: בן-שםעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה
משגב, 2017400,

תופעות המחייבות התווצה מיוחדת: גירוי
או נפיחות מתמשכים (נדיר): הפסק/י את
הטיפול ונופה/י לרופא.
בכל מקרה בו הנקה מגיש/ה תופעות לוואי
שלא ציין בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך
הכלילית עליך להתייעץ עם הרופא מין.

11. תופעות לוואי ותגובה ב-нт-תרופתיות
בילדים ותינוקות: על ההורים לדוחו לרופא
המטפל על כל תופעת לוואי הנמצאת בילד/ה.
ראיה/י לעיל תופעות לוואי ותגובה
ב-нт-תרופתיות מזיהדות שפירותו.
ניתן לדוחו על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות הטופס המוקן לדוח על תופעות
לוואי שנמצאה בדף הבית של אטר משרד
הבריאות: www.health.gov.il
או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

12. מינון מקובל בהיעדר הוואה אחרת
מרופא: יש למרוח משחת יודיפלור על פצע
או האזרוע המטופל 4-2 פעמים ביום עד ריפוי
הפצע.
ניתן למלוח על גזה ולכסות בתחבושת.
אם לא חל שיפור במצב תוך תוך 7-10 ימים יש
לפנות לרופא.

13. שימוש ללב: לא לבלוע!
תווצה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
14. אופן השימוש: של למלוח משחת יודיפלור
על פצע או האזרוע המטופל 2-4 פעמים ביום
עד ריפוי הפצע. ניתן למלוח על גזה ולכסות
בתחבושת אם לא חל שיפור במצב תוך מספר
ימים יש לפנות לרופא.

15. מניע/הרעלה!
תווצה זו גולת תרופה אחרת יש לשמר במקום
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים / או תינוקות
ועל-ידיך תמן/ה הרעה.

