



بالإمكان الدهن على شاش وتغطيته بضماد. إذا لم يطرأ تحسن على الوضع خلال عدة أيام يجب مراجعة الطبيب.

(١٣) انتبه ي: لا يجوز البلع!

هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

(١٤) إرشادات الإستعمال:

يجب دهن مرهم يوديفلور على الجرح أو على المنطقة

العلاجية ٢ - ٤ مرات في اليوم

حتى شفاء الجرح. بالإمكان الدهن على شاش وتغطيته

بضماد. إذا لم يطرأ تحسن

على الوضع خلال عدة أيام يجب مراجعة الطبيب.

(١٥) تجنب ي/ التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل

دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و

/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع

الطفل/ة خطأ من هذا الدواء،

عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب ي/ التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

(١٦) لا تتناول ي/ الأدوية في العتمة! يجب تشخيص

طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل

مرة تتناول ي/ين فيها دواء.

ضع ي/ النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

(١٧) التخزين: في مكان بارد

(بدرجة حرارة الغرفة حتى ٢٥ درجة مئوية).

يمكنك استخدام المنتج حتى ١٢ شهر من لحظة فتح العبلة.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو

ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن.

الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر

الدونة على العبوة. في حالة الشك: عليك إستشارة

الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين

أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٤١٠٢٣١٨٠٢٠٠

تم إعداد هذه النشرة بتاريخ 08.2022 وفقاً

لتعليمات وزارة الصحة

المنتج: بن-شمعون فلويس م.ض., المنطقة الصناعية

مسجاب ٢٠١٧٤٠٠

(٩) التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج

الآن بدواء آخر، فيجب إعلام

الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة

النتيجة عن التفاعلات بين العقاقير.

(١٠) الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر

أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل: طفح

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

تهيج أو إنتفاخ متواصلين (نادراً): توقف ي/ عن العلاج

وراجع ي/ الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه

النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير

على شعورك العام، عليك عندئذ إستشارة الطبيب حالاً.

(١١) الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند

الأطفال والرضع:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير

جانبي يبدو لدى الطفل/ة.

راجع ي/ الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية

والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

يمكنك إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية باستخدام النموذج

الإلكتروني للإبلاغ عن الأعراض

الجانبية الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

www.health.gov.il

أو عن طريق إدخال الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(١٢) المقادير الدوائية الإعتيادية في غياب تعليمات

أخرى من الطبيب:

يجب دهن مرهم يوديفلور على الجرح أو على المنطقة

العلاجية ٢ - ٤ مرات في اليوم حتى شفاء الجرح.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) ١٩٨٦

يجري تسويق الدواء دون وصفة طبية.

يوديفلور مرهم

(١) إسم المستحضر وشكله: Lodiflor Ointment

يوديفلور مرهم

(٢) التركيب:

المواد الفعالة وكمياتها/ تركيزها:

PVP-iodine 10% equivalent to 1% iodine

المواد غير الفعالة:

PEG 400, PEG 4000, Purified water,

Trisodium phosphate.

(٣) الفصيلة العلاجية: مستحضر يود للتطهير.

(٤) تأثيرات الدواء الطبية: تطهير الجلد.

(٥) هذا الدواء مخصص لـ: تطهير تلوثات الجلد،

الجروح والحروق السطحية.

(٦) متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز الإستعمال إذا وجدت حساسية لأحد مركبات المستحضر خاصة لليود!

(٧) لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة

الطبيب مقدماً:

إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي

من خلل في وظيفة الغدة الدرقية (تيرويد).

(٨) تحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية

لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

تجنب الإستعمال على مساحات واسعة من جلد مصاب.

يجب إستشارة الطبيب قبل معالجة الجروح

العميقة/ الحروق الشديدة.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في أوقات مقاربة أو

لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب.