

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משוקת ללא מרשם רופא.

יודיפלור משחה

1. שם התכשיר וצורתו: lodiflor Ointment
יודיפלור משחה
2. הרכב: החומרים הפעילים וכמותם/ריכוזם:
PVP-iodine 10% equivalent to 1% iodine

מרכיבים בלתי פעילים:
PEG 400, PEG 4000,
Purified water, Trisodium phosphate,
3. קבוצה תרופתית: תכשיר יוד לחיטוי.
4. פעילות רפואית: חיטוי העור.
5. התרופה מיועדת ל: חיטוי ידיומי עור,
פצעים וכוויות שטחיות.
6. מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד
ממרכיבי התכשיר ובמיוחד ליוד!

7. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ

ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך
סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד
בלוטת התריס (תירואיד).

8. אזהרות: אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או
לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא
לפני נטילת התרופה.

יש להימנע משימוש על אזורים נרחבים של
עור פגוע. יש להיוועץ ברופא לפני טיפול
בפצעים עמוקים/כוויות קשות.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או
תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

9. תגובות בין-תרופתיות: אם הינך נוטל/ת
תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול
בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל
כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים
מתגובות בין-תרופתיות.

10. תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה
של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע
תופעות לוואי, כגון: פריחה.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: גירוי
או נפיחות מתמשכים (נדיר): הפסקי/ את
הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי
שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך
הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

11. תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות
בילדים ותינוקות: על ההורים לדווח לרופא
המטפל על כל תופעת לוואי הנצפית בילד/ה.
ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות
בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות
לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד
הבריאות: www.health.gov.il
או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

12. מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת

מרופא: יש למרוח משחת יודיפלור על פצע
או האזור המטופל 2-4 פעמים ביום עד ריפוי
הפצע.

ניתן למרוח על גזה ולכסות בתחבושת.
אם לא חל שיפור במצב תוך מספר ימים יש
לפנות לרופא.

13. שימי לב: לא לבלוע!
התרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

14. אופן השימוש: יש למרוח משחת יודיפלור
על פצע או האזור המטופל 2-4 פעמים ביום
עד ריפוי הפצע. ניתן למרוח על גזה ולכסות
בתחבושת, אם לא חל שיפור במצב תוך מספר
ימים יש לפנות לרופא.

15. מנע/י הרעלה!
התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות
ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים,
והבא/י אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת
מרופא!

16. אין ליטול תרופות בחשור! יש לבדוק את
התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת
תרופה.

יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
17. אחסנה: במקום קריר
(בטמפרטורה עד 25°C).

ניתן להשתמש בתכשיר עד 12 חודשים מרגע
פתיחתו. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה
המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת
בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של
התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ
ברוק שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

עלון הזה נערך ב-08.2022 בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.

מס' רישום התרופה: 00 141 02 31802
יצרן: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה
משגב, 2017400

