



## هيموفيليا A مكتسبة

- نزيف من جرح الذي يستغرق وقتًا أطول من المعتاد لإيقافه
- ميل إلى حدوث كدمات بشكل تلقائي، نزيف من الأنف، ألم أو تورم في المفاصل

## الفرغية القليلة الصفائح الخثرية

### Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)

- كدمات تحت الجلد أو في الفم، التي قد تظهر كبقع حمراء، مع أو دون تعب شديد غير مبرر، حمى، ارتباك، تغيرات في الكلام، اصفرار الجلد أو العينين (يرقان)، قلة التبول، بول داكن اللون

### داء ستيل (Adult Onset Still Disease (AOSD))

- حمى أعلى من 39°C تستمر لأكثر من أسبوع واحد، ألم، تصلب مع أو بدون تورم في عدد من المفاصل و/أو طفح جلدي

### التهاب الدماغ (encephalitis) المناعي الذاتي

- تغيرات سلوكية و/أو نفسية، اضطرابات حركة، فقدان ذاكرة على المدى القصير أو اختلاجات كذلك أعراض إضافية يمكن أن تحاكي نوبة تصلب متعدد

من المهم جدًا أن تواظب على إجراء الفحوصات الشهرية منذ انتهاء العلاج الأول ولمدة 48 شهرًا (4 سنوات) على الأقل بعد التسريب الأخير بليمترادا (حتى لو كنت تشعر بأنك على ما يرام).

قد تحدث الأعراض الجانبية المتأخرة أيضًا بعد أكثر من 48 شهرًا، لهذا عليك أن تنتبه إلى العلامات والأعراض، حتى عندما لا تعود الفحوصات الشهرية مطلوبة.

48

افعل ذلك لمدة 48 شهرًا على الأقل بعد تلقي دورة علاجك الأخيرة بليمترادا



يجب أن تستمر في مراقبة ظهور العلامات والأعراض

!

الاكتشاف والتشخيص في مرحلة مبكرة قد يزيدان احتمال تحسن حالتك

يمكنك التواصل مع طبيب الأعصاب الذي وصف لك ليتمترادا وذلك عبر رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الوارد أدناه.

قد يُذكر في القائمة أيضًا تفاصيل أطباء آخرين وأعضاء طاقم طبي آخرين المشاركين في علاجي. إذا أجريت تقييمات طبية أيا كانت، يُرجى تقديم نسخ من كل السجلات الطبية، بما في ذلك العلاجات و/أو نتائج الفحوصات، إلى الأطباء والمرضات المدرجين في القائمة التالية.

اسم متلقي العلاج: ..... توقيع متلقي العلاج: .....

تاريخ تلقي الدورة العلاجية الأخيرة من ليتمترادا: .....

الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني
طبيب الأعصاب		
طبيب العائلة		
ممرضة خبيرة بالتصليب المتعدد		

تم تحديث صيغة هذه البطاقة ومحتواها، وصادقت عليهما وزارة الصحة في كانون الأول 2022.

يمكن الإبلاغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي

<https://sideeffects.health.gov.il>

كما يمكن إبلاغ شركة سانوفي عبر الهاتف 098633081

## PATIENT ALERT CARD

Please carry this card with you at all times and show it to all emergency and healthcare providers involved in your care to inform them about your treatment with LEMTRADA.

I have been treated with LEMTRADA, a treatment for multiple sclerosis (MS), which affects the immune system. I am participating in a special monitoring programme which continues for at least 48 months after my last treatment.

### LEMTRADA treatment may increase the risk of:

- Serious infections
- Serious side effects that usually occur within 1 to 3 days of LEMTRADA infusion: heart attack, stroke, tears in blood vessels supplying the brain, bleeding in the lung, and thrombocytopenia
- Delayed side effects: thyroid disorders, ITP, kidney problems, autoimmune hepatitis, HLH, acquired haemophilia A, TTP, AOSD and AIE

Doctors: See LEMTRADA Summary of Product Characteristics (SPC) for more information

### What you should know about LEMTRADA® (alemtuzumab)

Call your neurologist right away to report these symptoms no matter if they are new, worsening or returning symptoms. Seek medical attention if you cannot reach your own doctor, and make sure you show them this card.

As with any medicine, use of Lemtrada may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of them.

### IMPORTANT SIDE EFFECTS TO WATCH FOR:

#### Serious infections

Fever, chills, fatigue, shortness of breath, cough, wheezing, chest pain or tightness and coughing up blood

#### Rare brain infection called PML (progressive multifocal leukoencephalopathy)

- Progressive weakness or clumsiness of limbs,
- Disturbance of vision, speech difficulties, or
- Changes in thinking, memory, and orientation leading to confusion and personality changes

#### Serious side effects occurring shortly after LEMTRADA infusion (usually within 1-3 days of infusion)

##### Heart attack

- Chest pain or discomfort, shortness of breath, pain or discomfort in arms, jaw, neck, back or stomach
- Feeling dizzy or lightheaded, nausea, sweating

##### Stroke and tears in blood vessels supplying the brain

- Sudden onset of drooping of parts of the face, weakness on one side, difficulty with speech
- Sudden severe headache, neck pain

##### Bleeding in the lungs

- Coughing blood
- Shortness of breath, chest pain or discomfort

##### Thrombocytopenia

- Easy bruising and/or bleeding

##### Delayed side effects (which can occur months to years after infusion)

##### Thyroid disorders

- Hyperthyroidism - Excessive sweating, unexplained weight loss, eye swelling, nervousness, fast heartbeat
- Hypothyroidism - Feeling cold, unexplained weight gain, worsening tiredness, newly occurring constipation

##### Immune thrombocytopenic purpura (ITP)

- Bleeding from your gums or nose that is new or takes longer than usual to stop, coughing up blood
- Small scattered spots on your skin that are red, pink or purple, spontaneous or easy bruising, bleeding from a cut that is harder to stop than usual, heavier, longer or more frequent menstrual periods than normal
- Painful or swollen joints

##### Kidney problems including anti-Glomerular Basement Membrane disease (anti-GBM disease)

- Blood in the urine which may be red or tea-coloured, swelling in your legs or feet, coughing up blood

##### Autoimmune hepatitis

- Unexplained nausea, vomiting, fatigue, abdominal pain, loss of appetite, abdominal swelling
- Yellow skin and eyes and/or dark urine, bleeding or bruising more easily than normal

##### Haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)

- Unexplained high fever, severe headache, stiff neck, lymph node enlargement, yellow skin, skin rash

##### Acquired haemophilia A

- Bleeding from a cut that takes longer than usual to stop
- Spontaneous bruising, nose bleeds, painful or swollen joints

##### Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)

- bruising under the skin, or in the mouth, that may appear as red pinpoint dots, with or without unexplained extreme tiredness, fever, confusion, speech changes, yellowing of the skin or eyes (jaundice), low amount of urine, dark colored urine

##### Adult onset still disease (AOSD)

- Fever >39°C lasting more than 1 week, pain, stiffness with or without swelling in multiple joints and/or a skin rash

##### Autoimmune encephalitis

- Behavioural and/or psychiatric changes, movement disorders, short term memory loss or seizures as well as other symptoms which may resemble an MS relapse

It's very important that you continue to attend your monthly tests from the end of the first treatment course and for at least 48 months (4 years) after your last LEMTRADA infusion (even if you are feeling well).

Delayed side effects may occur beyond 48 months. Therefore, you must continue to look out for the signs and symptoms, even after your monthly tests are no longer required.

!

Early detection and diagnosis may give you the best opportunity for improvement



You must also continue to watch for signs and symptoms

48

Do this for at least 48 months after your last course of treatment with LEMTRADA

My neurologist prescribing LEMTRADA can be contacted via phone or email using the details below. Other doctors or healthcare professionals involved in my care may also be listed.

If any medical evaluations are undertaken, please provide copies of all medical records, including any treatments and/or test results, to the doctor(s) and nurse(s) listed below.

Patient name: .....

Patient signature: .....

Date of last LEMTRADA infusion: .....

Name	Phone number	Email
Neurologist		
General Practitioner		
MS Nurse		

The format and content of this Patient Card was updated and approved by the Ministry of Health on December 2022.

Adverse events can be reported to the Ministry of Health by using an online form: <https://sideeffects.health.gov.il>. Also, can be reported directly to Sanofi 09-8633081.