

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (תקשיירם) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

bosentan טبع 62.5 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

Bosentan (as monohydrate) 62.5 mg

bosentan (כמוניידראט) 62.5 מ"ג

bosentan טבע 125 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

Bosentan (as monohydrate) 125 mg

bosentan (כמוניידראט) 125 מ"ג

למ"ד על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מ"ד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מ"ד נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמצית עלי התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם/מצבם הרפואי דומה.

מ"ד בטיחותי למטופל

אין ליטול bosentan טבע אם את בהריון מאחר שהשימוש בתרופה זו עלול להזיק לעובר (ראי סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה" בתתי הסעיפים "אין לשימוש בתרופה אם" ו"פוריות, הריון והנקה").

אם את אישת בಗיל הפוריות העשויה להרhot, יש לבצע בדיקת הריון לפני תחילת הטיפול בbosentan טבע ובאופן שגרתי כל חדש במהלך הטיפול בתרופה, וכן חדש לאחר סיום הטיפול. יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת הריון. הנר חייבת להשתמש באמצעי מהימן למניעת הריון במהלך השימוש בbosentan טבע, וכן חדש אחד נוסף לאחר סיום הטיפול (ראי סעיף 2 תת סעיף "פוריות, הריון והנקה").

בנוסף לעalon, לתרופה bosentan טבע קיימים כרטיסים אזהרה למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת לפני תחילת הטיפול ובמהלך הטיפול בbosentan טבע ולפועל על פיו. יש לעיין בכרטיס אזהרה למטופל ובalon לצרcn בטרם תחילת השימוש בתרופה. יש לשמור את הכרטיס והalon לעיון נוסף בעת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

- טיפול בגין לחץ דם ריאתי עורקי (PAH – pulmonary arterial hypertension) בחולים עם דרגה תפוקודית VII-II לפי WHO (ארגון הבריאות העולמי).
- להפחיתה במספר הכלבים החדשניים המופיעים באצבעות (digital ulcers) במטופלים שסובלים מטרשת רקמת חיבור עם כיבים פעילים באצבעות.

קבוצה רפואיית: חום של הרצפטור אננדוטלי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (bosentan) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המופיעים בסעיף 6 "מידע נוסף".
 - יש לך בעיות בכבד (התיעץ עם הרופא שלך).
 - את בהירין או עשויה להירין מכיוון שאין משתמש באמצעות מונעת מהימנים (אמצעי מנעה הורמונליים לבדים אינם יעילים בעת נתילת bosentan טبع). למידע נוסף, אני ראי תחת סעיף "פוריות, הירין והנקה".
 - אתה נוטל ציקלוספורין A (תרופה אשר משתמשים בה לאחר השתלה או לטיפול בסוראייזיס [ספחת]).
- התיעץ עם הרופא שלך אם מצבים אלה רלוונטיים אליך.

ażhorot miyadot haengutot leshimush batrufa

בדיקות ומעקב:

בדיקות רפואי יבצע לפני תחילת הטיפול:

- בדיקת דם על מנת להעריך את תפקודו הכביד
- בדיקת דם לצורך גילי אנמיה (המוגלבין נמור)
- בדיקת הירין אם את אישת בגיל הפוריות

בחלק מהמטופלים שנטו בוSENTAN טבע נמצאו בבדיקות תפקודי כבד לא תקיןות ואנמיה (המוגלבין נמור)

בדיקות רפואי יבצע במהלך הטיפול:

במהלך הטיפול בוSENTAN טבע, רפואי יבצע בבדיקות דם שגרתיות על מנת לבדוק שינויים בתפקודו הכביד ורמת המוגלבין.

למידע בנוגע לבדיקות אלה עיין גם בכרטיס אזהרה למטופל (המצויר לאירוע התכשיר).
חשוב לבצע בבדיקות דם שגרתיות אלה כל עוד הנר מטופל בוSENTAN טבע. אנו מציעים לך לכתוב בכרטיס אזהרה למטופל את התאריך של הבדיקה האחרונה וכן גם את התאריך של הבדיקה הבאה (שאל את הרופא לגבי התאריך), זאת על מנת לעזור לך לזכור متى עלייך לבצע את הבדיקה הבאה.

בדיקה דם להערכת תפקודי הכביד:

בדיקות אלו תיערכנה בכל חודש במהלך הטיפול בוSENTAN טבע. בדיקה נוספת תתבצע שבועיים לאחר העלאת המינון.

בדיקה דם לגילי אנמיה:

בדיקות אלו תיערכנה בכל חודש במהלך החודשים הראשונים של הטיפול בתרופה, ובכל שלושה חודשים לאחר מכן, מכיוון שמטופלים הנוטלים בוSENTAN טבע עלולים לפתח מצב של אנמיה.

אם תוצאות בדיקות אלו אינן תקינות, רופאך יכול להחליט להפחית את המינון או להפסיק את הטיפול בתרופה ולבצע בדיקות נוספת על מנת לבדוק את הסיבה לתוצאות אלו.

תగובות בין תרופתיות:

- אם אתה לוקח או אם לך **חת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כר ל佗 או ל佗. במיוחד אם אתה לוקח:**
- ציקלוספורין A (טרופה אשר משתמשים בה לאחר השתלות ולטיפול בפסוריאזיס).
 - השימוש ייחד עם בוסנטן טבע אסור.
 - סירולימוס או טקורולימוס (תרופות אשר משתמשים בהן לאחר השתלות). השימוש יחד עם בוסנטן טבע אינם מומלץ.
 - גלייבנקלמיך (טרופה לטיפול בסוכרת), ריפאמפיצין (טרופה לטיפול בשחפת), פלוקונזול (תרופה לטיפול בזיהומיים פטריאטיביים), קטוקונזול (תרופה לטיפול בתסמנות קושינג [syndrome Cushing's] או נבירא芬) (תרופה לטיפול בזיהום HIV [איידס]) – השימוש בתרופות אלה יחד עם בוסנטן טבע אינם מומלץ.
 - תרופות אחרות לטיפול בזיהום HIV (איידס) – נדרש מעקב מיוחד בשימוש יחד עם בוסנטן טבע.
 - אמצעי מניעה הורМОנליים (מכיוון שאינם יעילים כאמצעי היחיד למניעת הירין בעת נתילת בוסנטן טבע). רופאך /או הגניקולוג שלך יקבעו את אמצעי המנעה המתאים עבורך. למידע נוסף, אני ראי תחת סעיף "פוריות, הירין והנקה" וכן "כרטיס זהירה למטופל" המצורף לאירוע ועליך לעמוד בו.
 - סימבאסטאטין לטיפול בהיפרcolesterolמיה.
 - ווארפין (למניעת קרישת דם).
 - תרופות אחרות לטיפול יתר לחץ דם ריאתי: סילדנסטיל וטדאלפייל

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול את התרופה עם אוכל או ללא אוכל.

פוריות, הירין והנקה:

אל תיטלי בוסנטן טבע אם אתה בהירין או מתכונת להיכנס להירין. **פוריות:** אם אתה גבר שנוטל בוסנטן טבע, תרופה זו עלולה להקטין את ספירת הזרע שלך. לא ניתן לשולח השפעה על הפוריות שלך. היועץ ברופא אם יש לך שאלות או חששות בעניין זה.

hirion:

- בוסנטן טבע עלולה לגרום נזק לעוברים מהירין שהחל לפני או במהלך הטיפול בה. אם הינך איש בגיל הפוריות העשויה להרמות, רופאך יבקש ממך לבצע בדיקת הירין לפני תחילת הטיפול בbosentan טבע ובאופן שגרתי כל חדש במהלך נטילת התרופה וכן חדש לאחר סיום הטיפול. יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת הירין.

אמצעי מניעה:

- הינך חייבת להשתמש באמצעי מהימן למניעת הירין במהלך השימוש בbosentan טבע, וכן חדש אחד בנוסף לאחר סיום הטיפול.
- רופאך או הגניקולוג שלך ידריכו אותך לגבי אמצעים מהימנים למניעת הירין במהלך השימוש בbosentan טבע. התרופה עלולה לגרום לחוסר יעילות של אמצעי מניעה הורמונוליים (כגון: אמצעים הניטילים דרך הפה, זריקות, שתלים או מדבקות עוריות) ולכן

- שיטה זו בפני עצמה אינה מהימנה.
- הרופא ימליץ לך על אמצעי מניעה אחד בעל עילוות גבוהה, למשל התקן תוך רחמי או קשירת החצוצרות או שימוש בשילוב של שיטות (כגון אמצעי מנעה הורמוני ואמצעי מנעה חיצני, כגון: דיאפרגמה, ספוגית למניעת הריוון או שעל בן הזוג שלך להשתמש אף הוא בקונדום) או שני אמצעי מנעה חוצצים. התיעצי עם הרופא שלך בנוגע לשימוש בשתי שיטות למניעת הריוון.
- אם השיטה שנבחרה למניעת הריוון היא ניתוח של בן הזוג לכריתת צינור הזרע, חובה להשתמש במקביל באמצעות הורמוני או חוץ.

באריזת התכשיר מצורף כרטיס אזהרה למטופל. עליך למלא כרטיס זה ולהציגו בפני הרופא שלך בביוקר הבא, כך הרופא שלך או הגניקולוג יוכל להעירך אם יש צורך באמצעי מנעה מהימנים נוספים או חלופיים.

דווחי לרופאך באופן מיידי אם נכנסת להריון במהלך השימוש בbosentan טבע, אם הינך חשوبת שיתכן שאת בהריון או אם את מתכוננת להרות בעתיד הקרוב.

הנקה:

- bosentan טבע עוברת לחלב האם שלך.
- מומלץ להפסיק להנקה אם נרשמה לך התראפה בbosentan טבע מכיוון שלא ידוע אם מעבר התראפה בחלב האם יכולה לגרום בתינוק. התיעצי עם הרופא בנוגע לכך.

היגיה ושימוש במكونות

لبוסנטן טבע אין השפעה או יש השפעה זניחה על היכולת לנוהג ולהפעיל מكونות. עם זאת, התראפה יכולה לגרום לירידה בליח הדם שיכולה לגרום לך לחוש סחרחות ולהשפע על ראייתך ולהשפע על יכולתך לנוהג ולהפעיל מكونות. לכן, אם הינך חש סחרחות או שראייתך מוטשטשת במהלך נטילת התראפה, אין לנוהג ברכב או להפעיל מכשירים ומكونות.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התראפה

תרופה זו מכילה פחתות מ-23 מ"ג נתרן בטבלייה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד השתמש בתראפה?

- רק רופא המנוסה לטיפול ביתרי לחץ דם ריאתי או בטרשת מערכת (סקלרוודרומה) ייזום את התחלת הטיפול בbosentan טבע ויבצע מעקב.
- יש להשתמש בתראפה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח האם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתראפה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

מבוגרים

בדרכ כל ניתן מינון של 62.5 מ"ג פומיים ביום (בערב ובבוקר) לפחות ארבעת השבועות הראשונות של הטיפול במבוגרים. לאחר מכן מכך רופאך בדרכ-כליל ייעז לך ליתול מינון של 125 מ"ג פומיים ביום, בהתאם לתגובהך לבוסנטן טבע.

ילדים ומתבגרים

bosentan טבע אינה מומלצת לשימוש ילדים ובמתבגרים הסובלים מטרשת רב-מערכתית ומכניםים באצלעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם יש לך רושם שהשפעת בבוענテン טבע הינה חלשה או חזקה מידי, דוח לרופא על מנת לברר אם יש צורך בשינוי המינון.

צורת הנטילה

יש לבלווע את התרופה עם כוס מים, עם או ללא אוכל. אין לכטוש, לחצותו או ללעוס את הטבליות.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר פנה מיד לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול התרופה זו בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד כשןצרת, ולאחר מכן המשך לקחת את הטבליות בזמן הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד כדי לפצות על הטבליות שנשכחו.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

הפסקה פתאומית של הטיפול בבוענテン טבע, עלולה לגרום להחמרה התסמיינים. אין להפסיק את נטילת התרופה, אלא אם כן רופא הורה לך לעשות כן. רופא עשוי ליעץ לך להפחית את המינון במהלך מספר ימים לפני הפסקה מוחלטת של נטילת התרופה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהן נוטל תרופה. הרכב

משמעותם אם הנר זמין להם.

אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבוענテン טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות הלואוי החמורות ביותר במהלך הטיפול בבוענテン טבע הן:

- תפקוד כבד לא תקין אשר עלולים להופיע אצל יותר ממשתמש אחד מתוך עשרה.
- אנמיה אשר עלולה להופיע אצל 10-10% משתמשים מתוך 100. לעיתים נדרש דם כתוצאה מאנמיה.

תקופדי כבד וערכים בבדיקות דם יהיו במקבב במהלך הטיפול בבוענテン טבע (ראה סעיף 2 "בדיקות ומעקב"). חשוב שבדיקות אלו יבוצעו בהתאם להנחיות הרופא.

יש לפנות לרופא מיד אם:

- אתה סובל מהסתמיינים הבאים המעידים על ליקוי בתפקוד הגוף: בחילות, הקאות, חום, כאבי בטן, צהבת העור או לבון העיניים), שタン כהה, גירוד בעור, עייפות (עייפות חריגת או תשישות), תסמנת דמוית שפעת (כאבי שרירים ומפרקים המלווים בחום).

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מזוד (עלולות להופיע ביותר מעתה אחד מ��ן עשרה):

- כאב ראש
- בזקמת (נפיחות הרגליים והקרסוליים או סימנים אחרים של אצירת נזלים)

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע בעד משתמש אחד מ��ן 10):

- הופעה סמוקה או אדיםומיות בעור
- תגבות של רגשות יתר (כולל דלקת בעור, גירוד ופריחה)
- מחלת החזר קיבתיושטי (ריפלוקס חומצי)
- שלשלולים
- התעלפות
- דפיקות לב (פעימות לב מהירות או לא סדירות)
- לחץ דם נמוך
- גודש באף

תופעות לוואי שאין שכיחות (עלולות להופיע בעד משתמש אחד מ��ן 100):

- טרומבוציטופניה (מספר נמוך של טסיות דם)
- נוירופניה/ליקופניה (מספר נמוך של תאי דם לבנים)
- ערכים גבוהים בתוצאות בדיקות להערכת תפקוד כבד עם דלקת כבד, כולל החרפיה אפשרית של דלקת כבד נסתרת או צבתת (הצבה של העור או לבן העיניים)

תופעות לוואי נדירות (עלולות להופיע בעד משתמש אחד מ��ן 1,000):

- הלם אנפילקטטי (>tagובה אלרגית כללית), אנגיאודמה (נפיחות בדרך כלל מסביב לעיניים, לשפטיים, לשון או לגרון)
- שחמת הכלב, אי ספיקת כבד (הפרעה חמורה בתפקוד כבד)

דוחות גם על ראייה מוטשטשת בשכיחות שאינה ידועה (לא ניתן להעיר את השכיחות מהנתונים הקיימים).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעلون זה או שימושים סימנים של תגובה אלרגית (כגון: נפיחות בפנים או בלשון, פריחה, גירוד) במהלך נטילת בוסנטן טבעי או אם תופעת לוואי כלשהי המצוינת לעיל מדאגה אותך, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן מתחת ל-25°C.**
- אין להשיליך תרופות לביב או לאשפפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעדרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Maize starch, sodium starch glycolate (type A), pregelatinized starch, glycerol dibehenate, povidone, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide, talc, triacetin, yellow iron oxide, red iron oxide, ethylcellulose, cetyl alcohol, sodium lauryl sulfate

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

גודל אריזה: 7, 14, 56, 60, 112 טבליות מצופות. יתכן ולא כל גגלי האריזה יהיו משוקקים.

בוסנטן טבע 62.5 מ"ג: טבליה מצופה בצבע ורוד-כתום עגולה קמורה משנה צידיה. בצדיה האחד מוטבע המספר "62.5".

בוסנטן טבע 125 מ"ג: טבליה מצופה בצבע ורוד-כתום אליפטית קמורה משנה צידיה. בצדיה האחד מוטבע המספר "125".

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו: טbau ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

בוסנטן טbau 62.5 מ"ג 00-34905-162

בוסנטן טbau 125 מ"ג 00-34906-162

העלון נערך ביוני 2024.

שם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.