

اسود الارضاء شکار و عیان

ريمسينا 100 ملغ داخل الوريد

**100 ملخ مسحوق لتحضير محلول مركز لمحلول للتسريب**  
المادة الفعالة وكيميتها: تحتوى كل قنينة صغيرة على 100 ملخ اينفلا

### Infliximab 100

**المواد غير الفعالة ومواد التحسسية في المستحضر: أنتظر الفقرة 2 بـ"معلومات هامة عن بعض منتجات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".**

**اقرئ النشرة تبعين حتى نهايتها قبل استعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.**

**وصف هذه الدواع لعلاج من يشكك بـ"تطبيقات الآخرين". فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.**

بالإضافة إلى النشرة، توفر المستحضر رسومياً 100 ملء داخل الوريد بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان التي يتوجب عليك مررتها قبل بدء الملاجع وخلال الملاجع - رسومياً 100 ملء داخل الوريد والتصريف وفقاً. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة المستفيضة بتفصيل قبل بدء استعمال المستحضر. يرجى حفظ البطاقة فرقها ثانية تبعنح أحد الأطباء.

**بالنسبة للكبار:** رسيمسا 100 ملليغرام يدخل الوريد عبارة عن مستحضر مشابه جوبياً. معلومات إضافية عن المستحضرات المشابهة جوبياً يجب التوجه إلى موقع وزارة الصحة:  
<https://www.gov.il/he/Departments/General/biosimilar>

يتم من قبل الطبيب المعالج. الاسم التجاري الذي يظهر على عبوة الدواء التي صرحت لك في الصيدلية. في أي حالة من الحالات، يجب التوجيه إلى الصيدلي أو إلى الطبيب المعالج.

**بالنسبة للأطفال:**

نلت انتباهات، بأنه من المهم في كل مرة تناول الدواء في الصيدلية، التأكيد على تلقى نفس الدواء الذي وصفه لك الطبيب المختص الذي يعالجك، إداً إذا الدواء الذي قفيته مختلفاً عن ذلك الذي تلقاه عادة أو أن عمليات الاستعمال تغيرت، توجه فوراً إلى الصيدلي للتأكد من تلقيف الدواء الصحيح، أي تبديل أو تغيير المقدار الدوائى للدواء الذي يحتوى على أيونغاكيسيماب (المادة الفعالة في الدواء) يجب أن يتم قبل تناول الدواء المخصص المعالج، الرجال تأكيد على أن الإمساخ التجارى المستحسن الذى وصفه لك الطبيب المختص فى الوصفة الطبية، مطابق لاسم الدواء الذى تلقيته من الصيدلى.

جواب سوالات (۱)

(التهاب المفاصل المزمن) (Rheumatoid arthritis)

**مرض ريمسيما** هو مرض داخل الرويد، يمتاز بتأثيره المبكر، مخصوص لخفض العلامات والأعراض التحفيزية للأداء الوظيفي البدني لدى مرضى كبار الديهم مرض نشط، والذين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لـDMARDs (Disease-modifying antirheumatic drug) بما في ذلك ميغافيريكاست. لدى مرضى كبار الديهم من مرض متقد، نشط وخطير، والذين لم ينجحوا في استفادة من ميغافيريكاست أو بواسطة توصير رنجن لدى هذه الفئة السكانية.

**مريض كرون لدى الكبار (Adult Crohn's disease):**

العلاج مرض كرون شفط بدرج حفظة متواضعة حتى شديدة، لدى مرضى كبار الذين لم يستجيبوا للعلاج كامل ومنع مستويات كوركتوكستيروديبيات وأدوية أخرى لجهات الاعراض، قد يتم شفط مريض كرون مع إدراجه انتقالاً غير اعتيادي بين مرضي كرون وبين مرضي ليبس بهما عادة ترابط (Fistulizing Crohn's disease)، لدى

مرضى كبار لم يستجيبوا للعلاج تقليدي كامل ومناسب (بما في ذلك مضادات حيوية، تصلب علاجات مثبتة لجهاز المناعة).

**ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد**  
إسم الدواء، شكله وعياره  
لعلاج مرض كرون شistent درجة شديدة لدى أطفال ومرأهقين بعمر 6-16 سنة الذين يستجيبوا للعلاج التقليدي الذي يشمل كورتيكosteroidات، معدلات مناعية، وعلاج غذائي أو لديهم عدم تحمل أو موافقة استطباب لهذه العلاجات.  
إنفانيلسيما بفارماب فحص فقط بمشاركة علاج تقليدي مثبت جهاز المناعة.

**النهاية القولون التقرحي (Ulcerative colitis):**  
لعلاج مرض نشط درجة متوسطة حتى شديدة لدى مرضى كبار يعانون من انتفاخ الماء الغازة وكثافتها: تحوّل كل كمية صغيرة على 100 مل إلى إينيليكسيماب.  
**إينيليكسيماب، 100 ملخ**

**Infliximab, 100 mg**  
المواد الفعالة ومولادات هامة عن  
بعض مركبات الدواء“ والقافة 6 ” [معلومات إضافية].  
اقر الشريحة بتعمق نهاتي قليل استعمال الدواء: تحتوي هذه النشرة على معلومات  
موجزة عن الدواء: إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

**النسبة للكبار:** مثبطة المفاصل المسكنة (NSAID) ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID).  
**النسبة للأطفال:** لاريفاريل (Loratadine)، موكافان (Moclobemide)، مونتيلوكسيميكين (Montelukast)، موكافان (Moclobemide)، مونتيلوكسيميكين (Montelukast).

رسيمينا 100 بلغ داخل الوريد عبارة عن مستحضر مشابه جوبياً لمعلومات إضافية عن المستحضرات الدوائية الشائعة جوبياً يجب التوجه إلى موقع وزارة الصحة:  
<https://www.gov.il/he/Departments/General/biosimilar>  
 تلفت إنها، صادقت وزارة الصحة على إجراء تبديل لمرة واحدة بين الدواء الأصلي وبين دواء مشابه جوبياً وبالعكس.  
 سبق في ذلك المقال، توضيحاً عن الداء والإلقاء التدايني، أُتي بالدواء بماء ملح، بعد أن:

يُعمل ريمسيما 100 ملг داخل الوريد بواسته إبرation لـ TNF- $\alpha$  وحب عمله. في TNF- $\alpha$  في مسارات التهابية في الجسم حيث أن حبه يؤدي إلى تقليل الإلتهاب في المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid arthritis) (الالتهاب المفاصل الروماتيزمي).

إن الالتهاب المفاصل الروماتيزمي عبارة عن مرض التهابي في المفاصل. إذا كنت تعاني من مفاصل روماتيزمي تتشكل سباحة ناجمة لأداة أخرى، إذا تم تعلم هذه الأدوية جيداً يشكل فستانتي ريمسيما 100 ملг داخل الوريد، مشاركة دواء إضافي يسمى ميلوتريكسات من الطبية، مطابق باسم الدواء الذي تلقنته مخالفة عن ذلك الذي تلقاه عادة أن تعيينات الاستعمال تغير، الوجه توجه فوراً الصيدلي للتأكد من تلقيك الدواء الصحيح. أي تبدل أو تغيير للمقدار الدوائي الدواء الذي يحتوي على إيفاكسيماب (المادة الفعالة في الدواء يجب أن يقتصر فقط على الطبيب المختص المعالج).

الوجه تأكيد من أن الاسم التجاري للمستحضر الذي وصفه لك الطبيب المختص في الوصفة.

**١) لأي غرض مخصص الدواء؟**

**التهاب المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid arthritis):**

رمسيما 100 ملء داخل الوريد، وبمشاركة ميشوتريكسات، مخصوص لخفيف العلامات والأعراض ولتحسين الأداء الوظيفي البدني لدى مرضى كبار لديهم مرض نشط، والذين لم يستجيبوا أولاً بยา وظيفي آخر، إذا لم تتمل هذه الأدوية جيداً بشكل كافٍ، فستنتهي ريمسيما 00 داخل الوريد من أجل:

- إن مرض كرون عبارة عن مرض إلتهابي في الأمعاء، إذا كنت تعاني من مرض كرون، سأولاً بยา وظيفي آخر، إذا لم تتمل هذه الأدوية جيداً بشكل كافٍ، فستنتهي ريمسيما 00
- علاج مرض كرون نشط.
- تقليل عدد التناوليات بين الأمعاء والجلد، التي تم علاج بنجاح بواسطة أدوية أخرى أو جراحة.

**مرض كرون لدى الكبار (Adult Crohn's disease):**

**الإسهاب المعنون المسرحي** (Ulcerative colitis) هو مرض يصيب المعدة والقولون، حيث تتشكل فيهما ثقبات متعددة من شأنها إتلاف جدار القولون، مما يؤدي إلى تسرب الماء والصyme إلى الأمعاء، مما يسبب انتفاخاً وآلاماً شديدة، وقد يهدى المريض إلى الوفاة بسبب نزيف داخلي.

- سوف يقظ الطبيب بفحص الرؤية فيما إذا وجّد ديدك سل. لقد دلّ عن حالات السل لدى متطلبات علاجها بـ إينفلوكسيماين، لا بل لدى مرضي قد علاجواهواياً ضد السل. بدءون الطبيب تناول الفحوص في بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج حول الـ **نحوذتك**.
  - إذا كان الطبيب يخشى من آنك معرض خطرة الإصابة بالسل، فمن الجائز أن تتم معالجتك بأدوية ضد السل قبل أن تبدأ استعمال ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد.
  - يبلغ الطبيب فوراً إذا ظهرت علامات السل خلال العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد. تلك العلامات تشمل علامات السل مثل العطش، إرهاق، سفوفة، تعرق، إلخ.
  - **فيروس إيرقان الفيروسي** من نوع B (التهاب الكبد B)
    - قبل بدء العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد، إجل للطبيب إذا كنت حاملة لالتهاب الكبد B أو كنت كذلك في المرض.
    - إجل للطبيب إذا كنت ظن بأنك قد تكون معرضًا خطورة الدعوى ببركان فيرسوني من نوع B.
    - من المفترض أن يقيم الطبيب بفحص تواجد البركان الفيروسي من نوع B لديك.
    - إن العلاج بـ جاهجات TNF مثل ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد قد يسبب نقاشي من جديد البركان الفيروسي من نوع B من جديد لدى متعالجين حاملين لهذا الفيروس، وقد يشكل خطراً على الحياة في حالات معينة.
  - **مشكل قلبية**
    - إجل للطبيب إذا كنت تعاني من آية مشاكل قلبية، مثل قصور قلبي بسيط.
    - **سوف يرغب الطبيب بمراقبة وظائف قلب بحرص.**
    - يبلغ الطبيب فوراً إذا كنت تقاسي من أمراض جدية أو تفاقم أمراض حالية مثل ضيق النفس أو إنفاس الرجال.
  - قبل بدء العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد، إجل للطبيب إذا كنت مريضاً أو إذا مررت ذات مرة بـ **ليمفوما** (نوع سرطان دم) أو بأي نوع آخر للسرطان.
  - **المتعالجون الذين يعانون من التهاب مفاصل روماتيقي شديد، وبعانون من المرض لفترة زمنية طويلة.** قد يكونوا معرضين خطورة أكبر لتطور لميغفما.
  - إن الأطفال والكبار المتعالجون بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد قد يكونوا معرضين خطورة أكبر لتطور لميغفما أو سرطان من نوع آخر.
  - بعض المرضى الذين يتلقون إينفلوكسيماين مشاكل خطيرة في الكبد. إجل للطبيب فوراً إذا لاحظت أعراضًا مشاكلي في الكبد خلال العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد. أعراض التي تشمل إصغار الجلد والعينين، بول بلوبي باهك، آلام أو إنفاس في الجانبيين العلواني من البطن، الام في المفاصل، طفح جلدي أو سخونة.
  - **تعداد منخذي الدم**
    - من الجائز أن يتغير الجسم ما يكفي من خلايا الدم التي تساعد على محاربة التلوثات أو التي تساعد في وقف النزف، وذلك لدى مرضي معينين يتلقون إينفلوكسيماين.
    - إجل للطبيب فوراً إذا وجدت لديك أعراضًا إضافية تعدد المنخذيات مثل خلل العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد. حالات التي تشمل سخونة غير عابرة، نزف، ميل حدوث كدمات بسهولة بالغة، بقع صغيرة حمراء أو بنسخجية ناجمة عن نزف تحت الجلد أو مظهر شاحب.
    - **اضطراب في الجهاز المناعي**
      - طور بعض المرضى الذين يتلقون بـ إينفلوكسيماين أعراضًا لإضطراب في الجهاز المناعي المحسنة الذئبة.
      - إجل للطبيب فوراً إذا تطورت لديك أعراض الذئبة خلال فترة العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد. حالات التي تشمل آلم في المفصل أو طفح حساس على الشمس على الخدين أو الذراعين.
    - **الأطفال وال kad و المراهقون**
      - المعلومات أعلاه تخص أيضًا الأطفال والمراهقين. إضافة لذلك:
      - لقد تطور سرطان لدى بعض الأطفال والراهقين المتعالجين الذين تلقوا حاهجات TNF مثل إينفلوكسيماين، بما في ذلك أنواع شاذة، والتي أنت إلى الوفاة في بعض الأحيان.
      - مقارنة بالكبار، تطورت تلوثات أكثر لدى الأطفال المتعالجين بـ إينفلوكسيماين.
      - يجب إعطاء الأطفال الحالات عقارات معينة خلال فترة العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد.
      - بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تلقى لقاح في خلال فترة العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد، لكن لا يمكنهم تلقى لقاح في خلال فترة العلاج.
      - إذا لم يكن قادرًا على ذلك، أو أكثر مما وصف سابقًا ينطبق عليك، تحدث مع الطبيب قبل استعمال ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد.
    - إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأساقفات غذائية، إجل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالخصوص إذا كنت تستعمل: المرضي بأعراض التهابية التي تتناولون الآن أدوية لعلاج مشاكلهم، قد تسبب هذه الأدوية تطوير أعراض جانبية. سوّي قد يتم طلبك استشارة حول أي من الأدوية الأخرى عليك مواصلة استعمالها خلال فترة العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد.
  - **التدابير**
    - إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأساقفات غذائية، إجل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالخصوص إذا كنت تستعمل: المرضي بأعراض التهابية التي تتناولون الآن أدوية لعلاج مشاكلهم، قد تسبب هذه الأدوية تطوير أعراض جانبية. سوّي قد يتم طلبك استشارة حول أي من الأدوية الأخرى عليك مواصلة استعمالها خلال فترة العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد.

أدوية أخرى التي تستعملها أو استعملتها مؤخرًا لعلاج مرض كرون (Crohn's disease) والتهاب القولون التقرحي (Ulcerative colitis)، التهاب المفاصل الروماتيقي (arthritis)، التهاب الفقار المقسط (Ankylosing spondylitis)، أو المصفية (Psoriasis)، أو أدوية التي تعطى بدون وصفة طبية مثل فياتيريات وبنباتات.

إحلك للطبيب بالأخص إذا كنت تستعمل إحدى الأدوية التالية:

أدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي.

كينيريت (اتانفينا)، لا يجوز استعمال ريمسيما 100 ملء داخل الوريد مع كينيريت.

ريمسينا 100 ملء داخل الوريد سوية مع أوينسيما.

ريمسينا 100 ملء داخل الوريد خلال فترة الحمل، بلغي طبيب الرضيع أو أفراد آخرين من الطاقم الطبي الذين يعالجون رضيعك بإنك استعملت ريمسيما 100 ملء داخل الوريد وذلك قبل أن ينصح الطبيب بأي لقاح.

إذا لم تكن واثقًا فيما إذا كان ينطبق عليك ما دون أعلاه، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال ريمسيما 100 ملء داخل الوريد.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة

يجوز استشارة الطبيب قبل استعمال ريمسيما 100 ملء داخل الوريد، إلا إذا كانت حاملًا، مرضعة.

ظظيني بإنك حامل أو تحظى بخطفه للحمل، إلا إذا استعملت ريمسيما 100 ملء داخل الوريد.

أكبر من اللازم من الدواء، لا تؤخر أعراض جانبية معروفة المرتبطة بإعطاء مقدار دوائي أكبر من اللازم من الماء، لا يجوز ريمسيما 100 ملء داخل الوريد.

إذا تلقيت مقدارًا أو أعلى من اللازم من ريمسيما 100 ملء داخل الوريد:

بالإمكان اعطاء ريمسيما 100 ملء داخل الوريد بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالة المرض.

إحلك للطبيب فقط على الأطفال أن تتغير على الجسم، إن دروع المعلم الجلدية هذه قد تتراافق بسخونة.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب.

يجب المواظة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز البالغ.

لا يجوز البالغ.

علامات لمشاكل خطيرة في الجلد؛ مثل بقع حمراء شديدة بالهالوف أو بقع دائمة في كثير من الأحيان مع حويصلات في وسپها، في القسم العلوي من الجسم، مناطق واسعة لتقعر الجلد، تقرحات في القم في الجنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية وفي العينين أو نتوءات صغيرة مليئة بالغص التي يمكن أن تنتشر على الجسم. إن دروع المعلم الجلدية هذه قد تتراافق على شكل أفات بفتحية مثل البيبيبيا أو ثلوث فطري في الأظافر.

إحلك للطبيب قواً إذا لاحظت إحدى الأعراض المفصلة أعلاه.

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل التنسن (التهاب الجبنة)

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (common) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 100:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 10,000:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 1,000:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (exceptional) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 100:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (extremely rare) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 10:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (extremely uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 1:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (extremely exceptional) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 1:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (exceptionally rare) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 1:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (exceptionally uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 1:

الاعتراض الجانبي الشائعة جداً (exceptionally exceptional) - أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 1:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.