

ويلبوترين XR 150 ملغ أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:

بوپروبيون هيدروكلوريد (bupropion hydrochloride) 150 ملغ

ويلبوترين XR 300 ملغ أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:

بوپروبيون هيدروكلوريد (bupropion hydrochloride) 300 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر، انظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

ويلبوترين XR هو دواء مخصص لعلاج نوبات الاكتئاب الكبير. بعد استجابة مُرضية، يكون استمرار العلاج باستعمال ويلبوترين XR ناجحاً في منع الانتكاس.
الفصيلة العلاجية:
مضادات الاكتئاب الأخرى (other antidepressants).

هو يعتبر مستجيباً لمركبات كيميائية في الدماغ تسمى نورأدرينالين ودوبامين.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لبوپروبيون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على بوپروبيون
- تم تشخيصك على أنك تعاني من الصرع أو لديك سابقة لإختلاجات
- يوجد لديك أو كان لديك اضطراب في الأكل (مثلاً، الشره (bulimia) أو القهم العصبي (anorexia nervosa))
- كان لديك ورم في الدماغ
- كنت تشرب عادة المشروبات الروحية بشكل مفرط وقد توقفت للتو أو أنك على وشك التوقف عن شربها
- كانت لديك مشاكل كبدية خطيرة
- كنت قد توقفت مؤخراً عن تناول أدوية مهدئة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها في الوقت الذي تتناول ويلبوترين XR
- كنت تتناول أو قد تناولت أدوية أخرى للإكتئاب أو لداء الباركينسون تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة.

إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث فوراً مع الطبيب، بدون تناول ويلبوترين XR.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب قبل استعمال ويلبوترين XR.

متلازمة بروغادا

إذا كانت لديك حالة تسمى متلازمة بروغادا (متلازمة وراثية نادرة تؤثر على نظم القلب) أو إذا حدثت سكتة قلبية أو موت مفاجئ في عائلتك.

الأطفال والمراهقون

ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة. هناك خطورة زائدة لسلوكيات وأفكار إنتحارية عندما يُعالج الأطفال دون عمر 18 سنة بمضادات الإكتئاب.

الكبار

يجب أن يعرف الطبيب قبل أن تتناول ويلبوترين XR إذا:

- كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم
 - كان لديك سكري الذي لأجله تستعمل إنسولين أو أقراص
 - كان لديك إصابة خطيرة في الرأس أو سابقة لرضة في الرأس
- تبين أن ويلبوترين XR يسبب نوبات (إختلاجات) لدى ما يقارب 1 من بين 1,000 شخص. يرجى أكثر أن يحدث هذا العرض الجانبي لدى أشخاص من المجموعات المذكورة أعلاه. إذا كان لديك نوبة صرع خلال العلاج فعليك التوقف عن تناول ويلبوترين XR. لا تستمر في العلاج وتوجه إلى الطبيب
- كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب (تغيرات قصوى في المزاج)، لأن ويلبوترين XR قد يؤدي إلى عوارض لهذا المرض
 - كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب، فإن إستعمال هذه الأدوية سوية مع ويلبوترين XR يمكن أن يؤدي لمتلازمة السيروتونين، حالة بإمكانها أن تشكل خطراً على الحياة (أنظر " تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في هذه الفقرة)
 - كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى، قد يكون لديك إحتمال أكبر للمعاناة من أعراض جانبية.
- إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث ثانية مع الطبيب قبل تناول ويلبوترين XR. قد يرغب بأن يكرس إهتماماً خاصاً لعلاجك، أو أن يوصي بعلاج آخر.

أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب

إذا كنت مكتئباً، فقد تراودك أحياناً أفكار بايذاء النفس أو الإنتحار. قد تزداد هذه الأفكار عند البدء في تناول مضادات الإكتئاب لأول مرة، حيث تستغرق هذه الأدوية وقتاً كي تبدأ بالتأثير، على الأغلب نحو أسبوعين، بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان. هناك إحتمالية أكبر بأن تعاني من هذا إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكار إنتحارية أو لإلحاق الأذى بنفسك.
- كنت شاباً يافعاً. أظهرت المعلومات من التجارب السريرية وجود خطورة زائدة لسلوك إنتحاري لدى كبار دون عمر 25 سنة الذين يعانون من حالات نفسية والذين عولجوا بمضاد للإكتئاب.

إذا كانت لديك أفكارا بايذاء النفس أو الإنتحار في أي وقت كان، إتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى فوراً. قد تجد أنه من المفيد أن تحكي لأحد أقربائك أو لصديق قريب بأنك تعاني من الإكتئاب، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يبلغوك إذا كانوا يعتقدون أن الإكتئاب لديك يتفاقم، أو إذا كانوا قلقين بخصوص تغيرات في سلوكك.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت أدوية أخرى للإكتئاب أو لمرض پاركينسون التي تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة، إحك للطبيب بدون تناول ويلبوترين XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2).

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يغير جرعة الـ ويلبوترين XR، أو يقترح تغيير بأدوية الأخرى.

لا تندمج أدوية معينة مع ويلبوترين XR. قد يزيد بعضها من إحتمال حدوث نوبات أو إختلاجات. قد تزيد أدوية أخرى من خطورة حدوث أعراض جانبية أخرى. فيما يلي تفصيل لبعض الأمثلة، لكن هذه ليست قائمة كاملة.

قد يكون هناك إحتمال أكبر من المعتاد لحدوث إختلاجات إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب أو لأمراض نفسية أخرى
- كنت تتناول تينوفيلين للربو أو لمرض رئوي
- كنت تتناول ترامادول، مسكن قوي للألام
- تناولت أدوية مهدنة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها بينما ما زلت تتناول ويلبوترين XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2)
- كنت تتناول أدوية ضد الملاريا (مثل ميفلوكوين أو كلوروكوين)
- كنت تتناول منشطات أو أدوية أخرى للسيطرة على الوزن أو الشهية للطعام
- كنت تتناول ستيرونيدات (عن طريق الفم أو بالحقن)

- كنت تتناول مضادات حيوية تسمى كوينولونات
 - كنت تتناول أنواع معينة من مضادات الهيستامين التي قد تسبب الميل إلى النوم
 - كنت تتناول أدوية للسكري.
- إذا إنطبقت عليك هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فوراً، قبل تناول ويلبوترين XR. يدرس الطبيب الفوائد والمخاطر من أجلك عند تناول ويلبوترين XR.

- قد يكون هناك احتمال أكبر من المعتاد لحدوث أعراض جانبية أخرى إذا:
- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب (مثل أميتريبتيلين، فلوأوكسيتين، پاروكسيتين، سيتالوبرام، إسيتالوبرام، فينلافاكسين، دوسوليبين، ديسبيرامين أو إيميبرامين) أو لأمراض نفسية أخرى (مثل كلوزابين، ريسبيريدون، تيوريدازين أو أولانزابين).
 - من شأن ويلبوترين XR أن يتفاعل مع أدوية معينة تُستعمل لعلاج الإكتئاب وقد تقاسي من تغييرات في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38°C، إرتفاع نظم القلب، عدم إستقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال).
 - كنت تتناول أدوية لداء الباركنسون (ليفودوبا، أماتادين أو أورفينادين)
 - كنت تتناول أدوية تؤثر على قدرة جسمك على تفكيك ويلبوترين XR (كاربامازيبين، فينيتوئين، فالبروات)
 - كنت تتناول أدوية معينة تستعمل لعلاج السرطان (مثل سيكلوفوسفاميد، إيفوسفاميد)
 - كنت تتناول كلويدوجريل الذي يستعمل بشكل خاص لمنع حدوث سكتة
 - كنت تتناول حاجيات بيتا معينة (مثل ميتوبرولول)
 - كنت تتناول أدوية معينة لعدم إنتظام نظم القلب (بروفينون أو فليكاينيد)
 - كنت تستعمل لصقات نيكوتين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.
- إذا إنطبقت عليك هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فوراً، قبل تناول ويلبوترين XR.

- قد يكون ويلبوترين XR أقل نجاعة
- إذا كنت تتناول ريتونافير أو إيفافيرينز، أدوية لعلاج تلوث HIV.
- إذا إنطبق هذا عليك، إحك للطبيب. سوف يفحص الطبيب مدى نجاعة ويلبوترين XR بالنسبة لك. قد يكون من الضروري رفع جرعتك الدوائية أو تغيير علاج الإكتئاب لديك إلى علاج آخر. لا ترفع جرعة ويلبوترين XR خاصتك بدون إستشارة الطبيب، حيث إن هذا الأمر قد يزيد من خطورة حصول أعراض جانبية لديك، يشمل إختلاجات.

- قد يقلل ويلبوترين XR من نجاعة أدوية أخرى
- إذا كنت تتناول تاموكسيفن الذي يستعمل لعلاج سرطان الثدي.
- إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد تكون هناك حاجة لتغيير العلاج بعلاج آخر للإكتئاب لديك.
- إذا كنت تتناول ديجوكسين لعلاج القلب.
- إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد يدرس الطبيب ملاءمة المقدار الدوائي لديجوكسين.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول

يمكن للكحول أن يؤثر على طريقة عمل ويلبوترين XR وعندما يؤخذان سوياً، يمكنهما في حالات نادرة، أن يؤثر على أعصابك أو على حالتك النفسية. بعض الأشخاص يجدون أنهم أكثر حساسية للكحول عندما يتناولون ويلبوترين XR. قد يوصيك الطبيب بعدم شرب الكحول (بيرة، نبيذ أو مشروبات روحية) عندما تتناول ويلبوترين XR، أو أن تحاول أن تقلل جداً من الشرب. لكن إذا كنت معتاداً على شرب كميات كبيرة من الكحول في الوقت الحالي، فلا تتوقف بشكل مفاجئ: فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بنوبات صرع.

تحدث مع الطبيب بخصوص شرب الكحول قبل أن تبدأ بتناول ويلبوترين XR.

التأثير على فحوص البول

قد يشوش ويلبوترين XR على فحوص بول معينة لتشخيص أدوية أخرى. إذا توجب عليك الخضوع لفحص بول، إحك للطبيب أو المستشفى بأنك تتناول ويلبوترين XR.

الحمل والإرضاع

لا تتناولي ويلبوترين XR إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. بعض الأبحاث، لكن ليس جميعها، أشارت إلى إرتفاع خطورة حدوث تشوهات خلقية، خاصة تشوهات قلبية، لدى رُضع تناولت أمهاتهم ويلبوترين XR. من غير المعروف فيما إذا

كان ذلك في أعقاب إستعمال ويلبوترين XR. يمكن لمركبات ويلبوترين XR أن تنتقل إلى حليب الأم. إستشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ويلبوترين XR.

السياقة وإستعمال الماكينات
إذا كان ويلبوترين XR يسبب لك الدوار أو الشعور بأنك توشك على الإغماء، لا تقد أو تشغل أية أدوات أو ماكينات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

قد يستغرق فترة من الزمن حتى تبدأ الشعور بتحسن. يستغرق فترة من الزمن حتى يتم الحصول على تأثير كامل للدواء، في بعض الأحيان أسابيع أو أشهر. عندما يبدأ شعورك بالتحسن، قد يوصيك الطبيب بالإستمرار بتناول ويلبوترين XR لمنع عودة الإكتئاب.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
الجرعة الدوائية الإعتيادية للكبار فقط هي قرص واحد من عيار 150 ملغ مرة في اليوم.
قد يزيد الطبيب جرعتك الدوائية إلى 300 ملغ مرة في اليوم إذا لم يتحسن الإكتئاب لديك بعد عدة أسابيع.
خذ جرعة أقراص ويلبوترين XR خاصتك في الصباح. لا يجوز تناول ويلبوترين XR أكثر من مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

القرص مطلي بقشرة التي تحرر الدواء ببطء داخل جسمك. قد تلاحظ شيئاً في البراز لديك يبدو مثل قرص. إنها القشرة الفارغة التي تخرج من جسمك.

إبلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز مضغها، سحقها أو شطرها - إذا قمت بذلك، هناك خطورة بأن تأخذ مقدار دوائي مفرط، حيث أن الدواء سيتحرر إلى داخل جسمك بشكل أسرع. سوف يزيد ذلك من إمكانية حدوث أعراض جانبية لديك، يشمل نوبات (إختلاجات).

بعض الأشخاص يستمرون بتناول قرص واحد من عيار 150 ملغ في كل يوم خلال كامل فترة علاجهم. قد يصف لك الطبيب ذلك إذا كانت لديك مشاكل كبدية أو كلوية.

مدة العلاج

فقط أنت والطبيب يمكنكما أن تقررا كم من الوقت عليك تناول ويلبوترين XR. قد يستغرق أسابيع أو أشهر من العلاج حتى تلاحظ تحسن أياً كان. تحدث عن أعراضك مع الطبيب بشكل دائم ليتم التقرير كم من الوقت عليك تناوله. عندما تبدأ بالشعور بتحسن، قد يوصيك الطبيب بالإستمرار بتناول ويلبوترين XR لمنع عودة الإكتئاب.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر
إذا كنت تتناول أقراصاً أكثر من اللازم، قد تزيد من خطورة حدوث نوبات أو إختلاجات.
لا تتأخر. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، انتظر وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد.
لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول ويلبوترين XR أو تقليل الجرعة الدوائية بدون إستشارة الطبيب أولاً، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة لذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال

تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل وفي نفس الوقت التدوير لليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة).
تعليمات الإغلاق: يجب وضع الغطاء على الطرف المفتوح للقنينة والتدوير باتجاه اليمين (في اتجاه عقارب الساعة) حتى يُغلق تماماً.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ولبوتريين XR قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة

نوبات أو إختلاجات

نحو 1 من كل 1,000 شخص الذين يتناولون ولبوتريين XR معرض لخطورة حدوث نوبة (إختلاج أو تشننج). يزيد احتمال حدوث ذلك إذا كنت تتناول ولبوتريين XR أكثر من اللازم، إذا كنت تتناول أدوية معينة، أو إذا كنت معرضاً لخطورة أعلى من المعتاد لحدوث نوبات. إذا كنت قلقاً، تحدث مع الطبيب.
إذا اختبرت نوبة، إحك للطبيب بعد أن تتعافى. لا تتناول أقراصاً إضافية.

ردود فعل تحسسية

قد يطور بعض الأشخاص ردود فعل تحسسية تجاه ولبوتريين XR. تشمل هذه:

- جلد أحمر أو طفح (يشبه الشرى)، حويصلات أو درنات حاكة (شرى) على الجلد. إن بعض أنواع الطفح الجلدي هذه قد توجب علاجاً في المستشفى، خاصة إذا كنت تعاني أيضاً من آلام في الفم أو في العينين.
- صفير غير إعتيادي بالتنفس أو صعوبات في التنفس
- إنتفاخ في الجفنين، الشفتين أو اللسان
- آلام في العضلات أو المفاصل
- إنهيار أو فقدان الوعي.

إذا كانت لديك أية علامات لرد فعل تحسسي إتصل بالطبيب حالاً. لا تتناول أقراصاً إضافية.
قد تستمر ردود الفعل التحسسية لفترة طويلة. إذا وصف لك الطبيب شيئاً ليساعدك بخصوص أعراض الحساسية، تأكد من تناول العلاج حتى نهايته.

طفح جلدي لـ لوپوس (ذئبة) أو تفاقم في أعراض الـ لوپوس

شيوخ غير معروف - لا يمكن تقييم الشيوخ من المعطيات المتوفرة لدى أشخاص يتناولون ولبوتريين XR.
يعتبر الـ لوپوس إضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤثر على الجلد وأعضاء أخرى.
← إذا قاسيت من إحتدات لـ لوپوس، طفح جلدي أو آفات (خاصة في المناطق المعرضة للشمس) خلال تناول ولبوتريين XR، إتصل بالطبيب فوراً، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن العلاج.

بثار طفحي معمم حاد (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis -AGEP)

شيوخ غير معروف - لا يمكن تقدير الشيوخ من المعلومات المتوفرة لدى الأشخاص الذين يتناولون ولبوتريين XR.
تشمل أعراض AGEP طفح مع بثور/حويصلات مليئة بالقبح.
← إذا كان لديك طفح مع بثور/حويصلات مليئة بالقبح، اتصل بالطبيب على الفور، لأنه قد تكون هناك حاجة للتوقف عن العلاج.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- صعوبات في النوم. تأكد من تناولك ولبوتريين XR في الصباح
- صداع
- جفاف في الفم
- شعور بغثيان، تقيؤ.

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى **1 من كل 10** أشخاص:

- سخونة، دوار، حكة، تعرق وطفح جلدي (في بعض الأحيان بسبب رد فعل تحسسي)
- رجفان، ضعف، إرهاق، آلام في الصدر
- شعور بالقلق أو العصبية
- ألم البطن أو اضطرابات أخرى في الجهاز الهضمي (إمساك)، تغيرات في مذاق الطعام، فقدان الشهية للطعام (anorexia)
- ارتفاع ضغط الدم يكون خطيراً أحياناً، تورد
- طنين في الأذنين، اضطرابات في الرؤية.

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى **1 من كل 100** شخص:

- شعور بالإكتئاب (أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"، تحت "أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب")
- شعور بإرتباك
- صعوبة في التركيز
- نظم قلب متسارع
- إنخفاض في الوزن.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى **1 من كل 1,000** شخص:

- إختلاجات.

أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر هذه لدى **1 من كل 10,000** شخص:

- خفقان القلب، إغماء
- تشنجات، تصلب العضلات، حركات خارجة عن السيطرة، مشاكل في المشي أو في التناسق
- شعور بقلّة الراحة، عدم الهدوء، عدائية، عدوانية، أحلام غريبة، شعور بالوخز أو قلة الإحساس، فقدان الذاكرة
- إصفرار الجلد أو بياض عينيك (يرقان) الذي قد يحدث بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد، إلتهاب الكبد (hepatitis)
- ردود فعل تحسسية شديدة؛ طفح سوية مع آلام في المفاصل والعضلات
- تغيرات في نسب السكر في الدم
- تبول زائد أو أقل من المعتاد
- عدم السيطرة على التبول (تبول لا إرادي، تسرّب بول)
- طفح شديد في الجلد قد يظهر في الفم وفي أجزاء أخرى من الجسم وقد يشكل خطراً على الحياة
- تفاقم الصدفية (يقع ثخينة من جلد أحمر)
- تساقط الشعر غير المألوف أو ترققه (الصلع)
- شعور بالإنفصال عن الواقع أو شعور غريب (تبدد الشخصية)؛ رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة)؛ الشعور أو الإعتقاد بأشياء غير صحيحة (أوهام)؛ الشك بشكل شديد (ذهان خيالي).

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف

ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص لكن شيوعتها الدقيق غير معروف:

- أفكار عن إلحاق الأذى بالنفس أو أفكار إنتحارية خلال تناول ولبوترين XR أو مباشرة بعد التوقف عن العلاج (أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء"). إذا كان لديك مثل هذه الأفكار، إتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى بشكل فوري
- فقدان العلاقة بالواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم على الأمور بذهن صافي (ذهان)، أعراض أخرى يمكن أن تشمل هلوسة و/أو أوهام
- شعور مفاجئ بالخوف الشديد (نوبة هلع)
- تأتأة
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia) وإنخفاض في عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia)
- إنخفاض بنسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia)
- تغيير في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38°C، ارتفاع نظم القلب، عدم إستقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلاً

غثيان، تقيؤ، إسهال)، أثناء تناول ويلبوترين XR سوية مع أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل پاروكسيتين، سيتالوبرام، إسيالوبرام، فلوأوكسيتين وفينلافكسين).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25°C. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة والضوء.
- للإستعمال خلال 30 يوماً من الفتح.
- تحتوي القنينة على وعاء صغير محكم الإغلاق يحتوي على فحم وجل سيليكات للحفاظ على الأقراص جافة. إترك الوعاء في القنينة. لا تبلعه.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:
يحتوي القرص على:

Polyvinyl alcohol, glycerol dibehenate.

يحتوي طلاء القرص على:

Ethylcellulose, povidone K-90, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer dispersion
(Eudragit L30 D-55), macrogol 1450, silicon dioxide, triethyl citrate.

حبر للطباعة:

Shellac glaze, iron oxide black (E172), ammonium hydroxide.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقرص ويلبوترين XR 150 ملغ هي أقراص مدوّرة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS 5FV 150" بحبر أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقناني بولي إيثيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.

أقرص ويلبوترين XR 300 ملغ هي أقراص مدوّرة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS 5YZ 300" بحبر أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقناني بولي إيثيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.
من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

- صاحب الإمتياز: جلاكسوسميثكلان (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: بوش هيلث كومپانيس. INC، مانيتوبا، كندا.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
ويلبوترين XR 150 ملغ: 140-05-31653
ويلبوترين XR 300 ملغ: 140-06-31654
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في أيار 2024.
العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
© 2024 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Wel PT v17A