

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג**

#### **תמישה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש**

כל עט מזרק מוכן לשימוש של 1 מ"ל מכיל 200 מ"ג בלימומאב (belimumab 200 mg).

רשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה זו נרשמה בעברך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג מיועדת כתוספת טיפול במוטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) אדמנטיית מערכתית (SLE) פעילה, חיובית לנוגדים אוטואימוניים, עם רמת פעילות גבוהה של המחלת (למשל נוכחות נוגדים נגד DN'A דו גדיי (dsDNA) ורמת משלים נמוכה ( low complement)), למטרת הטיפול הרגיל.

בנלייטה מיועדת לטיפול במוטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) נפריטיס פעילה בשילוב עם טיפולים מדכאי מערכת חיסון.

קבוצה תרפואיית: מדכאי חיסון סלקטיבי.  
זאבת היאמחלה שבה מערכת החיסון (המערכת שנלחמת בזיהום) תוקפת את התאים והרקמות שלך, וגורמת לדלקת ולפגיעה באיברים. המחלת יכולה לפגוע כמעט בכל איבר בגוף וחוشبיהם שהיא קשורה לסוג של תא דם לבנים, הנקראים תא B.

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג מכילה בלימומאב (נוגדן מונוקולנاري אנושי). היא מפחיתה את מספר תא B בכך באמצעות חסימת הפעולות של BLyS, חלבון העוזר לתאי B להיות זמן רב יותר ונמצא ברמות גבוהות באנשים עם זאבת.  
אתה תקבל בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג בנוסף לטיפול הרגיל שלך לザבת.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לבלימומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).

**← ספר לרופא** אם אתה חושב שאחד מלאה חל עלייך.

**ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימורם בתרופה  
לפני הטיפול בבניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, ספר לרופא אם:**

- יש לך כרגע זיהום או אם יש לך זיהום מתמשך או אם אתה סובל מזיהומים לעתים קרובות. הרופא יחולט אם אפשר לחתך לך בניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג.
  - אתה מתכוון להתחסן או שהתחסנת ב- 30 הימים האחרונים. ישנים חיסונים שאין לחת אוטם בסמור או במהלך הטיפול בבניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג.
  - הזאתה משפיעה על מערכת העצבים שלך.
  - אתה נשא של HIV (נגיף הכשל החיסוני האנושי) או אם יש לך רמות נמוכות של אימונוגLOBולינים.
  - יש לך או הייתה לך דלקתCBD נגיפית מסוג B או C.
  - עברת השתלת איברים או מה עצם או תאגיד.
  - היה לך סרטן.
- ← ספר לרופא אם ייתכן שאחד מלאה חל עלייך.

**דיכאון והתאבדות**  
קייםים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדן, וניסיונות התאבדות לרבות התאבדות במהלך הטיפול עם בניליסטה. ספר לרופא אם יש לך היסטוריה של מצבים אלה. אם אתה חש בתסמינים חדשים או החמרה בתסמינים בכל זמן שהוא:  
← פנה לרופא או גש מיד לבית החולים.

אם אתה מודока או שיש לך מחשבות לפגוע בעצמך או להתאבד, ייתכן שתמצא שזה מועיל לספר לקרוב משפחה או חבר קרוב ולבקש מהם לקרוא עליו זה. תוכל לבקש מהם לומר לך אם הם מודאגים לגבי שינויים במצב הרוח או בהתנהגות שלך.

**שים לב לתסמינים חשובים**

מטופלים הנוטלים תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלהם עלולים להיות בסיכון מוגבר להידבק בזיהומיים, כולל בזיהום מוחי נדרי אך חמורי לויקואנטפלופתיה ובסיכון מוקדית מתקדמת.

(PML - Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

← מידע נוספת על "סיכון מוגבר לziehom מוחי" בסעיף 4 בעлон זה.

**ילדים ומתבגרים**

אל תיתן בניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18.

**איןטראקטיות/תגובה בין תרופתיות**

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח תרופות המשפיעות על מערכת החיסון, כולל כל תרופה המשפיעה על תאגיד B (משמשת לטיפול הסרטן או במחלות דלקתיות).

← השימוש בתרופות כאלה בשילוב עם בניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עלול לגרום למערכת החיסון להיות פחות יעילה. הדבר עלול להעלות את הסיכון שלך להידבק בזיהום חמורי.

היריון והנקה

אמצעי מניעה בנשים בגיל הפוריות

השתמשי באמצעי מנעה ייעיל במהלך הטיפול בבניליטה תת-עורית 200 מ"ג ובמהלך 4 חודשים לפחות לאחר המנה האחרונה.

היריון

בדרך כלל, בניליטה תת-עורית 200 מ"ג אינה מומלצת אם את בהיריון.

• **ספרי לרופא אם את בהיריון,** אם את חושבת שעת בהיריון או אם את מתכוננת להרות.

הרופא יחולט אם את יכולה להשתמש בבניליטה תת-עורית 200 מ"ג.

• **אם נכנסת להיריון בזמן שתת מטופלת בניליטה תת-עורית 200 מ"ג,** ספרי על כך לרופא.

הנקה

ספרי לרופא אם את מניקה. סביר להניח שבניליטה תת-עורית 200 מ"ג יכולה לעבור לחלב האם. הרופא ישוחח איתך האם עלייך להפסיק את הטיפול בבניליטה תת-עורית 200 מ"ג בזמן שתת מניקה או האם עלייך להפסיק להניק.

נהיגה ושימוש במכונות

בניליטה תת-עורית 200 מ"ג יכולה לגרום לתופעות לוואי העולות לפגוע ביכולתך לנוהג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

מידע חשוב על תכונות בניליטה:

בניליטה תת-עורית 200 מ"ג מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, לכן התרופה נחשבת נטולת נתרן.

### 3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתחום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתחום.

בניליטה תת-עורית 200 מ"ג ניתנת בזריקה מתחת לעור באותו היום בכל שבוע.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

יאבת (לופוס) אדמנתיית מערכית (SLE)

המינון המקובל בדרך כלל הוא: 200 מ"ג (תcolaה מלאה של עט אחד) פעם בשבוע.

יאבת (לופוס) נפריטים

המינון המקובל עשוי להשתנות. הרופא יקבע את המינון הנכון בשביילר, שהוא:

• **מנה של 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.**

או

• **מנה של 400 מ"ג (תוכן מלא של שני עטים בפעם אחת) פעם בשבוע לפחות 4 שבועות.**

בmarsh, המינון המומלץ הוא 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.

**אם אתה מעוניין לשנות את יום הזרקה:**  
הזרק מנה ביום החדש (אפילו אם עבר פחות משבוע מהמנה האחרונה שלך). מאותו יום המשך עם לוח הזמנים השבועי החדש.

#### **הזרקת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג:**

האחות או הרופא יראו לך או למי שמטפל לך כיצד להזריק בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג. הזריקה הראשונה עם עט המזרק המוכן לשימוש של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג תהיה תחת השגחה של האחות או הרופא. לאחר שידריכו אותך כיצד להשתמש בעט, האחות או הרופא יכולים להחליט שאתה יכול להזריק לעצמך או שהמטפל שלך יוכל להזריק לך. האחות או הרופא גם יניחו אותך לאילו סימנים ותסמנים יש לשיטם לב כאשר משתמשים בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, מכיוון שיכולה להוביל לתגובה אלרגית חמורת (ראה בסעיף 4 "תגובהות אלרגיות").

יש להזריק בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג מתחת לעור באזורי הבطن או באזורי הירך. בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג היא זריקת תת-עורית ואסור להזריק אותה לתוך הוריד (V.I.). הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש נמצאות בסוף העלון זהה.

**אין לעبور על המנה המומלצת.**

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עליך לפנות מיד לרופא או לאחות שישגיחו عليك במקרה שתפתח סימנים או תסמנים של תופעות לוואי, ושיטפלו בתסמנים אלו במידת הצורך. במידת האפשר, הראה להם את הארידזה או את העלון הזה. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

#### **אם שכחתי להשתמש בבנלייסטה תת-עוררי 200 מ"ג**

הזרק את המנה ששכחת ברגע שנאכרת. לאחר מכן המשך עם לוח הזמנים השבועי הרגיל או התחל לוח זמנים שבועי חדש שתחילה מהיום שהזרקה את המנה שנשכחה. אם לא הבחנת שהחמצת מנה עד לרגע בו הגיע הזמן למנת הבאה, הזרק רק את המנה הבאה כמתוכנן. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### **הפסקת הטיפול בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג**

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא הティיעצות עם הרופא.

הרופא יחליט אם עליך להפסיק להשתמש בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווות והמנה בכל פעם שהנק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנק זוקק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ רפואי או ברוקת.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מכך אף אחת

מהן.

**תגובהות אלרגיות - פנה מיד לקבלת סיוע רפואי**  
בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עלולה לגרום לתגובה לאירוע, או לתגובה אלרגית (רגישות יתר). אלו תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים). לעיתים תופעות אלו עלולות להיות חמורות (תופעות לוואי שאין שכיחות, עלולות להופיע ב- עד 1 מתוך 100 אנשים), והן עלולות להיות מסכנות-חיים. סביר יותר שתופעות חמורות אלו תתרחשנה ביום של הטיפול הראשון או השני עם בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג, אולם הן יכולות להתעכב ולהתרחש מספר ימים אחר כך.

**ספר מיד לרופא או לאהות, או פנה לחדר מיון בבית-ה החולים הקרוב, אם אתה חש באחד מהתסминים הבאים של תגובה אלרגית או תגובה לרזיקה:**

- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה או הלשון
- צפיפות בנשימה, קשיים בנשימה או קוצר נשימה
- פריחה
- גבושיםות מגדרות בעור או חrelת

לעתים נדירות, תגובות מאוחרות לבנלייטה, פחות חמורות, עלולות גם כן להתרחש, בדרך כלל חמישה עד עשרה ימים לאחר הרזיקה. הן כוללות תסמינים כגון פריחה, בחילה, עייפות, כאבי שרירים, כאבי ראש, או נפיחות של הפנים.

אם אתה חווה תסמינים אלו, במיוחד אם אתה חווה יחד שני תסמינים או יותר:  
← **ספר לרופא או לאהות.**

#### **זיהומיים**

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עלולה לגרום לך להידבק בזיהומיים בסביבות גבואה יותר ככל זיהומיים בדרכי השתן והנשימה. אלה תגובות לוואי שכיחות מאוד ועלולות להופיע ב- יותר מ- 1 מתוך 10 אנשים. זיהומיים מסוימים עלולים להיות חמורים ויכולים לגרום למות באופן לא-שכיח.

אם אתה חווה אחד מהתסминים הבאים של זיהום:

- חום ו/או צמרמות
  - שיעול, בעיות נשימה
  - שלשול, הקאה
  - תחרשת צריבה בזמן מתן שתן; מתן שתן לעתים תכופות
  - עור חם, אדום או כואב או פצעים בגוף.
- ← **פנה מיד לרופא או לאהות.**

#### **דיכאון והתאבדות**

קיים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדן, וניסיונות התאבדות במהלך הטיפול עם בנלייטה. דיכאון עלול להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים, מחשבות אובדן וניסיונות התאבדות עלולים להופיע ב- עד 1 מתוך 100 אנשים. אם אתה מודוכא, יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או מחשבות מטרידות אחרות, או אם אתה מודוכא ומבחן שהרגשתך מחמירה או שאתה מפתח תסמינים חדשים:

← פנה לרופא או גש מיד לבית החולים.

#### סיכון מוגבר לziehoms מוחי:

תרופות המחלישות את מערכת החיסון, כגון בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, עלולות לשים אותך בסיכון מוגבר להידבק בziehoms מוחי נדרי אף חמור ומסכן חיים הקורי PML - Progressive Multifocal מתקדמת (Leukoencephalopathy).

תסמינים של לויוקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת:

- אובדן זיכרון
- קושי לחשב
- קושי לדבר או ללכט
- אובדן ראייה

← ספר לרופא מיד אם אתה חווה אחד מתסמינים אלו, או בעיות דומות שנמשכו מעל למספר ימים.

אם כבר חווית תסמינים אלו לפני תחילת הטיפול עם בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג:

← ספר מיד לרופא אם אתה מבחין בשינויים כלשהם בתסמינים אלה.

#### תופעות לוואי אפשריות נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ 1 מתוך 10 אנשים:

- ziehoms חידקניים (ראה פסקה "ziehoms" לעיל)

#### תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים:

- חום גבוה
- תగבות באזור ההזרקה, לדוגמה: פריחה, אדמומיות, גרד או נפיחות של העור במקום בו הזרקת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג
- פריחה גבשוית ומגרדת (חרלה), פריחה בעור
- ספירה נמוכה של תאי דם לבנים (ניתן להבחין בבדיקה דם)
- ziehoms באף, בגרון או בקיבה
- כאב בידים או בכפות הרגליים
- מיגרנה
- בחילה, שלשול

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות

המפנה לטופס המקורי לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה  
לכתובת: [www.health.gov.il/](http://sideeffects.health.gov.il/)

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנع הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין לשימוש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל-8°C).
- אין להקפיא.
- יש לאחסן באזירה המקורי כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המקורי לשימוש בטמפרטורת החדר (עד 25°C) כשהוא מוגן מאור במשך 12 שעות לכל היותר. לאחר הוצאתו מהקרר **יש לשימוש בעט תוך 12 שעות או להשליכו.**
- אין להשליך תרופות לבזבוב או לפסולת הביתה. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium Chloride, L-Arginine Hydrochloride, L-Histidine  
Monohydrochloride, L-Histidine, Polysorbate 80, Water for Injection

ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:  
בנלייטה תה-עוררי 200 מ"ג משוקת בעט מזרק מוכן לשימוש, המכיל 1 מ"ל תמייסה נתולת צבע עד צהבהבה בצבעה, לשימוש חד-פעמי.  
כל אריזה מכילה 1 עט מזרק מוכן לשימוש או 4 עטי מזרק מוכנים לשימוש.  
ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.
- בעל הרישום: גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצרן: גלקסו אופריזנס אנגליה בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 161-25-35439
- שם הפשטות ולהקלת הקיריה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינט בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.  
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלו.

## הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש

### פעם בשבוע

מלא אחר ההוראות שלහן המנחות כיצד להשתמש בצורה נכונה בעט מזרק מוכן לשימוש. אי-AMILIO לאחר ההוראות עלול להשפיע על תפקוד תקין של עט המזרק המוכן לשימוש. עליך גם לעבור הדרכה כיצד להשתמש בעט המזרק המוכן לשימוש. בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג מיועדת לשימוש **תת עוררי בלבד**.


### אחסון

- יש לאחסן במקדר (בין  $2^{\circ}\text{C}$  ל- $8^{\circ}\text{C}$ ).
- אין להקפייא.
- שמור באזית הקרטון כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהמקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (עד  $25^{\circ}\text{C}$ ) כשהוא מוגן מארור במשך 12 שעות לכליותר. לאחר הוצאתו מהמקרר **יש להשתמש בו תוך 12 שעות או להשליכו**.
- יש להרחיק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.


### ażhorot

- �ט המזרק המוכן לשימוש מיועד לשימוש חד-פעמי ויש להשליכו לאחר מכן.
- אין לחלק את בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש עם אדם אחר.
- אין לנער.
- אין להשתמש אם נפל על משטח קשה.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני הזרקה.


חלקי בnalista תת-עורית 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש



חומרים הדרושים להזקה



בnalista תת-עורית 200 מ"ג עט מזרק מוכן



מטלית אלכוהול  
(לא כולל באירועה)

פְּד גָּזָה או צִמְרָגָפָן  
(לא כולל באירועה)

1. אוסף ובודק את האביזרים  
אוסף אביזרים


- הוצא מהמקרר מגש אחד סגור של עט מזרק מוכן לשימוש.
- מצא משטח נוח, מואר היטב ונקי והנח עליו את האביזרים הבאים בהישג יד:
  - בnalista תת-עורית 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש.
  - מטלית אלכוהול (לא כולל באירועה).

- פד גזזה או צמר גפן (לא כולל באירועה).
- מכל ריק עם מכסה צמוד להשלכת העט המשומש (לא כולל באירועה).
- אל תבצע את הזרקה אם אין לך את כל האביזרים הרשומים מעלה.

**בדוק את תאריך התפוגה**

- קלף את הכיסוי של המגש והווצה את עט המזרק המוכן לשימוש.
- בדוק את תאריך התפוגה שלל עט המזרק המוכן לשימוש (ציוויל 1).

**ציוויל 1**



- אל תשתמש בתכשיר אם תאריך התפוגה עבר

**2. הכן ובודק את עט המזרק המוכן לשימוש יש לאפשר לעט המזרק להגיע לטמפרטורת החדר**

- הניח את העט בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות (ציוויל 2). הזרקה של עט בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג קר עלולה לקחת זמן ממושך יותר ועלולה להיות לא נוחה.

**ציוויל 2**




- אל תחמס את העט בכל דרך אחרת. לדוגמה, אל תחמס במיקרוגל, במים חמים או באור שימוש ישיר.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי במהלך שלב זה.

**בדוק את התמיסה של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג**

- הסתכל בחלון הבדיקה כדי לבדוק שתמיסת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג היא נטולת צבע עד צהבהבה בצבעה (ציפור 3).
- זה תקין לראותות בועת אוויר אחת או יותר בתמיסה.

### ציפור 3

**תמייסת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג**




- אל תשתמש אם התמיסה נראהיה עכורה, בצבע שונה או אם יש בה חלקיקים.

**3. בחר ונקה את אזור ההזרקה  
בחר את אזור ההזרקה**

- בחר את אזור ההזרקה (בטן או ירך) כפי שניתן לראות בציור 4.

### ציפור 4




- אם אתה זקוק לשתי זריקות להשלמת המינון, השאר לפחות 5 ס"מ בין כל מקום ההזרקה אם אתה מזמין באותו אזור.
- אל תזריק בכל פעם בדיקות באותו האזור. זאת על מנת למנוע מהעור להתקשות.
- אל תזריק באזוריים בהם העור רגיש, פצוע, אדום או קשה.
- אל תזריק במרחק הקטן מ- 5 ס"מ מהטבור.

**נקה את אזור ההזרקה**

- רחץ את ידיך.
- נקה את אזור ההזרקה על ידי ניגובו במטלית אלכוהול (ציפור 5). הנה לעור להתייבש באוויר.

**ציפור 5**




- אל תיגע באזור זה שוב לפני מתן הזרקה.

**4. התכוון להזרקה  
הסר את המכסה הטבעתי**

- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני הזרקה.
- הסר את המכסה הטבעתי על ידי משיכה או סיבוב שלו. ניתן לסובב את המכסה הטבעתי עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון (ציפור 6).

**ציפור 6**




- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.

### מקם את העט

- אחו עט בנוחות כך שתוכל לצפות בחלון הבדיקה. זה חשוב כדי שתוכל לוודא מתן מינון מלא (ציל 7).

### ציל 7




- במידת הצורך, משור או מתח את העור באזור ההזרקה כדי להפוך אותו למוצק יותר.
- מקם את העט ישר מעל אזור ההזרקה (בזווית של 90 מעלות). ודא שמאן המחט המוחаб שטוח על-פני העור.

### 5. הארק בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג התחל את ההזרקה

- לחץ את העט באופן יציב וחזק כל הדרך לתוך אזור ההזרקה והחזק אותו במקום (ציל 8).
- פעולה זו תחדיר את המחט ותתחל את ההזרקה.

### ציל 8




יתכן שתשמעו "קליק" ראשון בתחילת ההזרקה. אתה תראה את המחוון (אינדיקטור) הסגול מתחילה לנوع דרך חלון הבדיקה (ציל 9).

## ציוויל 9



השלם את ההזרקה המשך להחזיק את העט בכיוון מטה עד שהמחוון (אינדיקטור) הסגול יפסיק לנوع. יתרכן שתשמעו "קליק" שני כמו שנויות לפני שהמחוון (אינדיקטור) הסגול מפסיק לנوع (ציוויל 10).

## ציוויל 10



יתרכן שההזרקה תימשך 15 שניות עד להשלמה.

- כארש ההזרקה הושלמה, הרם את העט מאזור ההזרקה.

## 6. השליך ובדוק השלך את העט המשומש

- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.
- השלך את העט המשומש והמכסה הטבעתי לתוך מכל ריק עם מכסה צמוד.
- בקש מהרופא או מהרווקח הסבר כיצד להשליך כראוי עט משומש או מכל שבתוכו עטים משומשים.
- אל תמחזר או תשליך עט משומש, או מכל שבתוכו עטים משומשים, בפסולת ביתית.

**בדוק את איזור ההזרקה**

ויתכן שתהייה כמות קטנה של דם באיזור ההזרקה.

- במידת הצורך, לחץ צמר גפן או פד גזהה על איזור ההזרקה.

- **אל תשפssh איזור ההזרקה.**

*Ben 200mg PT v6E*