

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

بنليستا تحت الجلد 200 ملغ محلول للحقن ضمن قلم محقنة جاهز للإستعمال

كل قلم محقنة جاهز للإستعمال ذو 1 مل ل يحتوي على 200 ملغ بيليموماب (belimumab 200 mg).

لائحة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، انظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
ووصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

بنليستا تحت الجلد 200 ملغ مخصص كاضافة علاج لدى متعالجين كبار لديهم ذئبة (لوپوس) إحمرارية جهازية (SLE) نشطة، إيجابية لأجسام مضادة ذاتية، مع نسبة نشاط مرتفعة للمرض (مثلاً وجود أضداد ضد الحمض النووي الريبوزي منقوص الأوكسجين ثانوي السلسة (dsDNA) ونسبة مكمel منخفضة (low complement)) بالرغم من العلاج الإعتيادي.

بنليستا مخصص لعلاج متعالجين كبار لديهم ذئبة (لوپوس) التهاب الكلى النشطة بمشاركة علاجات مثبتة للجهاز المناعي.

الفصيلة العلاجية: مثبط مناعي إنتقائي.
الذئبة هو مرض يهاجم فيه جهاز المناعة (الجهاز الذي يحارب التلوثات) الخلايا والأنسجة التابعة لك، ويسبب الإلتهاب وتضرر الأعضاء. يمكن أن يصيب المرض تقريباً كل عضو في الجسم ويعتقد بأنه مرتبط بنوع من خلايا الدم البيضاء، المسماة خلايا B.

يحتوي بنليستا تحت الجلد 200 ملغ على بيليموماب (ضد بشرى وحيد النسيلة). هو يقلل من عدد خلايا B في دمك عن طريق حجب عمل BLyS، بروتين الذي يساعد خلايا B على الحياة لفترة أطول وهو موجود بنسبة مرتفعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الذئبة.

أنت ستلتقي بنليستا تحت الجلد 200 ملغ بالإضافة للعلاج الإعتيادي الخاص بك لمرض الذئبة.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أlierجي) لـ بيليموماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6).

← أخبر الطبيب إذا كنت تعتقد أن أيّاً من هذه ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ بنليستا تحت الجلد 200 ملغ، إدك للطبيب إذا:

- كنت تعاني حالياً من تلوث أو لديك تلوث مستمر أو إذا كنت تعاني من تلوثات في أوقات متقاربة. يقرر الطبيب فيما إذا بالإمكان إعطائك بنليستا تحت الجلد 200 ملغ.
- كنت تخطط لتلقي لقاح أو تلقيت لقاح في الأيام الـ 30 الأخيرة. هناك لقاحات لا يجوز إعطائهما قريب للعلاج أو خلال العلاج بـ بنليستا تحت الجلد 200 ملغ.
- كان مرض الذئبة يؤثر على جهازك العصبي.
- كنت حاملاً لـ HIV (فيروس فشل المناعة البشري) أو إذا وجدت لديك نسب منخفضة من الإيمونوغلوبولينات.
- وجد لديك أو كان لديك التهاب كبد فيروسي من نوع B أو C.
- اجتررت زراعة أعضاء أو نخاع عظم أو خلايا جذعية.

٠ كان لديك سرطان.

← إحك للطبيب إذا كان من الجائز أن واحد منها ينطبق عليك.

إكتئاب وإنتحار

تتوفر بلاغات عن إكتئاب، أفكار إنتحارية، ومحاولات إنتحار بما في ذلك إنتحار خلال فترة العلاج بـبنليستا. إحك للطبيب إذا وجدت لديك سابقة لهذه الحالات. إذا شعرت بأعراض جديدة أو تفاقم في الأعراض في أي وقت:

→ راجع الطبيب أو توجه حالاً للمستشفى.

إذا كنت مكتئباً أو لديك أفكار للإلحاق الأذى بنفسك أو للإنتحار، فمن الجائز أن تجد بأنه من المجدي أن تحك لقريب عائلي أو صديق مقرب وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يقولوا لك فيما إذا كانوا فقين بخصوص التغيرات في مزاجك أو في سلوكك.

انتبه لأعراض هامة

إن المتعالجين الذين يستعملون أدوية تؤثر على جهازهم المناعي قد يكونوا معرضين لخطورة متزايدة للعدوى بتلوثات، بما في ذلك تلوث دماغي نادر لكنه خطير يسمى إعتلال بيضاء الدماغ المتعدد البؤر المتقدم.

(PML – Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

← لمعلومات إضافية إقرأ عن "تزايد الخطورة لحدوث تلوث دماغي" في الفقرة 4 من هذه النشرة.

الأطفال والمراهقون

لا تعطي بنليستا تحت الجلد 200 ملغ لأطفال أو لمراءقين دون عمر 18 سنة.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل أدوية تؤثر على الجهاز المناعي، يشمل أي دواء يؤثر على خلايا B (يستعمل لعلاج السرطان أو أمراض التهابية).

← إن استعمال مثل هذه الأدوية بمشاركة بنليستا تحت الجلد 200 ملغ قد يجعل الجهاز المناعي أقل نجاعة. قد يزيد هذا الأمر من الخطورة لديك للإصابة بتلوث خطير.

الحمل والإرضاع

وسائل منع الحمل لدى نساء في سن الخصوبة

استعملني وسيلة منع حمل ناجحة خلال فترة العلاج بـبنليستا تحت الجلد 200 ملغ وخلال 4 أشهر على الأقل بعد المقدار الدوائي الأخير.

الحمل

عادة، لا يوصى باستعمال بنليستا تحت الجلد 200 ملغ إذا كنت في فترة الحمل.

• بلغى الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، إذا كنت تعانين بأنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل. يقرر الطبيب فيما إذا بإمكانك استعمال بنليستا تحت الجلد 200 ملغ.

• إذا أصبحت حاملاً أثناء معالجتك بـبنليستا تحت الجلد 200 ملغ، بلغى الطبيب عن ذلك.

الإرضاع

بلغى الطبيب إذا كنت مرضعة. من المرجح أن بنليستا تحت الجلد 200 ملغ يمكن أن ينتقل إلى حليب الأم. يتحدث معك الطبيب فيما إذا توجب عليك التوقف عن العلاج بـبنليستا تحت الجلد 200 ملغ خلال فترة الإرضاع أو فيما إذا توجب عليك التوقف عن الإرضاع.

السيارة وإستعمال الماكنات

يمكن أن يسبب بنليستا تحت الجلد 200 ملغ أعراضًا جانبية التي قد تضعف من قدرتك على السيارة أو إستعمال الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

معلومات هامة عن محتوى بنليستا:

يحتوي بنليستا تحت الجلد 200 ملغ على أقل من 1 ميلليمول صوديوم (23 ملغ) للمقدار الدوائي، لذا يعتبر الدواء خال من الصوديوم.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

بنليستا تحت الجلد 200 ملг يعطى بواسطة حقنة تحت الجلد في نفس اليوم من كل أسبوع.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

ذئبة (لوبيوس) أحمرارية جهازية (SLE)

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة: 200 ملг (كامل محتوى قلم واحد) مرة في الأسبوع.

ذئبة (لوبيوس) التهاب الكلى

إن المقدار الدوائي الإعتيادي من شأنه أن يتغير. سيقوم الطبيب بتحديد المقدار الدوائي المناسب من أجلك، وهو:

• مقدار دوائي ذو 200 ملг (كامل محتوى قلم واحد) مرة في الأسبوع.

أو

• مقدار دوائي ذو 400 ملг (كامل محتوى قلمين بذات اليوم) مرة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع. بعدها، فإن المقدار الدوائي الموصى به هو 200 ملг (كامل محتوى قلم واحد) مرة في الأسبوع.

إذا كنت ترغب في تغيير يوم الحقن:

إحقن مقدار دوائي في اليوم الجديد (حتى ولو إنقضى أقل من أسبوع منذ المقدار الدوائي الأخير الخاص بك). منذ ذلك اليوم واصل بحسب جدول المواعيد الأسبوعي الجديد.

حقن بنليستا تحت الجلد 200 ملغ:

المرضية أو الطبيب يوضح لك أو للشخص الذي يعالجك كيف يتم حقن بنليستا تحت الجلد 200 ملغ. إن الحقنة الأولى بواسطة قلم المحقنة الجاهز للاستعمال لـ بنليستا تحت الجلد 200 ملغ تكون تحت إشراف الممرضة أو الطبيب. بعد أن تلقى منها الإرشاد حول كيفية استعمال القلم، فإن الممرضة أو الطبيب يمكنهما أن يقررا بأنه بإمكانك الحقن لنفسك أو أن المعالج الخاص بك يمكنه أن يحقن لك.

يرشّدك كل من الممرضة أو الطبيب أيضًا بخصوص أي من العلامات والأعراض يجب الإنتباه لها عند إستعمال بنليستا تحت الجلد 200 ملغ، لأنه يمكن أن تظهر ردود فعل تحسسية خطيرة (أنظر الفقرة 4 "ردود فعل تحسسية").

يجب حقن بنليستا تحت الجلد في منطقة البطن أو في منطقة الفخذ.

بنليستا تحت الجلد 200 ملغ عبارة عن حقنة تحت الجلد وينم حفتها داخل الوريد (I.V.).

إن تعليمات مرحلة تلو الأخرى لحقن بواسطة قلم المحقنة الجاهز للاستعمال موجودة في نهاية هذه النشرة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من بنليستا تحت الجلد 200 ملغ

عليك التوجه حالاً للطبيب أو للممرضة ليشرفا عليك تحسباً لتطور علامات أو أعراض لديك لأعراض جانبية، وأن يعالجا هذه الأعراض إذا دعت الحاجة. إذا أمكن، أريهم العلبة أو هذه النشرة.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال بنليستا تحت الجلد 200 ملغ

إحقن المقدار الدوائي الذي نسيته لحظة تذكرك بذلك. ومن ثم واصل وفق جدول المواعيد الأسبوعي الإعتيادي أو إبدأ جدول مواعيد أسبوعي جديد حيث يبدأ من اليوم الذي حققت فيه المقدار الدوائي المنسي.

إذا لم تلاحظ بأنك فوتت مقداراً دوائياً إلا عند لحظة بلوغ موعد المقدار الدوائي القادم، فاحقن فقط المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط.

يجب المواظبة على العلاج بحسب تعليمات الطبيب.

التوقف عن العلاج بـ بنليستا تحت الجلد 200 ملغ
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
يقرر الطبيب فيما إذا عليك التوقف عن إستعمال بنليستا تحت الجلد 200 ملغ.
لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال بنليستا تحت الجلد 200 ملغ قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

ردود فعل تحسسية - توجه حالاً لتلقي مساعدة طبية
قد يؤدي بنليستا تحت الجلد 200 ملغ لحدوث رد فعل للحقيقة، أو رد فعل تحسسي (فرط حساسية). هذه أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص). أحياناً قد تكون هذه الأعراض خطيرة (أعراض جانبية غير شائعة، قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص)، وقد تشكل خطراً على الحياة. من المرجح أكثر أن تحدث هذه الأعراض الخطيرة في يوم العلاج الأول أو الثاني بواسطة بنليستا تحت الجلد 200 ملغ، لكن يمكن أن تتأخر وأن تحدث بعد عدة أيام بعد ذلك.

أخبر الطبيب أو الممرضة فوراً، أو توجه لغرفة الطوارئ في المستشفى القريب، إذا شعرت بإحدى الأعراض التالية لرد فعل تحسسي أو رد فعل للحقيقة:

- إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم أو اللسان
 - صفير أثناء التنفس، صعوبات في التنفس أو ضيق في التنفس
 - طفح
 - تدرّن جلدي حاك أو شرى
- في أحيان نادرة، قد تحدث أيضاً ردود فعل متاخرة، أقل خطورة لـ بنليستا، عادة بعد خمسة حتى عشرة أيام بعد الحقيقة. هي تشمل أعراضًا مثل طفح، غثيان، إرهاق، آلام عضلية، صداع، أو إنتفاخ الوجه.
- إذا قاسيت من تلك الأعراض، خاصة إذا كنت تقاسي من عرضين سوية أو أكثر:
- ← إشك للطبيب أو للممرضة.

تلؤثات

قد يسبب بنليستا تحت الجلد 200 ملغ إلى زيادة إحتمالية العدوى لديك بتلؤثات بما في ذلك تلؤثات في المسالك البولية والتنفسية. هذه أعراض جانبية شائعة جداً وقد تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص. تلؤثات معينة قد تكون خطيرة وتسبب الوفاة بشكل غير شائع.

إذا قاسيت من إحدى الأعراض التالية للتلؤث:

- سخونة وأو قشعريرة
 - سعال، مشاكل في التنفس
 - إسهال، تقيؤ
- الشعور بحرقة أثناء التبول؛ التبول بشكل متكرر
- جلد ساخن، أحمر أو مؤلم أو جروح في جسمك.
- ← توجه فوراً إلى الطبيب أو للممرضة.

إكتئاب وإنتحار

تتوفر بلاغات عن إكتئاب، أفكار إنتحارية، ومحاولات إنتحار خلال فترة العلاج بـ بنليستا. قد يظهر الإكتئاب لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص، قد تظهر أفكار إنتحارية ومحاولات إنتحار لدى حتى 1 من بين 100 شخص. إذا كنت مكتئباً، لديك أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو أفكار مزعجة أخرى، أو إذا كنت مكتئباً ولاحظت تفاصيل في شعورك أو تتطور لديك أعراض جديدة:

← راجع الطبيب أو توجه حالاً للمستشفى.

تزايد الخطورة لحدوث تلوث دماغي:

إن الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، مثل بنليستا تحت الجلد 200 ملغ، قد تعرضك لخطورة زائدة للعدوى بـ **PML** (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy).

أعراض إعتلال بيضاء الدماغ المتعدد البؤر المتقدم:

- فقدان الذاكرة
- صعوبة في التفكير
- صعوبة في التكلم أو المشي
- فقدان الرؤية

← إحك للطبيب حالاً إذا كنت تقاسي من إحدى تلك الأعراض، أو من مشاكل مشابهة التي استمرت لأكثر من بضعة أيام.

إذا كنت قد قاسيت من تلك الأعراض قبل بدء العلاج بـ بنليستا تحت الجلد 200 ملغ:

← أخبر الطبيب فوراً إذا لاحظت أي تغيرات في هذه الأعراض.

أعراض جانبية محتملة إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً

هذه قد تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص:

- تلوث جرثومية (أنظر الفقرة "تلوثات" أعلاه)

أعراض جانبية شائعة

هذه قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص:

- سخونة مرتفعة
- ردود فعل في منطقة الحلق، مثل: طفح، إحمرار، حكة أو إنتفاخ الجلد في المكان الذي حققت فيه بنليستا تحت الجلد 200 ملغ
- طفح بارز وحاك (شرى)، طفح جلدي
- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء (بالمكان ملاحظة ذلك في فحوص الدم)
- تلوث في الأنف، في الحنجرة أو في المعدة
- ألم في اليدين أو في راحتي القدمين
- شقيقة
- غثيان، إسهال

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبلیغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجمل رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لنفادهم إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقصاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إقصاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في البراد (بين 2 إلى 8 درجات مئوية).
- لا يجوز التجميد.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.
- يجب الإخراج من البراد قبل 30 دقيقة من الإستعمال.
- يمكن تخزين قلم المحقنة الجاهز للإستعمال بدرجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) بينما يكون محمي من الضوء لمدة 12 ساعة على الأكثر. بعد إخراجه من البراد يجب إستعمال القلم خلال 12 ساعة أو رميه.

- لا يجوز التخلص من أدوية في مياه الصرف الصحي أو في القمامات المنزلية. استشر الصيدلي عن كيفية رمي أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الخطوات تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Sodium Chloride, L-Arginine Hydrochloride, L-Histidine Monohydrochloride, L-Histidine, Polysorbate 80, Water for Injection

أنظر في الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

يسوق بنيلستا تحت الجلد 200 ملغ ضمن قلم محقنة جاهز للإستعمال، الذي يحتوي على 1 مل محلول عديم اللون حتى لون مائل إلى الأصفر للإستعمال لمرة واحدة.

تحتوي كل علبة على قلم محقنة 1 جاهز للإستعمال أو 4 أقلام محقنة جاهزة للإستعمال.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز: جلاكسوسينكلابين (إسرائيل) م.ض، شارع بازل 25، بيتح - تكفا.

المنتج: جلاكسو أوبيريشنس إنكلترا م.ض، برنارد كاسل، إنكلترا.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 161-25-35439

من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في آذار 2024.

العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
© 2024 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

تعليمات مرحلة تلو الأخرى للحقن بواسطة قلم المحقنة الجاهز للإستعمال

مرة في الأسبوع

إتبع التعليمات التالية التي ترشد كيفية إستعمال قلم محقنة جاهز للإستعمال بشكل صحيح.
إن عدم إتباع التعليمات قد يؤثر على الأداء السليم لقلم المحقنة الجاهز للإستعمال.
عليك أيضاً إجتناب إرشاد حول كيفية إستعمال قلم المحقنة الجاهز للإستعمال.
بنيلستا تحت الجلد 200 ملغ مخصص للإستعمال تحت الجلد فقط.


التخزين

- يجب التخزين في البراد (بين 2 إلى 8 درجات مئوية).
- لا يجوز التجميد.
- احفظ في علبة الكرتون للحماية من الضوء.
- يجب الإخراج من البراد قبل 30 دقيقة من الإستعمال.
- يمكن تخزين قلم المحقنة الجاهز للإستعمال بدرجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) بينما يكون محمي من الضوء لمدة 12 ساعة على الأكثر. بعد إخراجه من البراد يجب إستعماله خلال 12 ساعة أو رميه.
- يحفظ بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.

تحذيرات


- قلم المحقنة الجاهز للإستعمال مخصص للإستعمال لمرة واحدة ويجب التخلص منه بعد ذلك.
- لا يجوز مشاركة بنيلستا تحت الجلد 200 ملغ قلم محقنة جاهز للإستعمال مع شخص آخر.
- لا يجوز الخض.
- لا يجوز إستعماله في حال سقوطه على سطح صلب.
- لا تترعرع الغطاء الحلقى إلا قبيل الحقن مباشرة.

أجزاء بنليستا تحت الجلد 200 ملغ قلم محقنة جاهز للإستعمال
نافذة الفحص




عائق رمادي

خطاء حلقي




تاريخ إنقضاء الصلاحية

الأدوات اللازمة للحقن



بنليستا تحت الجلد 200 ملغ قلم محقنة جاهز للإستعمال



منديل كحولي
(غير مشمول في العلبة)



ضماد شاشي أو كرة قطنية
(غير مشمول في العلبة)

1. إجمع وأفحص الأدوات اجمع الأدوات


- أخرج من البراد لوحة واحدة مغلفة لقلم محقنة جاهز للإستعمال.
- أوجد سطح مريح، مضاء جيداً ونظيف وضع عليه الأدوات التالية بحيث تكون بتناول اليد.
 - بنليستا تحت الجلد 200 ملغ قلم محقنة جاهز للإستعمال.

- منديل كحولي (غير مشمول في العلبة).
- ضماد شاشي أو كرة قطنية (غير مشمول في العلبة).
- وعاء فارغ ذو غطاء ملتصق للتخلص من القلم المستعمل (غير مشمول في العلبة).
- لا تقوم بالحقن إذا لم يكن بحوزتك كافة الأدوات المدونة أعلاه.

إفحص تاريخ إنتهاء الصلاحية

- قشر الغلاف الذي على اللوبيحة وأخرج قلم المحقنة الجاهز للإستعمال.
- إفحص تاريخ إنتهاء الصلاحية الذي على قلم المحقنة الجاهز للإستعمال (الرسم 1).

الرسم 1



- لا تستعمل المستحضر إذا إنقضى تاريخ الصلاحية

2. حضر وإفحص قلم المحقنة الجاهز للإستعمال دع قلم المحقنة ليبلغ درجة حرارة الغرفة

- أترك القلم بدرجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة (الرسم 2). إن حقن قلم بنليستا تحت الجلد 200 ملغ، وهو بارد قد يستغرق وقتاً أطول وقد يكون غير مريح.

الرسم 2




- لا تسخن القلم بأي طريقة أخرى. مثلاً، لا تسخن بواسطة الميكروويف، الماء الساخن أو في ضوء الشمس المباشر.
- لا تترزع الغطاء الحلقى خلال هذه المرحلة.

افحص محلول بنليستا تحت الجلد 200 ملغ

- أنظر في نافذة الفحص لتأكد بأن محلول بنليستا تحت الجلد 200 ملغ عديم اللون حتى مائل للأصفر (الرسم 3). إن رؤية فقاعة هواء أو أكثر في محلول هو أمر سليم.

الرسم 3

محلول بنليستا تحت الجلد 200 ملغ




- لا تستعمل محلول إذا بدا عكراً، بلون مختلف أو كان فيه جسيمات.

3. إختر ونظف منطقة الحقن

إختر منطقة الحقن

- إختر منطقة الحقن (البطن أو الفخذ) بحسب ما هو مرئي في الرسم 4.

الرسم 4




- إذا كنت بحاجة لحقنتين لإتمام المقدار الدوائي، اترك مسافة قدرها 5 سم على الأقل بين كل مكان للحقن وذلك إذا كنت تحقن في نفس المنطقة.
- لا تحقن في كل مرة في نفس المنطقة بالضبط. وذلك لمنع قساوة الجلد.
- لا تحقن في مناطق يكون فيها الجلد حساساً، مصابباً، أحمراً أو قاسياً.
- لا تحقن بمسافة أقل من 5 سم من السرة.

نظف منطقة الحقن

- اغسل يديك.

- نظف منطقة الحقن بمسحها بواسطة منديل كحولي (الرسم 5). إترك الجلد ليجف في الهواء.

الرسم 5



• لا تلمس هذه المنطقة ثانية قبل إعطاء الحقن.


4. استعد لإجراء الحقن

إنزع الغطاء الحلقي

• لا تنزع العطاء الحلقي إلا قبيل الحقن مباشرة.

• إنزع الغطاء الحلقي عن طريق سحبه أو تدويره. بالإمكان تدوير الغطاء الحلقي باتجاه عقارب الساعة أو عكس إتجاه عقارب الساعة (الرسم 6).

الرسم 6




• لا تغطي القلم ثانية بواسطة الغطاء الحلقي.

موضع القلم

• أمسك القلم بشكل مريح بحيث تتمكن من مشاهدة نافذة الفحص. هذا مهم لتسهيل التأكد من إعطاء مقدار دوائي كامل (الرسم 7).

الرسم 7




• إذا دعت الحاجة، إسحب أو شد الجلد في منطقة الحقن ليصبح أكثر صلابة.

- موضع القلم بشكل مستقيم فوق منطقة الحقن (بزاوية 90 درجة). تأكّد من كون وaci الإبرة الذهبي مستوىً مع سطح الجلد.

5. إحقن بنليستا تحت الجلد 200 ملغ إبدأ الحقن


- إضغط القلم بشكل ثابت وقوى حتى الأسفل لداخل منطقة الحقن وثبته في مكانه (الرسم 8). هذه الخطوة تغرس الإبرة وتؤدي إلى بدء عملية الحقن.

الرسم 8



من الجائز أن تسمع "طقة" أولى في بداية الحقن. ستري عبر نافذة الفحص بأن المؤشر (indicator) البنفسجي يبدأ بالتحرك (الرسم 9).


الرسم 9



أكمل الحقن

واصل مسک القلم باتجاه الأسفل إلى أن يتوقف المؤشر (indicator) البنفسجي عن التحرك. من الجائز أن تسمع "طقة" ثانية عدة ثواني قبل توقف المؤشر البنفسجي عن التحرك (الرسم 10).

الرسم 10



من الجائز أن تستمر عملية الحقن 15 ثانية حتى إتمامها.

- إرفع القلم عن منطقة الحقن، عند إتمام عملية الحقن.

6. تخلص وأفحص

تخلص من القلم المستعمل

- لا تغطي ثانية القلم بواسطة الغطاء الحلقي.

• تخلص من القلم المستعمل والغطاء الحلقي لداخل وعاء فارغ ذو غطاء ملتصق.

- أطلب من الطبيب أو الصيدلي توضيحاً حول كيفية التخلص بشكل مناسب من القلم المستعمل أو من الوعاء الذي يدخله أقلام مستعملة.

- لا تعاود إستعمال أو رمي قلم مستعمل، أو وعاء يدخله أقلام مستعملة، في القمامات المنزلية.

أفحص منطقة الحقن

من الجائز أن تكون هناك كمية قليلة من الدم في منطقة الحقن.

- إذا دعت الحاجة، إضغط بواسطة قطعة قطن أو ضماد شاشي على منطقة الحقن.

- لا تفرك منطقة الحقن.

Ben 200mg PT v6E