

יוני 2024

וטריינר/ית נכבד/ה,

הנדון: עדכון עלונים לרופא ולצרן עבור התכשיר

**DIAZIVET 20 VETERINARY**

oral solution, for use in drinking water

**דיאזיזוט 20 וטריינר**תמיישה למ' שתייה

Active ingredients:

החומרים הפעילים:

Sulphadiazine 20 G / 100 ML

Trimethoprim 4 G / 100 ML

התוויות המאושרת לתכשיר:

In broilers - Treatment of bacterial infections of the respiratory and gastrointestinal tract, due to microorganisms sensitive to the combination of sulphadiazine and trimethoprim. Coccidiosis in broilers.

חברת רומט בע"מ מבקשת להודיע כי העלונים לרופא ולצרן של התכשיר **דיאזיזוט 20 וטריינר** עודכנו ביוני 2024.

בהודעה זו מצינים סעיפים בהם נעשו העדכונים העיקריים. עדכון המהווה החמרה - מודגש **בצהוב**. טקסט שנמחק מסומן בקו חוצה (**טקסט**), טקסט שהוסיף מסומן בצבוע (**טקסט**).

עלונים קיימים עדכנים נוספים נספחים שאינם מהווים החמרות.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות באתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלים מודפסים ע"י פניה לבעל הרישום: רומט בע"מ, המפעלים, 39/104 הרצליה.

בכבוד רב,

ליור אורנסקי

רוקחת ממונה

**העלון לרופא עודכן בסעיפים הבאים:**

**2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION**

1 ml of solution contains:

[...]

**Excipients:**

N-methyl pyrrolidone..... 300 mg

sodium formaldehyde sulfoxylate..... 2 mg

other excipients and purified water q.s. to..... 1 ml

For a full list of excipients, see section 6.1.

**4.5 Special precautions for use**

[...]

**Special precautions to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to the animals**

People with known hypersensitivity to the sulphonamides should avoid contact with the veterinary medicinal product.

Adopting the usual procedures for preparation or administration of the products, no special precautions for the person administering the product are necessary, although it is good practice to use protective clothing, gloves and mask to handle the product. Avoid contact with the skin and with the eyes. In cases of contact, rinse with plenty of soap and water.

Do not eat, drink or smoke whilst handling the product; wash the hands after use.

Laboratory studies in rabbits and rats with the excipient N-methyl pyrrolidone have shown evidence of foetotoxic effects. The veterinary medicinal product should not be administered by pregnant women and women suspected of being pregnant. Personal protective equipment consisting of gloves should be worn when handling the veterinary medicinal product by women of childbearing age.

**העלון לצריך עודכן בסעיפים הבאים:**

10. אזהרות

[...]

**• אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר**

אנשים עם רגישות ידועה לסלולונגאמידים צריכים להימנע מגע עם התכשיר.

מומלץ ללובוש ביגוד מגן, כפפות ומסכה בעת השימוש בתכשיר.

יש להימנע מגע עם העור והעיניות. במקרה של מגע, יש לשטוף עם הרבה סבון ומים.

אין לאכול, לשחות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר; יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

**מתקרי מעבדה עם החומר הבלתי פעיל א-מetyl-פרולידון (N-methyl pyrrolidone) אשר**

**בוצעו בחולדות ובארנבות הראו עדות להשפעות רעלות שלו על העובר. על כן הטיפול**

**בתכשיר לא ניתן על ידי נשים בהריון או נשים החובשות שחן בהריון. כאשר אישת בגיל**

**הפוריות מתועסקת בתכשיר עליה להשתמש בziej מגן אשי הכלול כפפות.**

13. מידע נוספים

• נוסף על החומרים הפעילים התורופה מכילה גם:

**1 מ"ל של התמיסה מכילה את החומרים הבלטיים:**

N-methyl pyrrolidone.....300 mg

sodium formaldehyde sulfoxylate.....2 mg

other excipients and purified water q.s. to.....1 ml

**רשימה מלאה של החומרים הבלטיים:**

[...]