

עלון לצריך לתכשיר וטרינרי

התרכופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרכופה הווטרינרית, צורתה וחזקתה
דיידיאזין 20 וטרינרי
תמיישה למי שתייה

2. חומרים פעילים וכמותם ביחידת מינון
סולפדייזין 20 ML 20 G/100 SULPHADIAZINE
טרימטופרימ 4 G/100 ML TRIMETHOPRIM
חומרים בלתי פעילים בתכשיר- ראו בסעיף 13 "מידע נוספת"

3. למה מיועדת התרכופה
טיפול בתרנגולות פטם: בזיהומי חידקים של דרכי הנשימה ומערכת העיכול, הנובעים מפתוגנים הרגישים לשילוב סולפדייזין-טרימטופרימ, קווקסידיזיט.

קבוצה תרופיתית:
Sulphadiazine : אנטיביוטיקה ממפעחת הסולפונאמידים
Trimethoprim : אנטיביוטיקה בקטרואסטטית

4. התוויות נגד
אין להשתמש במקרים בהם קיימת רגישות יתר לסולפונאמידים או בתפקוד לקוי מאד של הכלב או הכליה.

5. תופעות לוואי
"תכוו תגבות אלרגיות בפרטם רגיסים במוח".
דוחו מקרים של גבישים בשתן, דם בשתן ותופעות רעלות כרונית, כגון טרומבווציטופניה (מייעוט טסיות דם) ולוייקופניה (מייעוט תא דם לבנים). מתן ממושך דרך הפה עשוי להוביל לחסר בויטמין K ; כמו כן תוארו שינויים בעיכול צלולוז, לתסיסת פחימות וחוסר תיאבון.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחזה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה: תרנגולי פטם

7. צורת המtan ומינון
0.2-0.3 מ"ל תמיישה לכל ק"ג משקל גוף (שווה ערך ל- 0.7-1.0 מ"ל/ ליטר מי שתייה)
ו 48-72 מ"ג של השילוב לכל ק"ג משקל גוף).
משך הטיפול – 3-5 ימים.

במקרה של קוקסידיזס, יש לחת 2 טיפולים בני 3 ימים כל אחד, במרווח של 2 ימים בין הטיפולים.

8. אופן השימוש בתכשיר

במتن במאי השטיה חובה לנקח בחשבון את הצריכה היומית, התלויה במצב הגוף של העופות. על מנת להבטיח מינון נכון ולהימנע מהת מינון יתר, יש לחלק את החירות לקבוצות על בסיס משקל גוף, ולקחת בחשבון את צריכת המים היומיות ולחשב בזהירות את המינון של התכשיר המועד לניהול במאי השטיה.

9. זמן המתנה

תרנגולות פטם: 8 ימים
לא לשימוש בתרנגולות מטילות ביצים לצריכת אדם.

10. אזהרות

- בתנאי אקלים המגבירים את צריכת המים, יש לחת רק את המינון המינימלי. במקרה של טיפול מותמץ (בקוקסידיזס) מומלץ מותן של ויטמין K.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיות המטרה

אין לחת את הטרופה במים חומציים.
יש לבסס את השימוש בתרופה על מבחני רגשות של חידקים שבודדו מהחירות המירועות לטיפול. אם אין זה אפשרי, יש לבסס את הטיפול על מידע אפידמיולוגי מקומי.
שימוש לא נכון בתרופה יכול להגבר את השכיחות של חידקים עמידים לסלפונאמידים וכן עלול להפחית את יעילות הטיפול בתכשירים אנטימייקروبיאליים אחרים, עקב עמידות צולבת אפשרית.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

אנשים עם רגשות ידועה לסלפונאמידים צריכים להימנע מגע עם התכשיר.
מומלץ ללבוש ביגוד מגן, כפפות ומסכה בעת השימוש בתכשיר.
יש להימנע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף עם הרבה סבון ומים.
אין לאכול, לשחות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר; יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.
מחקרים מעבדה עם החומר הבלטי פעיל א-מטייל-פירולידון (N-methyl pyrrolidone) אשר בוצעו בחולדות ובארנבות הרוא עדות להשפעות רעליות שלൊ על העובר. כל הנ טיפול בתכשיר לא ינתן על ידי נשים בהריון או נשים החשובות שכן בהריון. כאשר אישה בגיל הפוריות מטפלת בתכשיר עליה להשתמש בצד מגן אישי הכלול כפפות.

שימוש בהטלה

אין להשתמש בתרנגולות מטילות ביצים לצריכת אדם.

תגובה עם תרופות אחרות

אין להשתמש בתכשיר בשילוב עם תכשירים רפואיים וטרינריים אחרים בעלי יכולת קשיירה גבוהה לחלבוני פלסמה.

מינון יתר

בד"כ מותן של מנות גבוהות וסבל היטב.

חוסר התאמה (incompatibility)

אין לערраб את הטרופה עם תרופות וטרינריות אחרות.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנع הרעלת.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : במקומות חשוך, מתחת ל 25°C.
- חי מדף לאחר פתיחה ראשונה: 3 חודשים, כאשר התכשיר מאוחסן מתחת ל 25°C.
- חי המדף לאחר המילוי בהתאם להוראות הכנה: 24 שעות, באחסון מתחת ל 25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר ווטרינרי יש להשמיד כפסולת רעלת, אין להשליך לבוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

1 מ"ל של התמיסה מכילה את החומרים הבלתי פעילים:

N-methyl pyrrolidone.....300 mg
sodium formaldehyde sulfoxylate.....2 mg
other excipients and purified water q.s. to.....1 ml

רשימה מלאה של החומרים הבלתי פעילים:

Polyethylene glycol 400 (Macrogol 400), Purified water, N-Methyl-2-Pyrrolidone, Sodium hydroxide, Ethanolamine, Lactic acid, Sodium formaldehyde sulfoxylate,

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה- Tamisa צוללה צהובה
- גודל האריזה : 1 ליטר

- בעל הרישום: רומט בע"מ, המפעלים , 39/104 הרצליה 46543

- היצרן:

FATRO S.P.A., VIA EMILIA 285 - 40064 ,OZZANO EMILIA, BOLOGNA, ITALY

אישור ב: יוני 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

083-11-92352-00