

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

לייסדקס טבע 30 מ"ג כמוסות
לייסדקס טבע 40 מ"ג כמוסות
לייסדקס טבע 50 מ"ג כמוסות
לייסדקס טבע 60 מ"ג כמוסות
לייסדקס טבע 70 מ"ג כמוסות

החומר הפעיל וכמותו:
כל כמוסה של לייסדקס טבע 30 מ"ג מכילה:
לייסדקסאמפטמין דימסילט 30 מ"ג
Lisdexamfetamine dimesylate 30 mg
כל כמוסה של לייסדקס טבע 40 מ"ג מכילה:
לייסדקסאמפטמין דימסילט 40 מ"ג
Lisdexamfetamine dimesylate 40 mg
כל כמוסה של לייסדקס טבע 50 מ"ג מכילה:
לייסדקסאמפטמין דימסילט 50 מ"ג
Lisdexamfetamine dimesylate 50 mg
כל כמוסה של לייסדקס טבע 60 מ"ג מכילה:
לייסדקסאמפטמין דימסילט 60 מ"ג
Lisdexamfetamine dimesylate 60 mg
כל כמוסה של לייסדקס טבע 70 מ"ג מכילה:
לייסדקסאמפטמין דימסילט 70 מ"ג
Lisdexamfetamine dimesylate 70 mg

- ازהרה: תלות, שימוש לרעה והתמכרות
יש סיכוי גבוה של לייסדקסאמפטמין יגרום לתלות, להתמכרות ולשימוש לרעה, מה שועלול להוביל
להתפתחות הפרעה בשימוש בתרופה, הכוללת התמכרות.
התלות והשימוש ממירים ממריצים של מערכת העצבים המרכזית, כולל בלייסדקס טבע,
עלולים לגרום למנת יתר ולמוות.
- לפני מתן מרשם לייסדקס טבע, הרופא המתופל יעריך את הסיכון של המטופל לפתח תלות,
לשימוש לרעה ולהתמכרות.
 - הרופא יידע את המטופל ובני משפחתו לגבי סיכונים אלה, אחסון נאות של התרופה וסילוק
נכון של תרופה שלא נעשו בה שימוש.
 - במהלך הטיפול, הרופא יעריך מחדש את הסיכון של המטופל ויעקב באופן תדיר אחר
סימנים ותסמינים של תלות, שימוש לרעה והתמכרות.

חומרים בלתי פוטיים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוספת".
קרא בעיון את העalon עד סוףו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך
שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי
מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לטיפול ב-ADHD בילדים מתחת לגיל 6 או לטיפול באכילה כפייתית - BED במטופלים
 מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

לייסדקס טבע מיועדת לטיפול בהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (ADHD).
לייסדקס טבע יכולה לשפר את הקשב ואת הריכוז, ולהקטין אימפלסיביות והיפראקטיביות במטופלים עם ADHD.
לייסדקס טבע מיועדת לטיפול בהפרעת אכילה כפייתית מתונה עד חמורה. לייסדקס טבע עשויה להפחית את
מספר ימי האכילה הכספיים במטופלי (Binge eating disorder).

Lisdex Teva 30 40 50 60 and 70 mg Capsules Notif 0624

לייסדקס טבּע אינָה מִיעוּדָת לַרְיִדָּה בְמִשְׁקָל. לֹא יְדֹוע אֶם לַיְסְדָקָס טַבּע בְטֻוחָה וַיְעִילָה לַטִּיפּוֹל בְהַשְׁמָנָת יִתְרָה.

לייסדקס טבּע מִיעוּדָת רָק לִמְטוּפְלִים מֵעַל גַּיל 6 עַם ADHD וְלִמְטוּפְלִים מֵעַל גַּיל 18 עַם BED.

קבוצה רפואייתית - מעורר מערכת העצבים המרכזית.

אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של לייסדקס טבּע לטיפול ב-ADHD בילדים מתחת לגיל 6 או במטופלים עם BED מתחת לגיל 18.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם אתה או יְלָדֶך:

- רגישים (אלרגיים) לחומר הפעיל (lisdexamfetamine dimesylate) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוספת").
- נוטלים או נטלתם ב-14 הימים האחרונים תרופה נגד דיכאון מקבוצת מעכבי מונואמין אוקסידז (MAOIs).
- רגישים, אלרגיים או הייתה לך תגובה אלרגית לתרופות אחרים המעוררים את מערכת העצבים המרכזית.
- טיפולם באנטיביוטיקה לינזolid או במתילן כחול תור וריד.

اذhorות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לייסדקס טבּע הינה תרופה המוגדרת כס' היא עלולה לגרום לתלות או שעלולים לעשות בה שימוש לרעה. יש לשמור את התרופה במקום בטוח למניעת שימוש לרעה.
- שומר על לייסדקס טבּע במקומות בטוח כדי להגן מפני גניבה. מכירה או מסירה של לייסדקס טבּע לאחרים עלולה לגרום לנזק ונוגדת את החוק. ספר לרופא המתפל אֵם אתה או יְלָדֶך השתמשת לרעה או פיתחתם תלות באלכוהול, בתכשירי מרשם או בתרופות לא חוקיות.

לייסדקס טבּע הינה תרופה מעוררת, עלולה לגרום לביעות הבאות בחלוקת מהמשתמשים:

a. בעיות הקשורות לבָב:

- מווות פתאומי במטופלים אשר סובלים מבעיות לב, ממום לב.
- מווות פתאומי, שבץ והתקף לב מבוגרים.
- עליה בלחץ דם ובקצב לב.

עליך לידע את הרופא אם לך או לילדך יש בעיות לב, מום לב, לחץ דם גבוה או היסטוריה משפחתיות של אחת מהבעיות הללו.

לפני תחילת השימוש בלייסדקס טבּע, הרופא צריך לבדוק האם יש לך או לילדך בעיות לב. במהלך הטיפול, על הרופא לבדוק לך או לילדך באופן קבוע לחץ דם וקצב לב.

במהלך הטיפול, עליך לפנות לרופא מיד אם אתה או לילדך מראים סימנים של בעיות לב כמו כאב בחזה, קוצר נשימה או התעלפות.

b. בעיות נפשיות (פסיכיאטריות) שכוללות:

- הפרעות התנהגות חדשות או החמרה בהפרעות קיימות והפרעות חשיבה.
- הופעה או החמרה של מחלת דו קוטבית.

תסמנים פסיכוטיים חדשים

- שמיית קולות.
- אמונה בדברים שאינם נכונים.
- חשדנות.
- תסמיini מאניה חדשים.

עליך לדוח ל佗פא על כל בעיה ונPsiית שלך או של לילדך או על היסטוריה משפחתיית של התאבדות, מחלות דו-קוטביות (ביפולריות) או דיכאון.

יש לפנות לרופא מיד אם לך או לילדך יש **תסמנים נפשיים חדשים**, החמרה של **תסמנים נפשיים קיימים** או **בעיות כגן:**

- ראייה או שמייה של דברים שאינם אמיתיים.

- אמונה בדברים שאינם אמיתיים.
- חשדנות.

ג. בעיות בזרימת הדם באצבעות הידיים והרגליים (מחלת כל דם היקפיים הכוללת את תסמונת ר'ינן):

- עלולה להיות תחושה של קריוזת, כאב, חוסר תחושה באצבעות הידיים והרגליים.
- אצבעות הידיים והרגליים יכולות לשנות צבע מחייך לכחול ולאדום.
- יש לידע את הרופא המטפל אם אתה או ילך סובלים מחוסר תחושה, מכאב, משינוי באצבע העור או מרגישות לטמפרטורה באצבעות הידיים והרגליים.
- יש לפנות אל הרופא מייד אם אצלך או ילך מופיעים בזמן לקיחת ליסדקס טבע, סימנים של פצעים בלתי מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים.

לפני הטיפול בליידקס טבע ספר לרופא או לרוקח אם:

יש לך או ילך או אם קיימת היסטוריה משפחתית של:

- בעיות לב, מומי לב, מחלת לב, לחץ דם גבוה.
- בעיות נפשיות כגון פסיכזה, מאניה, מחלת דו-קוטבית או דיכאון.
- בעיות בזרימת הדם באצבעות הידיים והרגליים.
- בעיות בכליות. הרופא עשוי להפחית את המינון.
- תנודות או ציללים חוזרים (טיקים) או תסמונת טורט

בדיקות ועקב

בתקופת הטיפול יתכן שתפונה גם לבדיקות דם, בדיקות לב ובבדיקות סדיות של לחץ דם. בתקופת הטיפול ילדים יש לבדוק לעתים קרובות את הגובה והמשקל. הרופא ישකול להפסיק את הטיפול אם ילך לא גדול או לא מעלה במשקל. הרופא עשוי להפסיק את הטיפול בליידקס טבע כדי לבדוק את תסמיין ה-ADHD או ה-BED.

איןטראקטיות/תגובה בין תרופתיות
אם אתה או ילך לוקחים, או אם לקחתם לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה או ילך לוקחים:

- מעכבי ספיגה חוזרת של סרotonin (SSRIs).
- מעכבי ספיגה חוזרת של סרotonin ונוראפינפרין (SNRIs).
- תרופות המשמשות לטיפול בכאבי ראש מיגרנוטיים, הנקראות טריפטניים.
 - ליתיום.
 - פנטניל.
 - טרמડול.
 - טריפטופן.
 - בוספירון.
- Wort St. John's (היפריקום).
- תכשירים נוגדי דיכאון כולל משפחת מעכבי מונואמי אוקסידאז (OAO), לדוגמה: סלגיין, איזוקרבוקסיד, פנילז'ין, טרנילס'יפרומין (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם").
 - ויטמין C (חומרה אסקורבית).
 - סודה לשתייה (ביקרבונאט).
- חומרים המעלים את בסיסיות השתן כגון אצטוזלאמייד, תיאזידים.
- חומרים המעלים את חומציות השתן כגון אמוניום קלורייד, נתרן חומצה פוסfat (sodium acid phosphate), מלחי מתנהמיין.
- נוגדי דיכאון טרצ'יקליים כגון דס'פראמיין, פרוטריפטילין.

לייסדקס טבע יכולה להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות והן יכולות להשפיע על אופן פעולתה של לייסדקס טבע, מה שיכל לגרום לתופעות לוואי חמורות. עליך להכיר את התרופות שאתה או ילך לוקחים. יש לשמור רשימה של התרופות שלכם כדי להראות לרופא ולרוקח עם קבלת תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומדוזן

ניתן ליטול את הכמוסה עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
לא מומלץ לשותות משקאות אלכוהוליים בזמן הטיפול בליידקס טבע. אלכוהול עלול להחמיר תופעות לוואי המופיעות בזמן הטיפול בליידקס טבע.

הירין והנקה
לא מומלץ להניך בזמן הטיפול בליידקס טבע. אם את בהירין או עשויה להיות בהירין, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.
התרופה עוברת לחלב אם. יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בה אם את מניקה או מתכנת להניך.

נהיגה ושימוש במכוניות
אין לנוהג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה עד שתדע כיצד ליידקס טבע משפיעה עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בכמותה, ועל כן נחשבת ל"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח לגבי המינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
המינון המקביל בדרך כלל הוא:
מינה אחת של ליידקס טבע כל בוקר.

נטילת כמוסות ליידקס טבע:

- ניתן לבלווע את כמוסות ליידקס טבע בשלמותן.
- אם יש לך קושי בבליעת הכמוסה, ניתן לפתח אותה:
 - ניתן לערביב את האבקה בכוס עם יוגורט, מים או מיץ תפוזים.
 - השתמש בכל האבקה שבתוכה הכמוסה כדי לקבל את מלאה מנת התרופה.
 - השתמש בכפית כדי לפורר את גושי האבקה.
 - ערביב את האבקה עם המים/היוגורט/מיץ התפוזים עד שמתאפשרת תערובת אחידה.
 - יש לשותות את כל תכולת הкус מיד אחריו הערביב. אין לשמור את התערובת עם היוגורט, המים או מיץ התפוזים.
 - סביר שאחרי שתסתיים שתיתת התרופה ניתן יהה להבחן בציפוי דק על פני הкус.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. **אל תיקח מנה כפולה.**
יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שהוא נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בליידקס טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואאי. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלואאי הבאות:

- האטה בגדייה (גובה ומשקל) בילדים.
- בעיות בזרימת הדם בכלי הדם באכובות הידיים והרגליים (מחלת כלי דם היקפיים, לרבות מחלת ריבנו).
התסמינים עלולים לכלול:
 - תחשות נימול, קור, כאב באכובות הידיים והרגליים.
 - שינוי צבע מהיר יותר לכחול ולאדום באכובות הידיים והרגליים.

Lisdex Teva 30 40 50 60 and 70 mg Capsules Notif 0624

- יש לידע את הרופא המטפל אם אתה או ילך סובלים **מחוסר תחושה, מכאב, משינוי בצבע העור או מרגשיות לטמפרטורה באצבעות הידיים והרגליים.**
- יש לפנות אל הרופא מייד אם אצלך או אצל ילך מופיעים בזמן לקיחת ליסדקס טבע, סימנים של פצעים בלתי מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים.
- טיקים חדשים או החמרה בטיקים או בתסמנת טורט. ספר לרופא אם אתה או ילך סובלים מטיקים חדשים, מהחמרה בטיקים או מהחמרה של تسמנת טורט במהלך הטיפול בלבד טבע.
 - **تسמנות סרטוניין** - בעיה שלולה לסקן חיים ועשיה להתרחש כאשר ליסדקס טבע נלקחת יחד עם תרופות מסוימות. יש להפסיק ליטול ליסדקס טבע ולהתקשר לרופא או לפנות מייד לחדר המיון הקרוב אם אתה או ילך מפתחים אחד מהתסמינים הבאים:
 - חוסר מנוחה, סערת נשף.
 - דופק מהיר.
 - הסמקה.
 - פרכוסים.
 - תרדמת.
 - הזעה.
 - אובדן קואורדינציה.
 - בלבול.
 - סחרחות.
 - רעד, שרירים נוקשים או כיווץ שרירים.
 - הziות (ראייה או שמיעה של דברים שאינם אמיתיים).
 - שינוים בלחץ הדם.
 - טמפרטורת גוף גבוהה (היפרתרמייה).
 - בחילות, הקאות, שלשלולים.

תופעות לוואי שכיחות מודד בילדים בגילאי 6 עד 17 ובמבוגרים עם ADHD (מופיינות ביותר משתמש המשמש אחד מתוך 10):

- אובדן תיאבון (אנורקסיה).
- ירידת בתיאבון.
- שלשלולים.
- חרדה.
- ירידת במשקל.
- סחרחות.
- בחילה.
- הקאות.
- הפרעות שינה.
- יובש בפה.
- עצבנות.
- כאבי בטן עליונה.
- כאב ראש.

תופעות לוואי שכיחות במטופלים עם ADHD (מופיונות ב-10-1 מושתמשים מתוך 100):

- חרדה.
- בחילה.
- היפחתת משקל.
- שלשלולים.
- סחרחות.
- הקאות.
- רעד.
- פריחה.
- שינויי במצב הרוח.
- חום.
- ישוניות או עייפות.
- הרגשות עצבנות, חוסר מנוחה.
- עלייה בלחץ הדם.
- הזעת יתר.
- קשיים בהשגת או בשימור זיקפה.
- ירידת בחשך המין.

- פעולות יתר.
- קצב לב מהיר.
- קשיי נשימה.
- טיקים.
- אנורקסיה.
- יובש בפה.
- דפוקות לב חזקות.
- תוצאות ECG שאינן תקיןות המעידות על Ventricular hypertrophy.
- היפראקטיביות פסיכומוטורית.

תופעות לוואי שאינן שכיחות במטופלים עם ADHD (מופייעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1000):

- דיבור יתר.
- כאב בחזה.
- כאב.
- גרד עור כפיפות.
- כאב ראש.
- דיכאון.
- פרנויה.

توفעות לוائي شقيقות מאוד بمטופלים עם BED (موفيعات بיותר משתמש אחד מתוך 10):

- יובש בפה.
- נזודי שינה.

توفעות לוائي شقيقות بمטופלים עם BED (موفيعات ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- ירידת בתיאבן.
- עלייה בקצב לב.
- עצבנות.
- עיצרות.
- חרדה.
- שלשולים.
- ירידת במשקל.
- הצעת יתר.
- הקאה.
- דלקת בKİבה ובמעיים.
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין).
- גרד.
- כאב בבטן העליונה.
- אנרגיה מוגברת.
- דלקת בדרכי השתן.
- סიוטים, חלום בלחות.
- אי שקט.
- כאב בחלק התיכון של הגרון.

توفעות לוائي שאינן שכיחות بمטופלים עם BED (موفيعات ב-10-1 משתמשים מתוך 1000):

- עלייה בקצב הלב.
- כאב ראש.
- כאב בטן העליונה.
- קשיי נשימה.
- פריחה.
- נזודי שינה.
- תחושת רגישות יתר.
- עצבנות.
- חרדה.

توفעות לוائي נוספת שتحقיכו לנו ידועה:

- דפוקות לב חזקות, קרדיוומיופתיה.

- מידריAzis - הרחבת אישוני העיניים.
- דיפולפיה – ראייה כפולה.
- ראייה מטושטשת או קושי במיקוד הראייה עצמאים.
- דלקת כבד אוזויניפילית – פגיעה בכבד ממוקור אלרגי עם אפשרות להצבתה העיניים ו/או העור.
- תגובה אלרגית חמורה המאפיינת בירידה חדה בלוץ הדם, קושי בנשימה, סרפתת/גירוד.
- רגשות יתר
- תנעות לא רצוניות בלתי מבוקرات.
- תחושת טעם רע בפה.
- טיקים.
- חריקת שניים.
- דייאן.
- גרד עור כפיביתי.
- נשירת שיער.
- תוקפנות.
- תסמנות סטיבנס ג'ונסון.
- כאבים בחזה.
- אנגיוואדמה.
- חרלה (אורטיקרייה).
- פרכוסים.
- שינויים בחשך המיני.
- זקפה תכויה או ממושכת.
- עצירות.
- תמס שריר (רבdomiolיזיס).
- איסכמיה בעיים.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי"عقب טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקן לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

- יש לאחסן באזירה המקורית בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C .

אין להשליך תרופות לשפכים או לפסולת הביתה. שאל את הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate

הרכב הכמוסה:

Gelatin, titanium dioxide

וכן:

yellow iron oxide, red iron oxide - 30 מ"ג -
yellow iron oxide, brilliant blue - 40 מ"ג -

Indigo carmine - 50 מ"ג ו- 60 מ"ג -

yellow iron oxide, red iron oxide, indigo carmine - 70 מ"ג -

הרכב הדין:

Lisdex Teva 30 40 50 60 and 70 mg Capsules Notif 0624

Shellac, dehydrated alcohol, isopropyl alcohol, butyl alcohol, propylene glycol, strong ammonia solution, black iron oxide, potassium hydroxide, purified water

כיצד נראה תרופה ומה תוכן הארץיה:

לייסדקס טבע 30 מ"ג - גוף הרכמה לבן ועליו מודפס בשחור "30". מכסה הרכמה כתום ועליו מודפס בשחור ."TEV"

לייסדקס טבע 40 מ"ג - גוף הרכמה לבן ועליו מודפס בשחור "40". מכסה הרכמה יירוק ועליו מודפס בשחור ."TEV"

לייסדקס טבע 50 מ"ג - גוף הרכמה לבן ועליו מודפס בשחור "50". מכסה הרכמה כחול ועליו מודפס בשחור ."TEV"

לייסדקס טבע 60 מ"ג - גוף הרכמה תכלת ועליו מודפס בשחור "60". מכסה הרכמה תכלת ועליו מודפס בשחור ."TEV"

לייסדקס טבע 70 מ"ג - גוף הרכמה כחול ועליו מודפס בשחור "70". מכסה הרכמה כתום ועליו מודפס בשחור ."TEV"

לייסדקס טבע ארוזה בבקבוקים של 28, 30 ו-100 כמוסות.

יתכן שלא כל חזקי התכשיר /או כל גודלי הארץיות מסווקים.

שם היצרן ובעל הרישום וכתוובתו:

טיבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך ביוני 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

לייסדקס טבע 30 מ"ג - 173-82-37326

לייסדקס טבע 40 מ"ג - 173-83-37327

לייסדקס טבע 50 מ"ג - 173-84-37328

לייסדקס טבע 60 מ"ג - 173-85-37329

לייסדקס טבע 70 מ"ג - 173-86-37330

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.