

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טרםפייה™

مزרק/مزרק עט מוקן לשימוש, 100 מ"ג

כל מזרק או מזרק עט מוקן לשימוש מכילים:
גוסלקומב 100 מ"ג/עט

Guselkumab 100 mg/1 ml

למידע על חומרים בלתי פעילים וآلרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוףו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור את העلون. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

מחלה ספחתית (פסורייזיס)

- טרםפייה מיועדת לטיפול במחלה ספחתית (פסורייזיס) רובדית בדרגת חמורה ביןונית עד קשה במטופלים בוגרים המועמדים לטיפול סיסטמי או פוטותרפיה.

דלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטית)

- טרםפייה, טיפול בוודד או בשילוב עם מטוטרקסט, מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטית) פעילה במטופלים בוגרים בעלי תגובה לא מספקת או חסרי סbilità לטיפול קודם קודם בתרופות המשפיעות על מהלך המחלת (DMARD).

קבוצה רפואיית:

מעכבי אינטראקינים.

כיצד טרמפייה פועלת?

טרםפייה מכילה את החומר הפעיל גוסלקומב שהוא סוג של חלבון הנקרא נוגדן מונוקולוני. התרופה פועלת על ידי חסימת הפעולות של חלבון הנקרא נ-23-לא, אשר נכון ברמות גבוהות באנשים הסובלים מספחת (פסורייזיס) ואנשים הסובלים מדלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטית).

בספחת (פסורייזיס) רובדית - התרופה יכולה לשפר את מצב העור ומראה הציופורניים ולהפחית תסמינים כגון קשחתה, השרת קשキשים, קילופים, גרד, כאב ותחושת שריפה.

בדלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטית) - התרופה יכולה לשפר תסמיניםosiומיים של המחלת, להאט את הנזק לסוחרים ולעצמות של המפרקים ולשפר את יכולת לביצוע פעילות يوم-יומית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לגוסטוקומב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילו התרופה (כמפורט בפרק 6). אם הינך חושב שאתה עלול להיות אלרגי, היועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.
- הינך סובל מziehomus פעיל, לרבות שחפת פעילה.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בטרמפה ספר לרופא אם:

- הינך מטופל בגין זיהום שאתה סובל ממנו.
- הינך סובל מziehomus שאין חולף או שהziehomus שב ו חוזר.
- הינך סובל משחפת או אם הייתה ברגע קרוב עם אדם הסובל משחפת.
- הינך חושב שיש לך זיהום או שהינך סובל מתסמי זיהום (ראה מטה תחת סעיף "שים לב לziehomim ותגובהות אלרגיות").
- קיבלת לאחרונה או שהינך מתכוון לקבל חיסון במהלך הטיפול עם טרמפה.

אם איןך בטוח אם אחד הסעיפים מעלה רלוונטי עבורך, היועץ ברופא, ברוקח או באחות לפני השימוש בתרופה.

על פי החלטת הרופא המתפל, יתכן וצטרך לבצע בדיקות דם על מנת לאתיר רמות גבואה של אנזימי כבד, לפני ובמהלך השימוש בטרמפה. עלייה באנזימי כבד עלולה להופיע בתדריות גבוהה יותר במטופלים המקבלים טרמפה כל 4 שבועות בהשוואה למטופלים המקבלים טרמפה כל 8 שבועות (ראה גם פרק 3 - "كيف تستعمل طرמפה?").

שים לב לziehomim ותגובהות אלרגיות

טרמפה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות הכוללות תגובה אלרגית וziehomim. עלין לעקב אחר סימנים של מצבים אלו בתקופת השימוש בטרמפה.

סימני ziehomim יכולים לכלול חום או תסמינים דמוני שפעת; כאבי שרירים; שיעול; קוצר נשימה; תחושת צריבה/שריפה בעת מתן שתן או מתן שתן בתדריות גבוהה מהרגיל; כאב דמי; ירידת משקל; שלשול או כאב בטן; עור חמימות, אדמדם או כאוב או פצעים על הגוף; שונים ממחלת הספקת (פסוריאזיס).

תגובהות אלרגיות חמורות, שיכולות לכלול את התסמינים הבאים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או האגרון, קושי בבליעה או קשי נשימה וחרילת, נצפו בשימוש עם טרמפה (ראה סעיף "תופעות לוואי חמורות" בפרק 4 "תופעות לוואי").

יש להפסיק את השימוש בטרמפה ולדוח לרופא מיד או לפנות לעזרה רפואי מיידית, אם הינך מבחין בסימנים כלשהם המעידים על תופעות אלרגיות חמורות אפשריות או ziehom.

ילדים ומתבגרים

טרמפה איננה מומלצת לשימוש ילדים בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18, היהת ולא נחקרה בקרב קבוצות גיל אלו.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקת, או אם לך תחושת לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

כמו כן, אם לאחרונה קיבלת חיסון או שהינך עומד לקבל חיסון, יש לידע את הרופא. אין

לקבל חיסונים מסוג מסוים (חיסון חי) בעת הטיפול בטרמפייה.

הרין והנקה

- אין להשתמש בתרופה בהריון היות והשפעת התרופה בנשים בהריון אינה ידועה.
- המליצה לנשים בגין הפריון הינה להמנע מכינסה להריון, ולהשתמש באמצעותם במהלך הטיפול בתרופה ולפחות 12 שבועות לאחר מכן מהנה האחרונה של טרמפייה. שוחחי עם הרופא אם הין בהריון, חושבת שאט עשויה להיות בהריון או מתכנתת הריון.
- שוחחי עם הרופא אם הין מניקה או מתכנתת להניק. את והרופא הגיעו להחלטה האם להניך או להשתמש בטרמפייה.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר כי טרמפייה תשפייע על יכולתך לנוהג ולהפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה סוכרוז. ראה גם פרק 6 - "מידע נוסף".

3. כיצד השתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
באיזה מינון ניתנת התרופה ולאיזה פרק זמן?

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ספחת (פסורייזט) רובידית:

- המינון של התרופה ניתן 100 מ"ג (תכולת מזרק או מזרק עט אחד מוקן לשימוש) הניתנים בהזרקה מתחת לעור. הטיפול ינתן על ידי רופא או אחות.
- המנה השנייה ניתנת 4 שבועות לאחר מתן המנה הראשונה. לאחר מכן, ניתנת מנה כל 8 שבועות.

דלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטיבית):

- המינון של התרופה ניתן 100 מ"ג (תכולת מזרק או מזרק עט אחד מוקן לשימוש) הניתנים בהזרקה מתחת לעור. הטיפול ינתן על ידי רופא או אחות.
 - המנה השנייה ניתנת 4 שבועות לאחר מתן המנה הראשונה. לאחר מכן, ניתנת מנה כל 8 שבועות. בטוטופליים מסוימים, לאחר מתן המנה הראשונה, ניתנת מנה של טרמפייה כל 4 שבועות. הרופא המתפלל יחליט באיזו תדירות תקבל טרמפייה.
- בתחילת הטיפול, הרופא או האחות יזירקו לך את התרופה. עם זאת, יתכן שתחליט יחד עם הרופא שלך כי תוכל להזריק את התרופה עצמאית. במקרה זה, תקבל הדרכה לגבי הדרך הנכונה להזריק טרמפייה. יש לשוחח עם הרופא או האחות במקרה ויש לך אפשרות שאלות הנוגעות להזרקה עצמאית של התרופה. חשוב לא להזריק עצמאית את התרופה עד אשר קיבלת הדרכה מתאימה מרופא או האחות.

لتיאור מפורט של הנחיות השימוש יש לקרוא את סעיף "אופן השימוש" בהמשך.

יש להשתמש בתרופה זו בזמןים קבועים כפי שנקבע על ידי הרופא המתפל. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את

הטיפול בטרמפה ללא הייעוץ עם הרופא.

אם נטלת או קיבלת בטענות מינון גבוהה יותר או שקיבלת את התרפיה מוקדם ממה שהרופא רשם:
צור קשר מיד עם הרופא.

אם בטענות בלע יلد מן התרפיה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרפיה איתך.

אם שכחת ליטול את התרפיה:
צור קשר עם הרופא.

אם הינך מפסיק את הטיפול בתרפיה:
אין להפסיק את הטיפול בתרפיה ללא התייעצות עם הרופא. אם הינך מפסיק את הטיפול, תסמיini המחלה עלולים לחזור.

אין לעבור על המנה המומלצת.
אין ליטול תרופות בחושך! לבדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרפיה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפיה, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפיה, השימוש בטרמפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיית תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות (ሞפיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000)

ספר לרופא או פנה לקבالت עזרה רפואיית מיידית אם מופיעה אחת מתופעות הלואוי הבאות:

תגובהות אלרגיות חמורות אפשריות - הסימנים יכולים לכלול:
- קושי בנשימה או בבליעה.
- נפיחות באזורי הפנים, השפטים, הלשון או הגרון.
- גרד חמוץ בעור, עם פריחה אדומה או בולתת.

תופעות לוואי נוספת

תופעות הלואוי הבאות הין קלות עד בינוניות. אם אחת מתופעות לוואי אלו הופכת לחמורה פנה לרופא, רוקח או אחות מיידית.

תופעות לוואי שכיחות מודר (ሞפיעות ביוטר משתמש אחד מעשרה)

- דיזומים בדרכי הנשימה

תופעות לוואי שכיחות (ሞפיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100)

- כאב ראש
- כאבי מפרקים (ארתרalgיה)
- שלשול
- אדמומיות, גירוי או כאב באטר הזרקה
- עלייה באנדמי כבד בدم

תופעות לוואי שאין שכיחות (ሞפיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000)

- תגובה אלרגית
- פריחה בעור
- ירידה בסוג מסוים של תא דם לבנים הנקראים ניטרופילים
- דיזומ הרופס סימפלקס
- דיזומים פטרייתיים בעור, למשל בין האצבעות (לדוגמא: Athlete's foot)
- דלקת המעי (גסטראנטריטיס)
- חרילת (סרפדת)

אם הופעה תופעת לווואי, אםichert מטופעות הלווואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לווואי שלא הזכרה לעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האזאה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בקירור C $-8^{\circ}C - 2^{\circ}C$. אין להקפיא.
- יש לשמור את המזרק או מזרק עט מוכן לשימוש בקרטון החיצוני על מנת להגן מפני.
- אין לנער.
- אין להשתמש בתרופה אם הימך מבחין כי התמיישה עכורה, שינוי צבעה או שמכילה חלקיקים גדולים.
- לפני השימוש, הוציא את הקרטון מחוץ למקרר. יש להשאיר את המזרק או המזרק עט מוכן לשימוש בתוך הקרטון עד להשגת טמפרטורת חדר על ידי המתנה של 30 דקות.
- תרופה זו מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד. אין להשליך תרופות למי השפכים או לפח האשפה הביתי. היועץ ברוקח כיצד להשליך תרופות שאין בהן צורך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

טרםפייה מכילה את החומר הפעיל גוסלקומב (guselkumab). כאשר מזרק או מזרק עט מוכן לשימוש מכילים 100 מ"ג חומר פועל ב – 1 מ"ל תמיישה.

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, L-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine, Polysorbate 80, Water for injection.

תכולת סוכרוז – 79 מ"ג.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזאה:

טרםפייה הינה נוזל להזרקה צילול וחסר צבע עד גוון צהבהב בהיר. כל קופסה מכילה מזרק או מזרק עט אחד מוכן לשימוש.

יצרן: סילג בע"מ, הוצ'סטרהße 8200-201, שפהאוזן, שווייץ.

בעל הרישום: ג'י-סי הלט' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

160-54-35346

שם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך ביוני 2024.

مبוסס על עלון מדינת ייחוס רפואי מאי 2022.

אוף השימוש:

להלן הוראות שימוש נפרדות עבור מזרק מוקן לשימוש ולאחר מכן מוקן הוראות שימוש נפרדות עבור מזרק עט מוקן לשימוש.

אוף השימוש מזרק מוקן לשימוש טרמפה:

מידע חשוב

במידה ורופאך יחייב כי הינך או מי שמתפל בך יוכל להזריק לך טרמפה בביתך, יהיה עלייך לבצע הדריכה מיד איש צוות רפואי בגין לשימוש נכון, הכנה והזרקה טרמפה באמצעות המזרק המוקן לשימוש (ראה איור 1), לפני שתוכל להזריק את התרפופה בעצמך.

יש לקרוא את הנחיות השימוש במזרק המוקן לשימוש לפני כל הזרקה. יתכן והנחיות יתעדכנו מעט לעת. עלון זה אינו מחליף התייעצות עם הרופא בגין למצוות הרופאי או הטיפול שלך. יש לקרוא את העלון לצרכך של טרמפה בתשומת לב לפני ההזרקה. במידה יש לך שאלות פנה לרופא או לאחות.

טרמפה מזרק מוקן לשימוש מיועד להזרקה תת עורית, **ולא** להזרקה תוך שרירית או הזרקה לווריד. לאחר ההזרקה, המחט תחזיר לגוף המזרק ותינעל למקום.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקסר (2°C - 8°C). אין להקפיא.

יש להרחק מהישג ידם של ילדים.

אין לנער את מזרק טרמפה המוקן לשימוש באף שלב.

יש לשמור את המזרק המוקן לשימוש בקרטון החיצוני על מנת להגן מפני.

חלקי המזרק המוקן לשימוש

לפני השימוש:

ראה איור 2.

לאחר השימוש:

ראה איור 3.

לצורך ההזרקה תזדקק לצידם הבא:

1 מזרק טרמפה מוקן לשימוש

צדוד שאינו נכלל באריזת מזרק טרמפה:

1 ספוגית/מגבון טבול באלכוהול

1 כדור צמר גפן או PD גaza

1 אגד מידבק

1 מכל איסוף לחפצים חדים (ראה שלב 3).

1. הכנה להזרקה

בדיקות הקופסה (ראה איור 4)

הוציא את קופסת מזרק הטרמפה המוקן לשימוש מהמקסר.

יש להשייר את המזרק המוקן לשימוש בתווך הקופסה ולהניח אותו על משטח ישיר בטמפרטורת החדר לפחות **פחות 30 דקות** לפני השימוש.

אין לחמס את המזרק המוקן לשימוש בכל דרך אחרת.

בדוק את תאריך התפוגה ('EXP') שלוגב הקופסה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

במידה ותאריך התפוגה חלף, אין להשתמש במזרק.

אין להשתמש בטרמפה במידה והקופסה אינה שלמה/אינה סגורה היטב.

עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרפופה.

בחירה אתר ההזרקה (ראה איור 5)

- בחר את אחד מהאזורים הבאים להזרקה:
 - קדמת הירך** (מומלץ)
 - אזור הבطن התיכון, למרחוק של **פחות חמישה סנטימטרים** מהטבור.
 - אחוריו החלק העליון של הזרוע (רק במידה אתה מקבל את הזריקה מידי איש צוות רפואי או מטפל).

אין להזריק לעור רגיש, פגוע, אדום, קשקי או קשה.
אין להזריק לאזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

נקוי האזור המיועד להזרקה (ראה איור 6)

שטוף ידיים בסודיות באמצעות סבון ומים חמים.
נגב את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבן עם אלכוהול ואפשר לו להתיבש.
אל תיגע, תיבש או תנשוף על אזור זה, אחרי שניקית אותו.

בדיקה הנוזל שבמזרק (ראה איור 7)

הוצא את המזרק של טרמפה המוקן לשימוש מהקופסה.
בדוק את הנוזל שבמזרק בחילון התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק כולל עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שקופים למראה או לבנים. יתכן ותראה גם בועת אויר אחת או יותר. זהו מצב תקין.
אין להשתמש במידה והנוזל שינה צבעו או עכור או מכיל חלקיקים גדולים. אם איןך בטוח,
עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופת.

2. הזרקת טרמפה באמצעות מזרק מוקן לשימוש

הסרת מכסה המחת (ראה איור 8)

اخוז בגוף המזרק ביד אחת ומשור במכסה המחת החוצה באמצעות היד השנייה. אתה עשו
להבחן בטיפות נזול בקצת המחת - זהו מצב נורמלי.
יש להזריק טרמפה בתוך **5 דקומות מרצע הסרת מכסה המחת**.
אין להחזיר את מכסה המחת, היוט זהה עלול לפגום במחת.
אין לגעת במחת ואין לאפשר מגע של המחת עם משטח כלשהו.
אין להשתמש במזרק המוקן לשימוש במידה והוא נפל. במקרה זה עליך ליצור קשר עם
הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופת.

מייקום האצבועות וחדרת המחת (ראה איור 9)

יש למקם את האגודל, האצבע והאמה **ישירות מתחת לעוגן האצבועות** כפי שניתן לך
בתמונה.
אין לגעת בעוגן האצבועות או באזור שמעליו, היוט והדבר עלול להפעיל את מנגןן הבטיחות
של המחת.
צבות יכולות בידי השנייה את העור באתר ההזרקה. יש למקם את המזרק בזווית של 45
מעלות לעור.
חשוב לצבוט מספיק עור על מנת לאפשר **הזרקה מתחת לעור** ולא לתוך השיר.
החדיר את מחת המזרק בתנועה מהירה.

שחרור הצביעה ומייקום היד (ראה איור 10)

השתמש בידך החופשית על מנת לאחוז בגוף המזרק המוקן לשימוש.

לחיצה על בוכנת המזרק (ראה איור 11)

יש למקם את האגודל של היד השנייה על בוכנת המזרק **וללחוץ עד הסוף** מטה עד לעצירת
הבוכנה.

שחרור האגודל מהבוכנה (ראה איור 12)

מגן הבטיחות יכסה את המחת וינעל במקומות, תוך הוצאת המחת מהעור.

3. לאחר הזרקה

השלכת המזרק המשומש (ראה איור 13)

השלך את המזרק המשומש של טרמפה לתוך מכל המועד לחפצים חדים, מיד לאחר סיום השימוש. עם מילוי המכל יש לרוקנו בהתאם להנחיות שקיבלת על ידי הרופא או האחות.

בדוק את אתר הזרקה (ראה איור 14)

יתכן ותבחן בכמות מזעירות של דם או נזול באזור הזרקה. הנח צמר גפן או פד גaza על אזור הזרקה ולחץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום. אין לשפשף את האזור. במידה הצורך, הדקק אגד מידבק על האזור. **cutת הזרקה הוושלה!**

למידע נוסף פנה לרופא או לרוקח שלך.

אופן השימוש מזרק עט המוקן לשימוש טרמפה:

אבייזר לשימוש חד פעמי

חשיבות

במידה ורופא יחליט כי הינך או מי שמטפל בך יכול להזריק טרמפה בביתך, יהיה עליך לעבור בדרך מידי איש צוות רפואי בגין השימוש בכך, הזרקה טרמפה באמצעות המזרק עט המוקן לשימוש, לפני שתוכל להזריק את התוropaה בעצמך.

יש לקרוא את הנחיות השימוש במזרק עט המוקן לשימוש לפני כל הזרקה. יתכן וההנחיות יתעדכנו מעט לעת. עלון זה אינו מחליף התייעצויות עם הרופא בגין למצויר הרפואי או הטיפול שלך.

יש לקרוא גם את העلون לצרכך של טרמפה בתשומת לב לפני הזרקה. במידה יש לך שאלות פנה לרופא או לאחות.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקסר (2°C - 8°C). אין להקפיא.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין לנער את מזרק עט טרמפה המוקן לשימוש באף שלב.

יש לשמור את המזרק עט המוקן לשימוש בקרטון החיצוני על מנת להגן מאור.

חלקי המזרק עט המוקן לשימוש (ראה איור 15)

הציוויל לוי תזדקק:

1 ספוגית/מגבון טבול באלכוהול

1 כדורים צמר גפן או פד גaza

1 אגד מידבק

1 מכל איסוף לחפצים חדים (ראה שלב 3).

1. הכנה להזרקה

בדיקות הקופסה (ראה איור 16)

הוציא את קופסת מזרק עט המוקן לשימוש הטרמפה מהמקסר.

יש להשאיר את המזרק עט המוקן לשימוש בתוך הקופסה ולהניח אותו על משטח ישר בטמפרטורת החדר לפחות **לפחות 30 דקות** לפני השימוש.

אין לחמס את המזרק עט המוקן לשימוש בכל דרך אחרת.

בדיקות תאריך התפוגה ('EXP') שעלהגב הקופסה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש. במידה ותאריך התפוגה חלף, אין להשתמש במזרק עט.

אין להשתמש בטרמפה במידה והקופסה איננה שלמה/איננה סגורה היטב.

עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שספק לך את התוropaה.

בחירה אתר הזרקה (ראה איור 17)

בחר את אחד מהאזורים הבאים להזרקה:

- קדמת הירך (מולולץ)
- אזור הבطن התיכון. במרקח של **לפחות חמישה סנטימטרים** מהטבור.
- אחורי החלק העליון של החרווע (רק במידה אתה מקבל את הזרקה מיידי איש צוות רפואי או מטפל).
- אין להזריק לעור רגיש, פגוע, אדום, קשקי, קשה או אזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

טיפת ידיים (ראה איור 18)

שטוף ידיים בסודיות באמצעות סבון ומים חמים.

ניקוי האזור המיועד להזרקה

נגב את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבון עם אלכוהול ואפשר לו להתיבש. אל תיגע, תיבש או תנשוף על אזור זה, אחרי שניקית אותו.

בדיקה הנוזל שבמזרק עט (ראה איור 19)

הוציא את המזרק עט המוקן לשימוש של טרמפהיה מהקופסה. בדוק את הנוזל שבמזרק עט בחולון התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק עט צלול עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שkopים או לבנים. יתכן ותראה גם בועת אוויר אחת או יותר. זהו מצב תקין.

אין להשתמש במידה והנוזל שינה צבעו או עכוור או מכיל חלקיקים גדולים. אם אין בטוח, עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

2. הזרקת טרמפהיה באמצעות מזרק עט מוקן לשימוש

סובב והסר את המכסה (ראה איור 20)

הרחק את ידיים מגן המחת לאחר הסרת המכסה.

יש להזריק טרמפהיה בתוך 5 דקומות מרצע הסרת המכסה.

אין להחזיר את המכסה, היות זהה עלול לפגום במחת.

אין להשתמש במזרק עט המוקן לשימוש במידה והוא נפל לאחר הסרת המכסה.

במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופה.

מיקום המזרק עט על העור (ראה איור 21)

יש למקם את המזרק עט המוקן לשימוש ישירות על העור (בזווית של כ-90 מעלות לאזור ההזרקה).

לחץ על ידיית המזרק עט מטה (ראה איור 22)

התרופה מזרקת בזמן הלחיצה מטה. בצע את הלחיצה במהלך הנוחה לך. אין להרים את המזרק עט המוקן לשימוש בזמן הלחיצה, מגן המחת יונע ולא יתקבל המינון המלא.

השלמת ההזרקה (ראה איור 23)

הזרקה הושלמה ברגע שהידית נלחזה עד הסוף מטה, נשמע צליל "קליק" והגוף הירוק איננו נראה לעין.

הרם את המזרק עט כלפי מעלה (ראה איור 24)

הפס הצהוב מעיד על כך שהagnet המחת נעל.

3. לאחר ההזרקה

השלכת המזרק עט המשומש (ראה אIOR 25)

השלך את המזרק עט המשומש של טרמפייה לתוך מכל המיועד לחפצים חדים מיד לאחר השימוש.

עם מילוי המכל יש לרוקנו בהתאם להנחיות שקיבלת על ידי הרופא או האחות.

בדוק את אתר ההזרקה (ראה אIOR 26)

יתכן ותבחן בכמות מזעירות של דם או נוזל באזור ההזרקה. הנח צמר גפן או פד גaza על אזור ההזרקה ולחץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום. אין לשפשף את האзор. במידת הצורך, הדבק אגד מידבק על האзор.

cutת ההזרקה הושלמה!

למידע נוסף פנה לרופא או לרוקח שלך.

1







