

## עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

שם התרופה, צורתה והחזקה

**רמייקד™**

**100 מ"ג אבקה להכנת תמייסה מומczת לתמיסת עירוי  
חומר פعال וכמותו: כל בקבוקון מכיל 100 מ"ג אינפליקסימאב  
איןפליקסימאב, 100 מ"ג**

**Infliximab 100 mg**

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 " מידע נוספת".

**קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלת. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעalon, לתכשיר רמייקד קיים כרטיס תזכורת למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעילך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול ברמייקד ולפיעול על פיו. יש לעיין בכרטיס התזכורת למטופל ובעלון לצריכן לפני השימוש בתכשיר. יש לשמור את הcartis לעיון נוספת במידת הצורך.

**עבור מבוגרים:**  
لتשומת ליבך, משרד הבריאות אישר החלפה חד-פעמית בין תרופה מקור לבין תרופה ביו-סימילאר ולהיפר.  
הרופא יספק לך הסבר אודוט התרופה ומשמעות החלפה. כל החלפה בתרופה ביולוגית חייבות להתבצע על-ידי הרופא המטפל. השם המסחרי של התרופה המופיע במרשם צריך להיות זהה לשם המסחרי המופיע על אריזת התרופה שסופקה לך בבית המרקחת. במקרה של ספק, יש לפנות לרוקח או לרופא המטפל.

**עבור ילדים:**  
لتשומת ליבך, חשוב שבעל פעם שאתה מקבל את התרופה בבית המרקחת, תזודא שאתה מקבל את אותה התרופה שרשם לך הרופא המומחה המטפל בך. אם התרופה שקיבלת נראית שונה מזו שאתה מקבל בדרך כלל או שהנחיות השימוש השתנו, אנא פנה מיד לרוקח לוודא שקיבלת את התרופה הנכונה. כל החלפה או שינוי מינון של תרופה המכילה איןפליקסימאב (החומר הפעיל בתרופה) חייבות להתבצע אך ורק על-ידי הרופא המומחה המטפל.  
אנא בדוק כי שמו המסחרי של התכשיר שרשם לך הרופא המומחה במרשם, הינו זהה לשם התרופה שקיבלת מהרוקח.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

**מחלה קרונית במבוגרים (Crohn's disease):**

טיפול במחלת קרונית פעילה, בדרגת חמירה בינונית עד חמורה, בחולים אשר לא הגיעו

טיפול מלא ומתאים בקורטיקוסטרואידים ו/או מדכאי מערכת החיסון. טיפול במחלת קrhohn פיסטולית (Fistulizing Crohn's disease), בחולים אשר לא הגיעו לטיפול קונבנציונלי מלא וمتאים.

#### **מחלה קrhohn בילדים:**

טיפול במחלת קrhohn בדרגה חמורה בילדים בני 17-6 אשר לא הגיעו לטיפול קונבנציונלי הכלול קורטיקוסטרואידים, אימונומודולטורים, וטיפול תזוני ראשון, או שאינם יכולים לסבול או שיש להם התווית נגד טיפולים אלו. רמייק נבדקה רק בשילוב עם טיפול אימונוסופרסיביKonvenzionieli.

#### **דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing spondylitis):**

טיפול בדלקת חוליות מקשחת בחולים שיש להם סימנים אקסיאליים חמורים, רמה מוגברת של סימנים לפעילות דלקתית ואשר לא הגיעו באופן מספק לטיפול Konvenzionieli.

#### **דלקת מפרקים ספחתיות (Psoriatic arthritis):**

טיפול בדלקת מפרקים ספחתיות פעילה ומתקדמת במובגרים אשר התגבה לטיפול קודם (Disease-modifying antirheumatic drugs) DMARDs לא הייתה מספקת. רמייק ניתנת בשילוב עם מתוטרקסאט או בלבד בחולים שאינם יכולים לסבול מתוטרקסאט או שיש להם התווית נגד המתוטרקסאט. רמייק שיפרה את התפקיד הфизי בחולים עם דלקת מפרקים ספחתיות והורידה את קצב התקדמות הנזק ההיקפי למפרקים, אשר נמדד בצלום רנטגן בחולים עם תת-סוג מחלת פוליארטיריקולרית סימטרית.

#### **דלקת מפרקים שగונית (Rheumatoid arthritis):**

רמייק, בשילוב עם מתוטרקסאט, מיועדת להורדת הסימנים והתסמינים ולשיפור התפקיד הфизי בחולים עם מחלת פגילה, אשר לא הגיעו באופן מספק ל-DMARDs כולל מתוטרקסאט. בחולים במחלת מתקדמת, פגילה וחומרה אשר לא טופלו קודם לכן במटוטרקסאט או ב-DMARDs אחרים, הودגמה ירידיה בקצב התקדמות הנזק למפרקים, אשר נמדד בצלום רנטגן בצלום רנטגן באוכלוסיות אלו.

#### **פסוריאזה (Psoriasis):**

טיפול במחלת פסוריאזה רובדיות בדרגת חמורה ביןונית עד חמורה במובגרים אשר טיפול סיסטמי אחר, בכלל זה ציקלוספורין, מתוטרקסאט או PUVA, נכשל או שיש להם אי סבירות או התווית נגד טיפולים אלו.

#### **דלקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative colitis):**

טיפול במחלת פגילה בדרגת ביןונית עד חמורה בחולים בקוליטיס כיבית אשר לא הגיעו באופן מספק, או שיש להם אי סבירות או התווית נגד לטיפול Konvenzionieli כולל קורטיקוסטרואידים, MP-6, או AZA.

#### **דלקת כיבית של המעי הגס בילדים:**

טיפול במחלת פגילה בדרגה חמורה בילדים בקוליטיס כיבית בני 17-6 שנים, אשר לא הגיעו באופן מספק, או שיש להם אי סבירות או התווית נגד לטיפול Konvenzionieli כולל קורטיקוסטרואידים, MP-6, או AZA.

החומר הפעיל אינפליקסימאב שירק לקבוצת מדכאי המערכת החיסונית, חוסמי TNF ATC code: L04AB02

**קבוצה תרפואית:** רמייק מכילה את החומר הפעיל אינפליקסימאב. אינפליקסימאב הוא נוגדן חד שנתי, סוג של חלבון אשר נקשר למטרה ספציפית בגוף, הנקראת α-TNF

. (Tumour necrosis factor)

רמייקד פועלת באמצעות קישור סלקטיבי ל- $\alpha$ -TNF וחסימת פועלתו.  $\alpha$ -TNF מעורב בתהליכי דלקתיים בגוף כך שהסימנו גורמת להפחית הדלקת בגוף.

#### **דלקת מפרקים שగרונית - (Rheumatoid arthritis)**

דלקת מפרקים שగרונית היאמחלה דלקטיבית של המפרקים. אם הינך סובל מדלקת מפרקים שగרונית פעילה, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד, בשילוב עם תרופה נוספת הנקרה מתוטרקסאט כדי:

- להפחית את סימני ותסמיני המחלה.
- להאט את הנזק למפרקים.
- לשפר את התפקיד הפיזי.

#### **דלקת מפרקים ספחתית - (Psoriatic arthritis)**

דלקת מפרקים ספחתית היאמחלה דלקטיבית של המפרקים המלווה בדרך כלל בפסוריוזיס. אם הינך סובל מדלקת מפרקים ספחתית פעילה, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי:

- להפחית את סימני ותסמיני המחלה.
- להאט את הנזק למפרקים.
- לשפר את התפקיד הפיזי.

#### **דלקת חוליות מקשחת - (Ankylosing spondylitis)**

דלקת חוליות מקשחת היאמחלה דלקטיבית של עמוד השדרה. אם הינך סובל מדלקת חוליות מקשחת, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי:

- להפחית את סימני ותסמיני המחלה.
- לשפר את התפקיד הפיזי.

#### **ספרחת (Psoriasis)**

ספרחת היאמחלה דלקטיבית של העור. אם הינך סובל מספחת בדרגה בינונית עד חמורה, תטופל קודם בתרופות אחרות או בטיפול כמו פוטותרפיה. אם תרופות או טיפולים אלו לא יפעלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי להפחית את סימני ותסמיני המחלה.

#### **דלקת כיבית של המעי הגס - (Ulcerative colitis)**

דלקת כיבית של המעי הגס היאמחלה דלקטיבית של המעיים. אם הינך סובל מדלקת כיבית של המעי הגס, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי לטפל במחלת.

#### **מחלה קרונה - (Crohn's disease)**

מחלה קרונה היאמחלה דלקטיבית של המעיים. אם הינך סובל ממחלת קרונה, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי:

- לטפל במחלת קרונה פעילה.
- להפחית את מספר הפיסותולוגיות בין המעיים לעור, אשר לא לטפל בהצלחה באמצעות תרופות אחרות או ניתוח.

## **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לאינפליקסימאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה

- התרופה. לרשימת המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- אתה אלרגי לחלבונים ממוקור עכברי.
  - אתה סובל משחפת אוழום חמוץ אחר, כגון דלקת ריאות או אלח דם (ספסיס).
  - אתה סובל מאי ספיקת לב בגיןית עד חמורה.
- אין להשתמש ברמייקד אם אתה סובל מאחד מהמצבים המפורטים לעלה. אם אין לך בטוח, פנה לרופא לפני שאתה מקבל רמייקד.

**ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**  
לפני הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם היןך סובל מהמצבים הבאים:

#### טופלת ברמייקד בעבר

ספר לרופא אם קיבלת בעבר טיפול ברמייקד וכעת אתה מתחליל שוב טיפול ברמייקד. אם הייתה הפסקה של 16 שבועות או יותר בטיפול ברמייקד, ישנו סיכון גבוה יותר לתגובהות אלרגיות כשתחילה את הטיפול שוב.

#### זיהומיים

- טרם התחלת הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אתה סובלழום כלשהו, גם אם זהו זיהום קל מאוד.
  - טרם התחלת הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אי פעם גרת או טילית באזור בו הזיהומיים הבאים נפוצים: היסטופלאזומוזיס (Histoplasmosis), קוקסידיוודומיקוזיס (Blastomycosis) או בלסטומיקוזיס (Coccidioidomycosis) או זיהומיים אלה נגרמים על-ידי סוגים ספציפיים של פטריות אשר עלולות להזיק לריאות או לאיברים אחרים בגוף.
  - אתה עלול לסבול ביתר קלות זיהומיים בתקופת הטיפול עם רמייקד. אם היןך בן 65 שנים או יותר, היןך בסיכון גבוה יותר.
  - זיהומיים אלו עלולים להיות חמורים וכוללים שחפת, זיהומיים הנגרמים על ידי וירוסים, פטריות, חיידקים, או ארגניזמים אחרים שבسبיבת אלח דם (sepsis) אשר עלולים להיות מסכני חיים.
- דווח מיד לרופא אם אתה סובל מסימני זיהום במהלך הטיפול עם רמייקד. הסימנים כוללים חום, שיעול, סימנים דموי שפעת, הרגשה כללית רעה, עור אדום או חם, פצעים או בעיות שנייניות. ייתכן שהרופא ימליץ על הפסקה זמנית לטיפול ברמייקד.

#### שחפת

- חשוב מאד שתספר לרופא אם חלית אי פעם בשחפת או אם הייתה ב打仗 עם מישחו שחולה או שחלה בעבר בשחפת.
  - הרופא יבודק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת. מקרי שחפת דווחו במקרים רבים שטופלו ברמייקד, אףלו בחולים שכבר לטפלו תרופתיות נגד שחפת. הרופא יתעד את תוצאות הבדיקות בכרטיס התזוכרת למטופל שברשותך.
  - אם הרופא חושש שאתה נמצא בסיכון לחילות בשחפת, ייתכן שתטיפול בתרופות נגד שחפת לפני שאתה משתמש ברמייקד.
- דווח מיד לרופא אם מופיעים סימנים של שחפת במהלך הטיפול ברמייקד. סימנים אלו כוללים שיעול מתמשך, ירידה במשקל, עייפות, חום, הצעות לילה.

#### נגיף צהבת נגיפית מסווג B (הפטיטיס B)

- טרם התחלת הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אתה נשא של הפטיטיס B או שהיה בעבר.

- ספר לרופא אם אתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון להדק במחלה נגיפית מסווג B.
- הרופא אמר או בודק אותך להימצאות שלמחלה נגיפית מסווג B.
- הטיפול בחוסמי TNF דוגמת רמייקד עלול לגרום להתרכזות מחודשת שלמחלה נגיפית מסווג B במטופלים הנושאים נגיף זה, ועלול להיות מסכן חיים במקרים מסוימים.

#### **בעיות לב**

- ספר לרופא אם הינך סובל מבעיות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב קלה.
  - הרופא ירצה לעקוב באופן קפדיי אחר תפקוד הלב שלך.
- דווח מיד לרופא אם הינך חווה תסמינים חדשים או החמרה בתסמינים קיימים של אי ספיקת לב במהלך הטיפול ברמייקד. תסמינים אלו כוללים קוצר נשימה או נפיחות ברגליים.

#### **سرطان וליימפומה**

- לפני תחילת הטיפול ברמייקד, ספר לרופאך אם הינך חולה או שאית פעם חלית בליימפומה (סוג של סרטן דם) או בכל סוג אחר של סרטן.
- מטופלים החולים בדלקת מפרקים שగורנית חמורה, וסובלים מהמחלה מזה זמן רב, עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח ליימפומה.
- ילדים ובוגרים המטופלים ברמייקד עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח ליימפומה או סרטן מסווג אחר.
- חולים מסוימים אשר טיפולו בחוסמי TNF כולל רמייקד פיתחו סוג נדיר של סרטן הנקרוא Hepatosplenic T-cell lymphoma או גברים צעירים ולרובם הייתה מחלת קrhohn או דלקת כיבית של המעי האס. סרטן מסוג זה בדרך כלל הסתיים במות. כמעט כל החולים נטלו גם תרופות המכילות Azathioprine או mercaptopurine-6-בנוסף לחוסמי-h-TNF.
- חולים מסוימים אשר טיפולו באינפליקסימאב, פיתחו סוגים מסוימים של סרטן העור. אם הינך מבחין בשינויים בעור שלך או בגידולים על העור במהלך או לאחר הטיפול ברמייקד, דווח לרופא.
- נשים מסוימות אשר טיפולו ברמייקד לדלקת מפרקים שగורנית פיתחו סרטן צוואר הרחם. בנשים המטופלות ברמייקד, כולל נשים מעל גיל 60 שנים, ייתכן שהרופא ימליץ להיבדק בקביעות לסרטן צוואר הרחם.

#### **מחלות ריאה או עישון כבד**

- לפני תחילת הטיפול ברמייקד, ספר לרופאך אם אתה סובל ממחלת ריאות הנקרואת מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) או אם אתה מעשן כבד.
- חולים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית וחולים שהם מעשנים כבדים, עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח סרטן במהלך הטיפול ברמייקד.

#### **מחלות של מערכת העצבים**

- ספר לרופאך אם הינך סובל או סבלת בעבר מבעיות המשפיעות על מערכת העצבים לפני תחילת הטיפול עם רמייקד. בעיות אלה כוללות טרשת נפוצה, תסמונת גיליאן-ברה, אם הינך סובל מפרכויסים או שאובחנה דלקת בעצב הראייה.
- דווח מיד לרופא אם הינך מפתח תסמינים של מחלת עצבים במהלך הטיפול ברמייקד. התסמינים כוללים שינויים בראייה, חולשה בזרועות או ברגליים, חוסר תחושה או עקצוץ בכל אחד מחלקי הגוף.

#### **פתחים חריגיים בעור (פיסטולות)**

- דווח לרופא אם הינך סובל מפתחים חריגיים בעור (פיסטולות) לפני תחילת הטיפול

ברמייקד.

### חיסונים

- ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או שעלייך לקבל חיסון.
- לפני התחלת הטיפול ברמייקד, עליך לקבל חיסונים מומלצים. אתה יכול לקבל חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמייקד, אולם אין לך לקבל חיסונים חיים (חיסונים אשר מכילים גורם מזוהם חי אך מוחלש) בזמן הטיפול ברמייקד, מכיוון שהם יכולים לגרום לziehom.
- אם קיבלת רמייקד במהלך היריון, גם תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בziehom כתוצאה של קבלת חיסון חי BCG (Bacillus Calmette-Guérin) במהלך שנות החיים הראשונה וכל החיסונים האחרים במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר הלידה. חשוב שתספר לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים שהשתמשה ברמייקד במהלך היריון כדי שיוכלו להחליט מתי לתת לתינוק חיסון כלשהו, כולל חיסונים חיים כגון חיסון-h BCG (משמש למניעת שחפת).
- למידע נוספת ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות".

### טיפול בגורם טיפול העשויל לגרום לziehom

- ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או אם נקבע לך טיפול בגורם טיפול העשויל לגרום לziehom (כגון החדרת BCG לטיפול בסרטן).

### ניתוחים או הליכים דנטליים

- ספר לרופא אם אתה עומד לעבור ניתוח או הליך דנטלי כלשהו.
- ספר למתנה או לרופא השני שאתה מטופל ברמייקד והציג את "כרטיס התזורת למטופל" שלו.

### בעיות בכבד

- חולמים מסוימים המקבלים רמייקד פיתחו בעיות כבד חמורות. ספר מיד לרופא אם הבחנת בתסמינים של בעיות בכבד במהלך הטיפול ברמייקד. תסמינים הכלולים בחבתת העור והעינויים, שタン בצביע חום כהה, כאבים או נפיחות מצד הימני העליון של אזור הבطن, כאבים במפרקים, פריחה בעור או חום.

### ספירת דם נמוכה

- בחולמים מסוימים המקבלים רמייקד, הגוף עלול לא לייצר מספיק תאי דם שעוזרים להילחם בziehomים או שעוזרים לעצור דימום. ספר מיד לרופא אם יש לך תסמינים של ספירת דם נמוכה במהלך הטיפול ברמייקד. סימנים הכלולים חום שאינו עובר, דימום, נתיחה לחבורות ביתר קלות, כתמים קטנים אדומים או סגולים הנגרמים מדימום תחת העור או מראה חיוך.

### הפרעה במערכת החיסון

- חולמים מסוימים המטופלים ברמייקד פיתחו תסמינים של הפרעה במערכת החיסון הנקראת לופוס. ספר מיד לרופא אם פיתחת תסמינים של לופוס במהלך הטיפול ברמייקד. סימנים הכלולים כאב במפרק או פריחה בלחיים או בזרועות שרגישה לשמש.

### ילדים ומתבגרים

- המידע מעלה מתיחס גם לילדים ומתבגרים. בנוסף:
- חלק מהילדים וממתבגרים המטופלים שקיבלו חוסמי TNF כגון רמייקד פיתחו סרטן,

כולל סוגים חריגיים, אשר לעתים הביאו למות.

- בהשוואה למבוגרים, יותר ילדים המטופלים ברמייקד פיתחו זיהומיים.
- יש לחתת לילדים חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמייקד.

ניתן לחתת לילדים חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמייקד, אך הם אינם יכולים לקבל חיסון חי במהלך הטיפול.

אם איןך בטוח אם אחד או יותר מהמתואר מעלה חל עלייך, שוחח עם הרופא לפני השימוש ברמייקד.

#### **איןטראקטזיות/תגובה בין תרופתיות**

חולמים במחלה דלקטיבית כבר נוטלים תרופות לטיפול בעוריותיהם. התרופות הללו עלולות לגרום לתופעות לוואי. הרופא שלך ייעץ לך באילו תרופות אחרות עליך להמשיך לשימוש במהלך הטיפול ברמייקד.

אם אתה לוקח או אם לוקח **לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות אחרות שהינך משתמש בהן או שהשתמש לאחרונה לטיפול במהלך קרויון (Crohn's disease) ובדלקת כיבית של המעי האgs (Ulcerative colitis), בדלקת מפרקים (Ankylosing spondylitis), בדלקת חוליות מקשחת (Rheumatoid arthritis) או בספקת (Psoriasis) או טיפול רפואי ספחתית (Psoriatic arthritis), או טיפול רפואי שנייתנות ללא מרשם רפואי, כגון ויטמינים וצמחי מרפא.

במיוחד ספר לרופא אם אתה משתמש באחת מהתרופות הבאות:

- **תרופות המשפיעות על מערכת החיסון.**
- **קינרט (אנקינריה).** אין להשתמש ברמייקד יחד עם קינרט.
- **אורנסיה (אבטספט).** אין להשתמש ברמייקד יחד עם אורנסיה.

אין לקבל חיסונים חיים בזמן הטיפול ברמייקד. אם השתמשת ברמייקד במהלך ההיריון, ידעי את הרופא של התינוק או אנשי צוות רפואי אחרים המטפלים בתינוקך כי השתמשת ברמייקד לפני שהתינוק מקבל חיסון כלשהו.

אם איןך בטוח אם כתוב מעלה נוגע לך, היועץ לרופא או ברוקח לפני השימוש ברמייקד.

#### **היריון, הנקה ופוריות**

• יש להיוועץ ברופא לפני השימוש ברמייקד אם את בהיריון, מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכוננת להיכנס להיריון. ניתן להשתמש ברמייקד במהלך היריון או הנקה רק אם הרופא חושב כי זה הכרחי עבורך.

• יש להימנע מהיכנס להיריון במהלך השימוש ברמייקד ובמהלך 6 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. היועצץ ברופא לגבי שימוש באמצעות מניעה במהלך תקופה זו.

• אם קיבלת רמייקד במהלך היריון, תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בזיהום.

• חשוב שתספר לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים על השימוש שלך ברמייקד במהלך ההיריון, לפני שתינוקך מקבל כל חיסון. אם קיבלת רמייקד במהלך היריון, מתן חיסון BCG (הניתן למניעת שחפת) לתינוקך תוך 12 חודשים מהlidah עלול לגרום לזיתיהם עם סיבוכים חמוריים, כולל מוות. אין לתת חיסון חי BCG לתינוקך במשך 12 חודשים מהlidah, ואין לתת את כל החיסונים החיים האחרים במהלך 6 החודשים הראשונים מהlidah, אלא אם הרופא של תינוקך ממליץ אחרת. למידע נוספת ראה סעיף "חיסונים".

• ורידת חמורה במספר תאדי הדם הלבנים דוחה בתינוקות שנולדו לנשים שטופלו ברמייקד

במהלך ההירון. אם תינוקר סובל מחום מתמשך או מזיהומים מתמשכים, יש לפנות מיד לרופא המתפל בתינוקר.

#### **נהייה ו שימוש במכונות**

לא סביר כי רמייקד תשפיע על היכולת לנוהג, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות. אם אתה חש עייף, מסוחרר או חש לא טוב לאחר קבלת הטיפול ברמייקד, אל תנהג, אל תשתמש בכלים ואל תפעיל מכונות.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התroxפה**

רמייקד מכילה פחתה מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לעומת, ככלומר היא נחשבת למעשה "נטולת נתרן". למורות זאת, לפני שרמייקד ניתנת לך, היא מעורבתת בתמיסה אשר מכילה נתרן. היועץ ברופא אם אתה בדיאטה דלת נתרן.

### **3. כיצד תשתמש בתroxפה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- רמייקד ניתנת לך על-ידי רופא או אחיות.
- הרופא או האחות יכינו את התroxפה לעירוי.
- התמיסה ניתנת עירוי (מעל שעתיים) לאחד ההורידים שלך, בדרך כלל לצרוע. לאחר הטיפול השלישי הרופא עשוי להחליט לחת את מנת הרמייקד מעל שעה.
- עליך להשאר להשגחה רפואית במהלך מנת רמייקד ולמשך שעה עד שעתיים לאחר מכן.
- הרופא יקבע את המינון ותדירות הטיפול. הדבר יהיה תלוי במחלת, במשקל ובתגובה לרמייקד.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין לבלווע.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתroxפה ללא התיעצות עם הרופא.

#### **שימוש בילדים:**

ניתן לחת רמייקד לילדים לטיפול במחלת קrhoון ובדלקת כיבית של המעי הגס בלבד. על הילדים להיות בני 6 שנים או יותר.

#### **אם קיבלה מינון גבוהה מדי של רמייקד:**

אחר שהroxפה ניתנת לך על-ידי אחיות או רופא, אין זה סביר שתתקבל מינון גבוהה מדי שלroxפה. לא ידועות תופעות לוואי הקשורות במתן גובה מדי של רמייקד.

#### **אם שכחת או פספסת מנתן רמייקד:**

אם שכחת או פספסת את מנתןroxפה במועד שנקבע, קבע תור חדש במהירות האפשרית.

אין ליטולroxפות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעע** שהינך נוטלroxפה. הרכב משקפיים אם הינך זקור להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימושroxפה, היועץ ברופא או הרוקח.

### **4. תופעות לוואי**

כמו בכלroxפה, השימוש ברמייקד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מכך אחד מהן. רוב תופעות הלוואי קלות עד בינויות. מטופלים מסוימים עלולים לסבול מהתופעות לוואי חמורות

ועלולים להזדקק לטיפול. תופעות לוואי עשוות להופיע גם לאחר הפסקת הטיפול עם רמייקד.

**יש לפנות מיד לרופא אם הבנתה באחד מה הבאים:**

- **סימנים של תגובה אלרגית:** כגון התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה או הארון, העוללה לגרום לבלייה או בנשימה, פריחה בעור, סרפתת, התנפחות של הידיים, הרגליים או הקרסולים. חלק מתגובה אלו עלולות להיות חמורות או מסכנות חיים. תגובה אלרגית יכולה להתרכש תוך שעתים מקבלת הזריקה או מאוחר יותר. תסמינים נוספים של תגובה אלרגית העוללה להתרכש עד 12 ימים לאחר קבלת הזריקה כוללים כאב שרירים, חום, כאב בלסת או במפרקים, כאב גרון או כאב ראש.
- **סימנים של בעיות לב:** כגון אי-נוחות או כאב בחזה, כאב באזור, כאבי בטן, קצר נשימה, חרדה, תחושת סחרור, סחרחות, עילפון, הזעה, בחילה, הקאה, תחושת פרפורים או דפוקות בחזה, דופק מהיר או איטי ונפיחות בכפות הרגליים.
- **סימנים של זיהום (כולל שחפת):** כגון חום, עייפות, שיעול אשר עלול להיות מתמשך, קצר נשימה, תסמינים דמווי שפעת, ירידה במשקל, הזעותليلת, שלשול, פצעים, הצטברות של מוגלה במעיים או סביב פי הטבעת (אבץ), בעיות בשיניים או תחושת צריבה בזמן מתן שתן.
- **סימנים אפשריים של סרטן:** הכוללים, אך לא מוגבלים, להtanפחות של בלוטות לימפה, ירידה במשקל, חום, גושים חריגים על גבי העור, שינויים בשומות או בצבע העור, דימום נרתיקי שאינו רגיל.
- **סימנים של בעיות בבריאות:** כגון שיעול, קשיי נשימה או לחץ בחזה.
- **סימנים של בעיות במערכות העצבים (כולל בעיות בעיניים):** כגון סימנים של שbez (חוسر תחושה או חולשה פתאומיים בפנים, בזרוע או ברג'ן בצד אחד של הגוף, בלבול פתאומי, קושי בדיבור או בהבנה, קושי בראייה בעין אחת או בשתי העיניים, קושי בהליכה, סחרחות, אובדן שיווי משקל או קווארדינציה או כאב ראש חמור), פרוכוסים, עקצוץ/חוسر תחושה בחלקי גוף שונים או חולשה בזרועות או ברגליים, שינויים בראייה כגון ראייה כפולה או בעיות עיניים אחרות.
- **סימנים של בעיות בכבד (כולל זיהום בהפטיטיס B כשהיא לך הפטיטיס B בעבר):** כגון הצבת העור או העיניים, שתן בצבע חום כהה, כאב או נפיחות בצד הימני העליון של אזור הבطن, כאב במפרק, פריחה בעור או חום.
- **סימנים של הפרעה במערכת החיסונית:** כגון כאב במפרק או פריחה רגילה לשימוש על הלחיים או הזרועות (לופוס - זבת) או שיעול, קצר נשימה, חום או פריחה בעור (סרקואידוזיס).
- **סימנים של ספירתدم נמוכה:** כגון חום מתמשך, דימום או פציעה ביתר קלות, כתמים אדומניים או סגולים הנגרמים מדימום תחת העור או מראה חיוך.
- **סימנים לבעיות עור חמורות:** כגון כתמים אדמדמים דמווי מטרה או כתמים עגולים לעתים קרובות עם שלפוחיות במרכזן, בפלג גוף עליון, אзорים נרחבים של התקלפות עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין וב uninאים או בליטות קטנות מלאות מוגלה שכוכלות להתפשט בגוף. תגובות עוריות אלו יכולות להוות מלאות בחום.

ספר לרופא מיד אם אתה מב Hin באת מההתופעות המפורטות מעלה.

תופעות לוואי הבאות נצפו עם רמייקד:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - יכולות להופיע אצל יותר מאשר מאתן עשרה משתמשים:**

- כאב בטן, בחילה
- זיהום ויראלי, כגון הרפס או שפעת
- זיהומיים בדרכי הנשימה העליונות, כגון סינוסיטיס
- כאב ראש
- תופעות לוואי כתוצאה מהעירורי
- כאב

**תופעות לוואי שכיחות (common) - יכולות להופיע אצל עד אחד מתוך עשרה משתמשים:**

- שינויים בתפקוד הכבד, עליה באণימי הכבד (מאובחן בבדיקה דם)
- זיהום ריאות או חזה, כגון דלקת של הסמפניות (ברונכיטיס) או דלקת ריאות קושי בנשימה או כאבים בנשימה, כאב בחזה
- דימום בבטן או בעור, שלשול, בעיות עיכול, צרבת, עצירות סרפה, פריחה מגרדת או עור יבש בעיות בשינוי המשקל או תחושת סחרחות חום, האעה מוגברת בעיות בזרימת הדם, כגון לחץ דם נמוך או גבוה
- חברות, גלי חום או דימום מן האף, עור חם ואדום (הסמקה)
- תחושת עייפות או חולשה
- זיהום חידקי, כגון אלח דם, אבצס או זיהום של העור (צלוליטיס)
- זיהום בעור כתוצאה מפטריות בעיות בדם, כגון אנמיה או ספירה נמוכה של תאים דם לבנים נפיחות של בלוטות הלימפה
- דייאון, בעיותamina, כולל עיניים אדומות וziehomiים בעיות בעיניים, כולל עיניים אדומות וziehomiים
- קצב לב מהיר (טאכיקרדיה) או דפיקות לב כאב במפרקים, בשירים או בגב
- זיהום בדרכי השתן
- ספחת (פסורייזיס), בעיות בעור, כגון אקזמה ונשירת שיער
- תגבותה במקום ההזרקה, כגון כאב, נפיחות, אדומות או גרד צמרמות, הצלברות נואלים מתחת לעור הגורמת לנפיחות
- חוסר תחושה או תחושת עקצוץ

**תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) - יכולות להופיע אצל עד אחד מתוך 100 משתמשים:**

- מחסור באספект דם, נפיחות ורידים
- הצלברות דם מהווץ לכלי הדם (המטומה) או חברות בעיות בעור כמו שלפוחיות, יבלות, צבע עור חריג או פיגמנטציה, או נפיחות בשפתיים או התעבותה של העור, או עור אדום עם קשחת וקילופים
- תגבות אלרגיות חמורות (אנפילקסיס), הפרעה במערכת החיסונית הנקראט זابت (לופוס), תגבה אלרגית לחלבוניים זרים
- זמן רפואי ממושך יותר של פצעים
- התנפחות של הכבד (הפטיטיס) או כיס המרה, נזק לכבד
- פיזור דעת, רגונות, בלבול, עצבנות בעיות עיניים היכולות לטשטוש ראייה או ירידיה בראיה, נפיחות בעיניים או שעורה

- אי ספיקת לב חדשה או החמרה של אי ספיקת לב קיימת, קצב לב איטי
- התעלפות
- פרוכוסים, בעיות עצביות
- חור במעיים או חסימת מעיים, כאב בטן או התכווצויות בטן
- התנפחות של הלבלב (דלקת הלבלב)
- זיהומיים פטריאטיבים, כגון קנדידה או זיהום פטריאתי של הציפורניים
- בעיות בריאה (כגון בצתת)
- הצטברות נזלים סביב הריאה (תפליט קרום ריאה)
- היצרות נתיב האויר בריאות הגורם לקושי בנשימה
- רירית מודלקת של הריאה, הגורמת לכאבים חמימים בחזה המורוגשים יותר עם הנשימה
- (דלקת קרום הראות)
- שחפת
- זיהומיים בצליות
- ספירת טסיות נמוכה, ריבוי כדוריות דם לבנות
- זיהומיים בנוירטיק
- תוצאות בדיקות דם המראות נוגדים עצמים
- שינויים ברמות כולסטרול וושומנים בדם
- עליה במשקל (עבורו רוב החולים, העלייה במשקל הייתה קטנה)

**תופעות לוואי נדירות (rare) – יכולות להופיע אצל עד אחד מתוך 1,000 משתמשים:**

- סוג של סרטן דם (לימפומה)
- אספקת החמצן מן הדם לגוף אינה מספקת, בעיות במערכת הדם, כגון היצרות של כל-דם
- דלקת קרום המוח
- זיהום כתוצאה מהיחילשות מערכת החיסון
- דלקת נגיפית מסוג B (Hepatitis B infection), אם הייתה לך כזו דלקת בעבר
- CBD מודלק הנגרם כתוצאה מבעיה במערכת החיסונית (הפטיטיס אוטואימוני)
- בעיה בכבד הגורמת להצחבה של העור או העיניים (צחבת)
- נפיחות או גדייה חריפה של רקמות
- TAGובה אלרגית חמורה שעלולה לגרום לאיבוד הכרה ועלולה להיות מסכנת חיים (שוקאנאפילקטטי)
- התנפחות של כלי דם קטנים (וסקוליטיס)
- בעיות במערכת החיסונית אשר עלולות להשפיע על הריאות, העור ובולות הלימפה (כמו סרקוידוזיס)
- הצלברות של תאי מערכת החיסון בעקבות TAGובה דלקתית (נגעים גרנולומטיים)
- אفاتיה
- בעיות עור חמורות, כגון מחלת ליל (Toxic epidermal necrolysis), תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ו-Isomorphic pustulosis Acute generalised exanthematous pustulose (erythema multiforme), TAGובה ליכנואידיות (Lichenoid reactions) (פריחה עורית אדמדמה-סגולת مجردת ו/או קווים לבנים-אפורים דמווי חוט על מברכנות ריריות), שלפוחיות עור מתקלף או boils (פורונקולוזיס)
- בעיות חמורות של מערכת העצבים, כגון דלקת של חוט השדרה (Transverse myelitis), מחלת דמויות טרשת נפוצה, דלקת של עצב הראייה ותסמונת גיליאן-ברה

- דלקת בעין אשר עלולה לגרום לשינויים בראיה כולל עיוורון
  - נוזל בקרומי הלב (Pericardial effusion)
  - בעיות חמורות בריאות (כגון מחלת ריאות אינטראסיטיאלית)
  - מלנומה (סוג של סרטן עור)
  - סרטן צוואר הרחם
  - ספירת דם נמוכה, כולל ירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים כתמים קטנים אדומיים או סגולים הנגזרים מדיומים מתחת לעור
  - ערכים לא תקינים של חלבון בדם הנקרא 'מערכת המשלים', שהוא חלק מערכות החיסון
- תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה – התדריות אינה יכולה להיקבע מהמידע הקיימים.**
- סרטן בילדים ובמבוגרים
  - סרטן דם נדרי המופיע בעיקר אצל נערים בגיל העשרה או גברים צעירים T-cell lymphoma (Hepatosplenic T-cell lymphoma)
  - אי ספיקת לב
  - קרצינומה של תאי מרקל (סוג של סרטן עור)
  - סרcoma על שם קפושי (Kaposi's sarcoma), סרטן נדרי הקשור לזיהום בגיף הרפס הומני 8 (human herpes virus 8). סרcoma על שם קפושי מופיעה לרוב כנגעים סגולים על העור.
  - החמרה של מצב הנקרא דלקת עור ושרירים Dermatomyositis (נראת כפריחה בעור המלווה בחולשת שרירים)
  - התקף לב
  - שבץ
  - אובדן ראייה זמני במהלך או תוך שעתים מהעירוי
  - זיהום כתוצאה מחיסון חי בغالל מערכת חיסונית מוחלשת

**תופעות לוואי נוספות בילדים ומתבגרים**

בילדים אשר קיבלו רמייקד לטיפול במחלת קרונה נראו הבדלים מסוימים בתופעות הלוואי בהשוואה למוגרים שקיבלו רמייקד למחלת קרונה. תופעות הלוואי שהופיעו יותר בילדים הון: רמה נמוכה של תאי דם אדומיים (אנמייה), דם בצוואה, רמה כללית נמוכה של תאי דם לבנים (לויקופניה), אדומותיות או הסמקה, זיהומיים ויראליים, רמות נמוכות של תאי דם לבנים אשר נלחמים בזיהומיים (נויטרופניה), שברים עצמות, זיהומיים חידקיים, תגבות אלרגיות של דרכי הנשימה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא מצוינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### **דיווח על תופעות לוואי:**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוחות על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדוחות על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishor: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- רמייקד לרוב תואחסן על-ידי אנשי הצוות הרפואי בבית חולים או במרפאה.
- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח

- ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כר תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארץיה.
  - תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
  - יש לאחסן בקירור (2°C-8°C).
  - מומלץ להשתמש ברמייקד שהוכנה לעירוי בהקדם האפשרי (טור 3 שעות מההכנה). אם התמיסה הוכנה בסביבה נטולת חידקים, ניתן לשמור את התמיסה בקירור, (2°C-8°C) במשך 24 שעות. אין להשתמש בתמיסה אם היא שינתה צבע או שיש בה חלקיקים.

## 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, sodium phosphate dibasic dihydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, polysorbate 80

### כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה:

רמייקד משוקת בבקבוקן זכוכית המכיל אבקה להכנת Tamishe מרוכזת לתמיסת עירוי. האבקה בצורת כדורים לבנים שיובשו בהקפה. בכל אריזה בקבוקון אחד.

יצרן: יאנسن ביולוגיים בע"מ, אינסטייטווג 101, 233, ליידן, הולנד.

בעל רישיון: ג'י-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים, 6099000, ישראל.  
נערך בינואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
137-18-29865-05

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

### **הוראות לשימוש והכנה – שחזור, מילוי ומתן**

#### ***Instructions for use and handling – reconstitution, dilution and administration***

- Calculate the dose and the number of Remicade vials needed. Each Remicade vial contains 100 mg infliximab. Calculate the total volume of reconstituted Remicade solution required.
- Under aseptic conditions, reconstitute each Remicade vial with 10 ml of water for injections, using a syringe equipped with a 21-gauge (0.8 mm) or smaller needle. Remove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab. Insert the syringe needle into the vial through the centre of the rubber stopper and direct the stream of water for injections to the glass wall of the vial. Gently swirl the solution by rotating the vial to dissolve the lyophilised powder. Avoid prolonged or vigorous agitation. DO NOT SHAKE. Foaming of the solution on reconstitution is not unusual. Allow the reconstituted solution to stand for 5 minutes. Check that the solution is colourless to light yellow and opalescent. The solution may develop a few

fine translucent particles, as infliximab is a protein. Do not use if opaque particles, discolouration, or other foreign particles are present.

3. Dilute the total volume of the reconstituted Remicade solution dose to 250 ml with sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for infusion. Do not dilute the reconstituted Remicade solution with any other diluent. The dilution can be accomplished by withdrawing a volume of the sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for infusion from the 250 ml glass bottle or infusion bag equal to the volume of reconstituted Remicade. Slowly add the total volume of reconstituted Remicade solution to the 250 ml infusion bottle or bag. Gently mix. For volumes greater than 250 ml, either use a larger infusion bag (e.g., 500 ml, 1000 ml) or use multiple 250 ml infusion bags to ensure that the concentration of the infusion solution does not exceed 4 mg/ml.
4. Administer the infusion solution over a period of not less than the infusion time recommended (see section 4.2). Use only an infusion set with an in-line, sterile, non-pyrogenic, low protein-binding filter (pore size 1.2 micrometer or less). Since no preservative is present, it is recommended that the administration of the solution for infusion is to be started as soon as possible and within 3 hours of reconstitution and dilution. When reconstitution and dilution are performed under aseptic conditions, Remicade infusion solution can be used within 24 hours if stored at 2°C to 8°C. Do not store any unused portion of the infusion solution for reuse.
5. No physical biochemical compatibility studies have been conducted to evaluate the co-administration of Remicade with other agents. Do not infuse Remicade concomitantly in the same intravenous line with other agents.
6. Visually inspect Remicade for particulate matter or discolouration prior to administration. Do not use if visibly opaque particles, discolouration or foreign particles are observed.
7. Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

mbus s EU n 10-2023

REMI POWD PL SH 120224

J-C 2024