

עלון לזכרון לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשנ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ביסמוקל טבליות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

ביסמוט סאבסליצילט (Bismuth Subsalicylate)
262.5 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה בסעיף 6
"מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים
של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע ממצית על התרופה. אם יש לך שאלות
נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת
למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים. ילדים מתחת לגיל
12 שנים יש לפנות לרופא. עליך ליטול את התרופה על
פי ההוראות בסעיף הימין בעלון זה (סעיף 3 – כיצד
תשתמש בתרופה). היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע
נוסף. עליך להפסיק את נטילת התרופה ולפנות אל הרופא
במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם
שפתרים לאחר יומיים. כמו כן, יש להפסיק את הטיפול
ולפנות מיד לרופא אם השלשול מלווה בחום גבוה, אם
החלל צלצוליים באוזניים או איבוד שמיעה.

1. למה מיועדת התרופה?

• להקלה במקרים של שלשול, בחילה, גזים, כאבי בטן
עוויתיים, זלזול קיבה.
• כטיפול מניעתי של שלשול מטיילים.

קבוצה תרופוטית: סופחי מעיים (Intestinal adsorbents)

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד
המרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה
(ראה הסעיף 6 – מידע נוסף).
- אין להשתמש במחלות המלוות בחום כדוגמת
השפעת ואבעבועות רוח (מחשש לתסמונת ריי).
- התרופה מכילה סליצילט. אין להשתמש בתרופה
אם הינך אלרגי לסליצילטים (כולל אספירין),
או אם הנך נוטל תכשירים אחרים המכילים
סליצילט.
- אתה סובל מכיב קיבה (אולקוס), דימומים, צואה
דמית או שחורה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני הטיפול בביסמוקל ספר לרופא אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- היך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת
ההיגיימה (כגון אסתמה), מלחיה/ מערכת השתן, מערכת
העיכול (כגון כיב קיבה), מערכת הדם (כגון קרישה יכו),
שדון, התייבשות, או אם יש לך חום.
- אתה רגיש לזמון או לתרופה כלשהי, במיוחד לאספירין
וסליצילטים, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת
התרופה.
- אין להשתמש בתרופה בילדים ובמתבגרים עד גיל 20
ששכובים משפעת או אבעבועות רוח או שיש חום חום
או שאיבדו הרבה זנזלים.
- אין לתת לילדים או מבוגרים לטיפול בבחילות על רקע
אורגני.
- אין להשתמש בתרופה עם תסמיני המחלה (סימפטומים)
מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה
מושכת בלי היועץ ברופא.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות:
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות
אחרות תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר
על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- אספירין וסליצילטים
- תרופות נגד קרישת דם
- תרופות נגד שגדון, פרובנציד או סולפינרזון
- סטרציקלינים
- תרופות לסוכרת
- תרופות לדלקת מפרקים (ארטרטיס)

שימוש בתרופה וזמון:

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם
התרופה.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הינך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש
בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג)
טבליה (כל טבליה מכילה 2.74 מ"ג נתרן) כלומר היא
למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם הינך סובל בנוגע
למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המוקבל בדרך כלל הוא:

מבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים: 2 טבליות.

ילדים ומתחת לגיל 12 שנים: יש להיוועץ ברופא.

במידה והומלץ על ידי הרופא - ילדים מתחת לגיל 9 שנים:
מומלץ להשתמש בתרופה נזולית שישקב הרופא, המכילה
את החומר הפעיל בסימנט סאבסליצילט.

לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה,
עד 8 פעמים בכל 24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

יש לבלוע את התרופה עם מים.

אין לנזות טבליות בביסמוקל.
על מנת להקל על הבליעה, במידת הצורך, ניתן לכתוש
או לטעם את הטבליה ולבלוע מיד עם מים. יתכן ולטבליה
הכתושה או בזמן הלעיסה יהיה טעם מר.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר: אם נטלת מנת יתר או
אם בטעות בלעו ידל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר
מיין של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. אל
תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אם שכחת ליטול את התרופה: אם שכחת ליטול תרופה זו
בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשזכרת, אך בשום אופן
אין ליטול שתי מנות ביחד!

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול? במקרה של שלשולים
יש להרבות בשתיית משקאות ללא קפאין כדי להתגבר על
איבוד זנזלים.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משפיים אם הנך
זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,
היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בביסמוקל עלול לגרום לתופעות
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא
אם:

• מופיעים התסמינים הבאים:

- חולשה
- עוויתות
- בעיות בנשימה
- שטטשו ראיה
- בלבול
- צלצולים באוזניים או איבוד שמיעה
- עצירות חמורה

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי
אם:

• מופיעים סימנים של מינון יתר כגון נמנום, כאב ראש.

• במקרה של שלשול מלווה בחום גבוה.

• תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון.

• בשנייםים אלה אין מקום לדאגה.

אם הופיעה תופעה לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי
מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה
בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות
"ליחצה" על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול
בתרופה זו. שמוצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על
תופעות לוואי, או ע"י ניסוח לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנגו הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ לשהי יד ושנוח ראייתם של ילדים (או יתומקות
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרם להקאה ללא הוראה
מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date)
המופיע על גבי האריזה.

תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חדש.

תנאי אחסון: יש לאחסן באריזה המקורית בטמפרטורה
מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Calcium Carbonate, Microcrystalline Cellulose,
Sodium Starch Glycolate (type A), Povidone k 30,
Magnesium Stearate, Colloidal Anhydrous Silica.

כיצד רגישות התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה לבנה או כמעט לבנה, עגולה, קמורה, בצד אחד
ישנה הבטה של שתי מקדוות ורבע עגול כאשר הצד השני
הטבליה שטוח.

הטבליות ארוזות בממשיית (בליסטרים) באריזות של 21
טבליות (3 בליסטרים של 7 טבליות).

יש וכתובתו של בעל הרישום והיואין:

רם וקוחות ב"מ", רחוב גשר העץ 31, פראק תעשיות מקמ
חפר, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי
במשרד הבריאות: 35-38028-99-176.

נערך במאי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפטנט והלקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
על זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

RAPZ6924-00