

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986**

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## לידוקאין רז ג'ל 2%

החומר הפעיל:

לידוקאין הידרוכלוריד 2% (Lidocaine Hydrochloride 2%)
ג'ל 1 גרם (1 מ"ל)
ג'ל 20 מ"ג לידוקאין הידרוכלריד (Lidocaine Hydrochloride).

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 'מידע נוסף' ובסעיף 2 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה'.

**קרא בעיון את העלון על סופו בטרם שתשתמש בתרופה.**

הרופא או אל הרוקח.
עלִין להשתמש בתרופה על פי ההוראות בטעיף המיניון בעלון זה – סעיף 3 - 'כיצד תשתמש בתרופה?'. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
עלִין לפנות לרופא אם תסמיני התרופה עלולו להחמיר (מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 עד 5 ימים.
הג'ל אינו מיועד להקלה בכאבי צמיחת שיניים בילדים ותינוקות.
הג'ל אינו מיועד בדרך כלל לילדים מתחת לגיל שנתיים ובכל מקרה ילדים מתחת לגיל 3 יטופלו תחת פיקוח רפואי בלבד (ראה פרוט בהמשך לגבי שימוש בילדים).

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לאלחוש מקומי. אין להשתמש בפרוצדורות הדרושות שימוש בתרופות סטריליות.

**קבוצה תרפויטית:** מאלחש מקומי מקבוצת האמידים.

**רקע: לידוקאין רז ג'ל 2%** שייכת לקבוצת תרופות הנקראת מאלחשים מקומיים, החוסמים אותות עצביים ובכך גורם לחוסר תחושה זמני באזור שבו נמרח.

### 2. לפני השימוש בתרופה:

**אל להתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (לידוקאין הידרוכלוריד), פרילוקאין, מאלחש מקומי אחר מקבוצת האמידים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 'מידע נוסף').
- אין להשתמש בפרוצדורות סטריליות.
- אתה סובל מהפרעה בדם הנקראת מטהמוגלובינמיה.
- אתה סובל מחוסר באזים גלוקוז 6-פוספאט הדידווגאז.
- בתינוקות מגיל 12 חודשים ומטה הנטלים תרופות העלולות לגרום ל<sup>מט</sup>טהמוגלובינמיה (כגון: שודשים אוטלים).

**אהרזות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

**לפני הטיפול בלידוקאין רז ג'ל 2% , ספר לרופא אם:**

- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בריאות כלשהן. ייתכן שיידרש מינון מופחת.
- אתה סובל מבעיות בלב וכלי הדם, לרבות:
  - דופק איטי (ברדיקרדיה)
- קצב לב שאינו תקין (הפרעת קצב אריתמיה))
- סבלת בעבר מתגובה חמורה, חריגה או אלרגית ל**לידוקאין רז ג'ל 2%** או לתרופות אחרות מקבוצת האמידים.
- אתה חושב שאתה עלול להיות רגיש או אלרגי למרכיבים כלשהם בלידוקאין **רז ג'ל 2%** (ראה סעיף 2 - 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' וסעיף 6 'מידע נוסף').
- אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- אתה סובל מבעיות בעור, חתך או פצע באזור או בסמוך לאזור שבו ברצונך למרוח את הג'ל.
- אתה סובל מבעיה בעור שהיא חמורה או מכסה שטחי עור נרחבים.
- אתה סובל מבעיות כבדב וכלביות.
- אתה סובל מאפילפסיה.
- אתה או אחד מבני משפחתך אובחן כסובל מהפרעה העשויה לגרום לבעיות במערכת העצבים או לבעיות בעור (פורפיריה).
- אתה חוה הלב.
- את בהיריון, מתכננת היריון, חושבת שאת בהריון או מניקה.
- אתה חולה קשיש (מגיל 65 ומעלה).

### אהרזות נוספות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבלי היוועץ ברופא. שימוש בתרופה לעיתים קרובות, על שטחי עור נרחבים או לתקופה ממושכת, עלול לגרום להופעת תופעות לוואי עקב ספיגת יתר (ראה סעיף 4 - 'תופעות לוואי').

- יש להקפיד על המינון המומלץ, במיוחד בילדים, בהם המינון משתנה בהתאם למשקל. שימוש במינון גבוה מדי או תכוף מדי, עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות ואף מסכנות חיים, כולל פרקוסים, מטטהמולובינמיה ואובדן הכרה. ראה גם סעיף 3 - 'אם השתמש בטעות במינון גבוה יותר'.
- יש להשתמש בכמות הקטנה ביותר הנוחצה לשליטה בתסמינים.
- יש להימנע ממגע של התרופה עם העיניים (ראה סעיף 3 - 'כיצד תשתמש בתרופה?').
- בהתאם למינון, למאלחשים מקומיים המכילים לידוקאין עלולה להיות השפעה מתונה מאוד על התפקוד הנפשי וזיכרון פגועה זמנית בתנועה ובערנות.
- בשימוש בחלב הפה, מאלחשים מקומיים עלולים לגרום לחוסר תחושה בלשון וברייתו הקלה של ההקשות על הבלעיה. הדבר עלול להגביר את הסכנון לחנק או לנשיכה מקרית של הלשון או החלק הפדים של הלחיים. אין לאכול או ללעוס מסטיק בזמן שהפה מאולחש. יש להימנע ממאכלים ומשקאות חמים מאוד או קרים מאוד עד אשר חוסר התחושה יחלוף.

### ילדים ומתבגרים

הג'ל אינו מיועד להקלה בכאבי צמיחת שיניים בילדים ותינוקות מאחר שהדבר עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות.
הג'ל אינו מיועד בדרך כלל לילדים מתחת לגיל שנתיים ובכל מקרה ילדים מתחת לגיל 3 יטופלו תחת פיקוח רפואי בלבד.
ילדים מציטים בסיכון מוגבר לתופעות לוואי חמורות. חשוב תמיד להקפיד על הוראות השימוש המיניון, היות שבליעה של הג'ל ואי הקפדה על הוראות השימוש והמינון עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות (כגון פרכוסים) ומסכנות חיים. במידה והג'ל נרשם על ידי הרופא, יש להקפיד על הוראות השימוש והמינון כפי שהורה הרופא, במיוחד בילדים צעירים ותינוקות.
**אין להשתמש בתרופה על איברי המין של ילדים או תינוקות.**

### קשישים (גיל 65 ומעלה)

חולים קשישים עשויים להיות רגישים יותר להשפעות מערכתיות עקב עלייה ברמות של לידוקאין בדם בעקבות מנות חזרות. ייתכן שתידרש הפחתת מינון.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**
**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:**
תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב (תרופות אנטי-אירתמיות) כדוגמת מקסילטין, אמיודארון. הרופא יבצע מעקב קפדני וייתכן ותופנה לבדיקת אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג) אם אתה נוטל תרופה זו יחד עם אמיודארון.
מאלחשים מקומיים אחרים.
איתרומינין לטיפול בזיהומים שיתדיים.
איסרוקאנאזול לטיפול בזיהומים סטרייתיים.
פורפראמול (לטיפול בבעיות לב), סימטידין (לטיפול בבעיות במערכת העיכול) ופולובוסקאמין (לטיפול בדיכאון). אם אתה עומד להשתמש במינונים גבוהים של הג'ל לתיקופה ממושכת, ייתכן שיתגלו אינטראקיה במתן משולב עם תרופות אלה.

תרופות אחרות העלולות לגרום למטהמוגלובינמיה, כולל: סולפונאמידים, אצטאניליד, צבעי אנילין, בנטוקאין או מאלחשים אחרים מקבוצת האמידים, כלורוקוין, דספון, נפטלן, ניטרטים או ניטריטים, מיקופרנסטון, ניטרולצלירן, ניטרופוסיד, פמקוין, חומצה פרה-אמינוסליצילית, פנאצטין, פנמבאריטאילן, פינטואין, פרימקוין, כינין ומינונים גבוהים של אצטאמינופן.

### שימוש בתרופה ומזון

במקרה והשימוש בג'ל נעשה בחלב הפה - אין לאכול או ללעוס מסטיק בזמן שהפה מאולחש. יש להימנע ממאכלים ומשקאות חמים מאוד או קרים מאוד עד אשר חוסר התחושה יחלוף (ראה גם 'אהרזות נוספות' לעיל).

### היריון והנקה

אין מסיפי מידע לגבי השפעת החומר הפעיל לידוקאין על התפתחות העובר. אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא או את בהריון, מתכננת היריון או חושבת שאת בהריון, במיוחד בשלבי ההיריון המוקדמים.

### הנקה

אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את מתניקה. התרופה עוברת לחלב האם. אין למרוח על החזה משום שהתינוק עלול לבלוע את התרופה עם החלב.

### נהיגה ושימוש במכוונת

עלִין לדעת כיצד אתה מרגיש לאחר השימוש בלידוקאין **רז גל 2%** ולנקוט בהריות הוראהי בעת נהיגה או שימוש במכוונת מסוכנות. במקרה של מינון יתר ייתכן השפעה על הנהיגה והשימוש במכוונת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
כיל 1 גרם ל**ידוקאין רז ג'ל 2%** מכיל 0.61 מ"ג מ-תיל-פאראיהידרוקי-בנזואט ו-0.27 מ"ג פרופיל-פאראיהידרוקי-בנזואט. מ-תיל-פאראיהידרוקי-בנזואט (Methyl p-hydroxybenzoate) ו-1 פרופיל-פאראיהידרוקי-בנזואט (Propyl p-hydroxybenzoate) עלולים לגרום לתגובה אלרגית (יתכן בעיכוב) (ראה גם סעיף 4 - 'תופעות לוואי').

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִין לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

**המינון המקובל בדרך כלל הוא:**

**מינון מבוגרים (מעל גיל 18):**

- יש להשתמש בכמות הקטנה ביותר הנוחצה לשליטה בתסמינים שלך.
- בדרך כלל המנה היעילה היא לא יותר מ-5 עד 10 מ"ל בכל מריחה.
- אין להשתמש ביותר מ-6 מנות ביממה (24 שעות).

### מינון בילדים:

הג'ל אינו מיועד בדרך כלל לילדים מתחת לגיל שנתיים ובכל מקרה ילדים מתחת לגיל 3 יטופלו תחת פיקוח רפואי בלבד.

במידה והרופא הורה על שימוש בג'ל בילד מתחת לגיל שנתיים, אין להשתמש למשך יותר מיממה (24 שעות).

**מינון בילדים השוקלים מתחת ל-50 ק"ג (ומעל גיל שנתיים):**

- המנה תלויה במשקל הילד. יש להשתמש בכמות הקטנה ביותר הנוחצה לשליטה בתסמינים.
- לכל מנה יש להשתמש בלא יותר מ-1 מ"ל לכל 5 ק"ג משקל גוף. אין לעבור על מנה מקסימלית של 10 מ"ל בכל מריחה. לדוגמא: ילד במשקל 25 ק"ג יכול להשתמש בכל מנה במקסימום 5 מ"ל של ג'ל.
- אין להשתמש ביותר מ-4 מנות ביממה (24 שעות). ניתן למרוח את הג'ל פעם בשש שעות.

**מינון בילדים השוקלים מעל 50 ק"ג:**

- יש להשתמש בכמות הקטנה ביותר הנוחצה לשליטה בתסמינים.
- בדרך כלל המנה היעילה היא לא יותר מ-5 עד 10 מ"ל בכל מריחה.
- אין להשתמש ביותר מ-4 מנות ביממה (24 שעות). ניתן למרוח את הג'ל פעם בשש שעות.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

### משך הטיפול

אם לא חלי שיפור במצבך תוך 3 עד 5 ימים או אם חלה החמרה יש לפנות לרופא.

### אופן הנטילה

- שים לב! לא לבלעיה!** הג'ל מיועד לשימוש מקומי בלבד.

- לא לשימוש בפרוצדורות סטריליות.
- לשימוש על העור, הריריות ובחלב הפה.
- יש למרוח את הג'ל בעזרת אצבע נקייה, קיסם אוזניים או פיסת גזה.
- יש לטשוף את הידים לאחר השימוש.
- יש להימנע ממגע עם העיניים.

הנחיות אלה מציננות את המינון המומלץ לשימוש במידה ואתה משתמש בתרופה ללא פיקוח רפואי. ההתמלוצות מיועדות למטופלים בריאים.

במידה והג'ל נרשם לך על ידי הרופא, יש להקפיד על הוראות השימוש והמינון כפי שהורה הרופא.

### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם מרחת כמות גדולה מדי או בטעות ילד בעל מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון יתר ב-ית-חולים מחשש לספיגת יתר, והבא אריות התרופה איתך. תסמיני מינון יתר עלולים לכלול (ראה גם סעיף 4 'תופעות לוואי'):

- חוסר תחושה בשפתיים, בלשון וסובבי הפה.
- תחושת סחרור, סחרחרות.
- הפרעת ראיה, שטטוש ראיה .
- רעידות.
- פרקוסים, עוניתות.
- אובדן הכרה.
- שינויים בשמיים וציפופים באוזניים (טיניטוס).
- שינויים ברמת המזמן והפחמן הדו חמצני בדם, הפרעה בנשימה ואף דום נשימה, במקרים חמורים.
- לחץ דם נמוך באופן חמור, דופק איטי (ברדיקרדיה), קצב לב לא סדיר (הפרעת קצב אריתמיה)) וקריסה של מערכת הלב וכלי הדם.
- מטהמוגלובינמיה.
- בלבול .
- תחושת חום, קור או חוסר תחושה.

**מינון יתר חמור חייב להיות מטופל מיידית, היות שהוא עלול לסכן חיים.**

**אין לטול תרופות באחשה! בדוק תהיות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.**
**הרכיב משפטיים בחומר זה הוא: **זדוק להם.****
**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## 4. תופעות לוואי

מכאן בכל תרופה, השימוש בלידוקאין **רז ג'ל 2%** עלול לגרום לתופעות לוואי בתכול המשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:**

- תגובה אלרגית** (נדיר) (*מופיעה ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000*), הכוללת תסמינים כגון: קושי בבלעיה או קושי בנשימה, צפצופים, צניחה בלחץ דם, בחילות והקאות, נגעים עוריים, סרפדת (אורטיקריה), גרד או פריחה, בצקת, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון ובמקרים חמורים, שוק אנפילקטי.

**מטהמוגלובינמיה** - הפרעה בדם (נדיר) (*מופיעה ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000*), הכוללת תסמינים כגון: עור בעל גוון חום או אפרפר, בייחוד סביב השפתיים והציפורנים, חיוורון. מטהמוגלובינמיה חמורה קשורה לקוצר נשימה, דופק לב מהיר (טקיקרדיה) וערפול ההכרה.

תופעות לוואי העלולות להיעיד על ספיגת יתר (נדיר מאוד) (*מופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000*), הכוללות: נמנום, חוסר תחושה בלשון, תחושת סחרור, צפצופים באוזניים, שטטוש ראייה, הקאות, סחרחרות, דופק איטי בלשון חריג, עילפון, עצבנות, הזעה חריגה, רעידות או פרקוסים. תסמינים אלה עשויים להופיע בשימוש בג'ל במנה גבוהה מדי פעם אחת ובשימוש בג'ל במינון גבוה לתקופה ממושכת.

**מינון יתר חמור חייב להיות מטופל מיידית היות שהוא עלול לסכן חיים (ראה גם סעיף 3 - 'אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר').**

**תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים:**

על הורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל 'תופעות לוואי' וסעיף 2 - 'אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות' שפורטו.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלִין להתייעץ עם הרופא.**

### ידיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור 'דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי' שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)).
הפגנה לטיפוס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

## 5. איך לאחסן את התרופה?

**מנע הרעה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אות חודש.

**תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל־25°C.

**לאחר הפתיחה הראשונה:** ניתן להשתמש בתרופה במשך 12 חודשים כאשר התרופה מאוחסנת בטמפרטורה מתחת ל־25°C, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המוטבע על-גבי האריזה.

## נוסף מידע נוסף

**6. על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את המרכיבים הבלתי פעילים הבאים:**

Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Methyl p-hydroxybenzoate, Propyl p-hydroxybenzoate, Sodium hydroxide, Hydrochloric acid, Purified water.

### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

שפורפרת אלומיניום המכילה 30 גרם של ג'ל שקוף או כמעט שקוף.

### בעל הרישום והיבואן:

רז רקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות, עמק חפר.

**מספר רישום התרופה**
**פבנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

0036374-25-175.

עלון זה נערך באפריל 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לשם הפטטות והיעולין הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

RAZP1050-00