

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) 1986
يسُوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ريڤار تيفغ 2.5 ملغ أقراص مطلية

يحتوي كل قرص مطلي على:

ريڤاروكسابان 2.5 ملغ (Rivaroxaban 2.5 mg)

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة: انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

<p>بطاقة معلومات وقائية لمتلقي العلاج</p> <p>بالإضافة إلى النشرة الطبية، فإن للمستحضر ريفار تيفغ 2.5 ملغ توجد بطاقة معلومات وقائية لمتلقي العلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائية هامة يتوجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بريفار تيفغ 2.5 ملغ وخلالها، وعلى اتباعها.</p> <p>يجب قراءة بطاقة المعلومات الوقائية لمتلقي العلاج ونشرة المستهلك الطبية بتمعن قبل البدء باستعمال المستحضر.</p> <p>يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعانة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.</p>
--

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تمطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

• ريفار تيفغ 2.5 ملغ، بالدمج مع حمض الأسيثيل ساليسيليك (المعروف باسم الأسبيرين) أو بالدمج مع حمض الأسيثيل ساليسيليك وكلوبيدوجريل، مخصص لمنع الأحداث الخثرانية العصيدية (الأحداث الخثرنية) لدى متلقي العلاج البالغين بعد المتلازمة التاجية الحادة (مجموعة من الحالات التي تشتمل على نوبة قلبية وذبحة صدرية لا منتفخة، وهي نوع خطير من الألم في الصدر) والذين يوجد لديهم ارتفاع في مؤشرات قلبية معينة في فحوص الدم.

• ريفار تيفغ 2.5 ملغ، بالدمج مع حمض الأسيثيل ساليسيليك (المعروف باسم الأسبيرين)، مخصص لمنع الأحداث الخثرانية العصيدية (الأحداث الخثرنية) لدى متلقي العلاج البالغين المصابين بمرض الشريان التاجي أو بمرض الشريان المحيطي المصحوب بالأعراض، المعرضين لخطورة عالية للإصابة بأحداث إقفارية.

الفصلية العلاجية: ينتمي ريفار تيفغ 2.5 ملغ إلى فصيلة الأدوية المسماة مضادات التخثر ويعمل عن طريق تقليل الميل إلى تكوّن خثرات دموية، وذلك عن طريق حجب عامل مرتبط بعملية التخثر (العامل (Xa) 10a).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لريفاروكسابان أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من نزيف دموي متزايد.
- وُجد لديك مرض أو حالة في عضو في الجسم يزيدان من خطر نشوء نزيف دموي خطير (مثل: قرحة المعدة، رضّة أو نزيف دموي في الدماغ، جراحة في الدماغ أو العينين تمّت مؤخرًا).
- كنت تستعمل أدوية لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبكسابان أو هيبارين)، باستثناء حالات الانتقال من العلاج بمضاد تخثر واحد إلى العلاج بأخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال قسطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا.
- كنت تعاني من المتلازمة التاجية الحادة، ونشأ لديك في الماضي نزيف دموي أو خثرة دموية في الدماغ (سكتة دماغية).
- كنت تعاني من مرض الشريان التاجي أو مرض الشريان المحيطي، وكان لديك في الماضي نزيف دموي في الدماغ (سكتة دماغية) أو كان لديك انسداد في الشرايين الصغيرة التي تزود النسيج الدماغي العميق بالدم (سكتة جوية)، أو إذا كان لديك خثرة دموية في الدماغ (سكتة دماغية إقفارية، غير جوية) في الشهر الماضي.
- كنت تعاني من مرض في الكبد يسبب ارتفاعا في خطر نشوء نزيف دموي.
- كنت حاملا أو مرضعاً.

لا تتناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ وأخير طبيبك إذا انطبق عليك أحد الأوضاع المذكورة أعلاه.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ.

لا يجوز استعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ بالدمج مع أدوية معينة تقلل تخثر الدم مثل پراسوجريل أو تيكاجريلور، باستثناء حمض الأسيثيل ساليسيليك (الأسبيرين) وكلوبيدوجريل.

يتطلب استعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ توخي الحذر بشكل خاص. قبل العلاج بريفار تيفغ 2.5 ملغ، أخبر الطبيب:

- إذا كنت معرضاً لخطورة عالية لنشوء نزيف دموي، مثلما قد يحدث في إحدى الحالات التالية:
 - مرض كلوي خطير، لأن وظيفة كليتيك قد تؤثر على كمية الدواء الذي يعمل في جسمك.
 - كنت تستعمل أدوية أخرى لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبكسابان أو هيبارين)، عندما تتلقى من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال قسطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا (انظر لاحقًا في البند 2 - "التفاعلات بين الأدوية").
 - اضطرابات نزفية.
 - ضعف دم مرتفع جدًا وغير متوازن بواسطة العلاج الدوائي.
 - أمراض في المعدة أو في الأمعاء قد تسبب نزيفًا دمويًا، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب في المريء ونتيجة، مثلًا، لمرض الارتجاع المعدي المريئي (مرض يعلو فيه الحمض من المعدة إلى المريء) أو أورام موضعية في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
 - مشاكل في الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال شبكية).
 - مرض رئوي تتوسع فيه الشعب الهوائية وتمثّل بالإنفرازات القيجحية (برونكيكتازيس - توسع القصبات) أو نزيف دموي سابق من الرئة.
 - كان عمرك فوق 75 عامًا.
 - كان وزنك أقل من 60 كغم.
 - إذا كان لديك مرض الشريان التاجي مع فشل قلبي خطير مصحوب بالأعراض.

- إذا وُجد لديك صمام قلبي اصطناعي.
- إذا كنت تعلم أنك تعاني من مرض اسمه متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي يسبب زيادًا في خطورة نشوء خثرات دموية)، فأخبر طبيبك وهو سيقرر ما إذا كان يجب تغيير العلاج.
- إذا **انظيقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، فأخبر الطبيب قبل استعمال الدواء**. سيقرر الطبيب ما إذا كان يجب معالجتك بريفار تيفغ 2.5 ملغ وما إذا كنت بحاجة إلى متابعة عن كثب.
- إذا اعتقد الطبيب أنك معرض لخطر متزايد لتطوير قرحة المعدة أو الأمعاء، فيُحتمل أن يعطيك أيضًا علاجًا لمنعها.

إذا كان عليك الخضوع لعملية جراحية أو لإجراء غزوي

- من المهم جدًا تناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ قبل وبعد الجراحة أو الإجراء الغزوي، بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- إذا كانت جراحتك تتضمن قسطرًا أو حقنة داخل النخاع (مثلًا لتخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي أو لتسكين الألم):
 - من المهم جدًا تناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ قبل وبعد الحقنة، أو قبل وبعد إزالة القسطر، **بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب**.
 - راجع الطبيب المعالج فورًا إذا كنت تعاني من خدر (انعدام الإحساس) أو من ضعف في الرجلين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد تلاشي التخدير، لأن هناك حاجة إلى تدخل طبي طارئ.

الأولاد والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عامًا.

لا تتوفر معلومات كافية حول الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين.

التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:
- أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول)، باستثناء تلك المخصصة فقط للدهن على الجلد.
 - أقراص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج - وهي حالة ينتج فيها الجسم فائضًا من الكورتيزول.
 - أدوية معينة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل: كلاريثروميسين، إيريثروميسين).
 - أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج تلوث فيروس العوز المناعي البشري (HIV)مرض الإيدز (مثل: رينوتافير).
 - أدوية أخرى مضادة للتخثر (مثل: إينوكسابارين، كلوبيدوجريل أو مناهضات قيتامين K مثل وارفارين وأسيثرومارول، پراسوجريل وتيكاجريلور [انظر في البند 2 - "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"]).
 - أدوية مضادة للالتهاب ومسكنة للألم (مثل: نابروكسين أو حمض الأسيثيل ساليسيليك [الأسبيرين]).

- درونيارون، دواء لعلاج النبض غير المنتظم.
- أدوية معينة لعلاج الاكتئاب (مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية [SSRIs] أو مثبطات استرداد السيروتونين والنور-إيبينيفرين [SNRIs]).

إذا **انظيقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخبر الطبيب قبل استعمال الدواء**، لأن هذه الأدوية قد تؤدي إلى تزايد تأثير ريفار تيفغ 2.5 ملغ. سيقرر طبيبك ما إذا كان سيعالجك بريفار تيفغ 2.5 ملغ وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراقبة طبية عن كثب.

كذلك، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:

- أدوية معينة لعلاج الصداع (مثل: فينيتوين، كاربامازيبين، فينوبريتال).
- سلانت جونس وورث، مستحضر نباتي لعلاج الاكتئاب (العرن، St. John’s wort).
- ريفامبيستين (مضاد حيوي).

إذا **انظيقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخبر الطبيب قبل استعمال الدواء**، لأن هذه الأدوية قد تؤدي إلى تندی تأثير ريفار تيفغ 2.5 ملغ. سيقرر طبيبك ما إذا كان سيعالجك بريفار تيفغ 2.5 ملغ وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراقبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ مع الطعام أو بدونه.

لا تستعلمي ريفار تيفغ 2.5 ملغ إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحملي، فعليك استعمال وسيلة متوق بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ.

إذا حملت خلال فترة استعمال الدواء، فراجعي الطبيب فورًا، وهو سيقرر بشأن استمرار العلاج.

السياقة واستخدام الماكينات

قد يسبب ريفار تيفغ 2.5 ملغ الدوار (وهو عرض جانبي شائع) أو الإغماء (وهو عرض جانبي غير شائع) (انظر البند 4 - "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السياقة، ولا ركوب الدراجة الهوائية، ولا استعمال الأدوات أو تشغيل الماكنت في فترة استعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ إذا تأثرت من هذين العرضين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على اللاكوز والصوديوم.

إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل أن تبدأ باستعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ.

يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومل من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص ولذلك يُعتبر بشكل جوهري "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

- قرص واحد من ريفار تيفغ 2.5 ملغ مرتين في اليوم. يجب تناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ في نفس الساعات تقريبًا كل يوم (على سبيل المثال، قرص واحد في الصباح وقرص واحد في المساء).
- إن يتم إعطائك ريفار تيفغ 2.5 ملغ كدواء وحيد بحد ذاته، سيأمرك الطبيب أيضًا بتناول أحد الأدوية التالية:

- حمض الأسيثيل ساليسيليك المعروف باسم الأسبيرين، أو
- حمض الأسيثيل ساليسيليك سويًا مع كلوبيدوجريل.

سيشذك الطبيب إلى الجرعة الدوائية التي يجب عليك تناولها من الأدوية الإضافية (الجرعة الدوائية الموصى بها عادةً تتراوح بين 75 ملغ و-100 ملغ من حمض الأسيثيل ساليسيليك مرة واحدة في اليوم، أو جرعة يومية من 75 ملغ إلى 100 ملغ من حمض الأسيثيل ساليسيليك سويًا مع جرعة يومية من 75 ملغ من كلوبيدوجريل).

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب البدء بالعلاج بريفار تيفغ 2.5 ملغ بعد المتلازمة التاجية الحادة في أسرع وقت ممكن بعد تحقيق استقرار المتلازمة التاجية الحادة، ولينس قبل مرور 24 ساعة على الرفع في المستشفى وفي الوقت الذي يتم فيه عادةً إيقاف العلاج بمضاد التخثر الذي تم إعطاؤه بواسطة حقنة.

سيشذك طبيبك إلى الوقت الذي ستبدأ فيه العلاج بريفار تيفغ 2.5 ملغ إذا شُخص لديك مرض الشريان التاجي أو مرض الشريان المحيطي.

سيقدر طبيبك بشأن مدة العلاج.

كيفية تناول

يمكن تناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ مع الطعام أو بدونه.

إذا كان من الصعب عليك بلع القرص بأكمله، فكلّم طبيبك عن طرق أخرى لتناول ريفار تيفغ 2.5 ملغ.

يمكن سحق القرص وخلطه مع الماء أو هريس التفاح، مباشرةً قبل تناوله.

عند الحاجة، سيسطيك طبيبك ريفار تيفغ 2.5 ملغ مسحوقًا عن طريق أنبوب تغذية للمعدة.

لا تتوفر معلومات عن النشطر/المضغ.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم فعليك مراجعة الطبيب المعالج فورًا. تتأول أكثر مما يلزم من ريفار تيفغ 2.5 ملغ يزيد من خطر نشوء نزيف دموي.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

سيساهم تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم في أن تتذكر تناوله.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعياديّ واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء فإن هذا الشيء قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو بنوبة قلبية إضافية أو الموت نتيجة لمرض متعلق بظفك أو أوعينك الدموية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة؛ راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. **ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ريفار تيفغ 2.5 ملغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

كما هو الحال مع أدوية مشابهة أخرى لتقليل تكوّن الخثرات الدموية، فإن ريفار تيفغ 2.5 ملغ قد يسبب نزيفًا دمويًا من شأنه أن يتشكل خطرًا على الحياة. قد يسبب النزيف الدموي الشديد انخفاضًا فجائيًا في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزيف مخفيًا.

يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية:

علامات على وجود نزيف دموي:

- نزيف دموي دماغي أو داخل القحف (قد تشتمّل الأعراض على صداع، ضعف في جانب واحد، تقبؤ، اختلاج، انخفاض في مستوى الوعي وتصلب في الرقبة. هذه حالة طوارئ طبية خطيرة، يجب التوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري!).
- نزيف دموي متواصل أو متزايد.
- ضعف غير اعتيادي، تعب، سُحوب، دوار، صداع، انتفاخ غير مفسر، ضيق التنفس، ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (أنجيينا بيكتوريس).
- سيقدر طبيبك ما إذا كان الأمر يتطلب مراقبة عن كثب أو يتطلب تغييرًا في العلاج.

علامات على رد فعل جلدي خطير:

- طفح جلدي كثيف وأخذ في الانتشار على الجلد، حويصلات أو جروح في النسيج المخاطي، مثلًا في الفم أو العينين (Stevens-Johnson syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis).
- رد فعل على الدواء يسبب طفحًا جلديًا، حمى، التهابًا في أعضاء داخلية، شدوذًا في الدم وتوَعكًا جهازيًا (متلازمة DRESS).

يُعتبر شيوخ هذه الأعراض الجانبية نادرًا جدًا (مستعمل واحد كحدّ أقصى من بين 10.000 مستعمل).

علامات على رد فعل تحسسي خطير:

- انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط قحلي في ضغط الدم.
- يُعتبر شيوخ ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرًا جدًا (ردود الفعل التأقية، بما في ذلك الصدمة التأقية؛ قد تؤثر على مستعمل واحد كحد أقصى من بين 10.000) أو أنها غير شائعة (الوذمة الوعائية والوذمة التحسسية؛ قد تؤثران على مستعمل واحد كحد أقصى من بين 100).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (Common) (أعراض قد تؤثر على مستعمل واحد كحد أقصى من بين 10 مستعملين):

- انخفاض في خلايا الدم الحمراء مما قد يسبب الشحوب، الضعف أو ضيق التنفس
- نزيف دموي في المعدة أو في الأمعاء، نزيف دموي في الأعضاء التناسلية البولية (بما في ذلك الدم في البول والنزيف الحيضي المتزايد)، نزيف دموي من الأنف (رعاف)، نزيف دموي في اللثة
- نزيف دموي إلى داخل العين (بما في ذلك نزيف من بياض العين)
- نزيف دموي إلى داخل نسج أو تجويف في الجسم (ورم دموي داخلي موضعي، رضّة)
- سعال دموي
- نزيف دموي من الجلد أو تحت الجلد
- نزيف دموي بعد عملية جراحية
- تسرب دم أو سائل من جرح جراحي
- انتفاخ في الأطراف
- ألم في الأطراف
- خلل في وظيفة الكليتين (يمكن أن يتم اكتشافه في الفحوص التي يجريها الطبيب)
- حمّى
- آلام البطن، صعوبات في الهضم، غثيان أو تقبؤ، إمساك، إسهال
- ضعف دم منخفض (قد تكون أعراض ذلك دوارًا أو إغماءً عند الوقوف)
- انخفاض عام في القوة والطاقة (ضعف، تعب)، صداع، دوار
- طفح جلدي، حكة جلدية
- قد تشير فحوص الدم إلى ارتفاع في إنزيمات معينة في الكبد

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) (أعراض قد تؤثر على مستعمل واحد كحد أقصى من بين 100 مستعمل):

- نزيف دموي داخل الدماغ أو داخل القحف (انظر أعلاه، "علامات على وجود نزيف دموي")
- نزيف دموي إلى داخل مفصل مما يسبب الألم والانتفاخ
- قلّة الصفائح (عد منخفضة لصفائح الدم، وهي خلايا تساهم في تخثر الدم)
- ردود فعل تحسسية، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية في الجلد
- خلل في وظيفة الكبد (يمكن أن يتم اكتشافه في الفحوص التي يجريها الطبيب)
- قد تشير فحوص الدم إلى ارتفاع في البيليروبين، في إنزيمات معينة في البنكرياس أو الكبد، أو في عدد صفائح الدم
- إغماء
- شعور عام غير جيد (توعك)
- نبض متسارع
- جفاف الفم
- شرى (أورتيكاريا)

أعراض جانبية نادرة (Rare) (أعراض قد تؤثر على مستعمل واحد كحد أقصى من بين 1.000 مستعمل):

- نزيف دموي إلى داخل العنصله
- ركود صفراوي (جريان متضائل للمرارة)، التهاب الكبد (هيباتيتيس) بما في ذلك تضرر خلايا الكبد (كبد ملتهب يشمل تضررًا كبديًا)
- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
- انتفاخ موضعي
- ورم دموي داخلي موضعي (هيماتوما) في الأربية نتيجة لمضاعفات إجراء قلبي يتم فيه إدخال قسطر إلى شريان في الرجل

أعراض جانبية نادرة جدًا (Very Rare) (أعراض قد تؤثر على مستعمل واحد كحدّ أقصى من بين 10.000 مستعمل):

- تراكم البوليوزينات، نوع من خلايا الدم البيضاء المحببة التي تسبب التهابًا في الرئتين (التهاب الرئتين البوليوزيني)
- أعراض جانبية مدى شيوخها غير معروف (لا يمكن تقدير مدى شيوخها من المعلومات المتوفرة):**

- فشل كلوي بعد نزيف دموي خطير
- نزيف دموي في الكلى، أحيانًا مع وجود دم في البول مما يؤدي إلى عدم قدرة الكليتين على العمل كما ينبغي (اعتلال الكلية المرتبط بمضادات التخثر)
- ضعف متزايد في عضلات الرجلين أو الذراعين بعد نزيف دموي، مما يسبب الألم، الانتفاخ، التغيرات في الإحساس، الخدر أو الشلل (متلازمة الحيز بعد نزيف دموي)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il.

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المنوّن على العبوة. يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف في درجة حرارة دون 25°C.**
- الأقراص المسحوقة**

تكون الأقراص المسحوقة في حالة استقرار في الماء أو في هريس التفاح حتى 4 ساعات.

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في النفايات البيئية. إسال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose, sodium lauryl sulfate, polyvinyl alcohol (part. hydrolyzed), titanium dioxide, magnesium stearate, macrogol, talc, iron oxide yellow.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي مستدير أصفر اللون، على أحد جانبي القرص مطبوع "T" وعلى جانبه الآخر مطبوع "2R". تأتي الأقراص في شرائط حويصلات (بليستر) في عبوات من 28، 30، 56 أو 60 قرصًا.

قد لا تسوق جميع أحجام العبوة.

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيفغ إسرائيل م.ض،

شارح قفوره هانفيقته 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير النشرة في كانون الثاني/يناير 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

168-07-36157

من أجل التليط والتسويق للقراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للنسج والجنسين.