

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ריבר טבע 15 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

ריברוקסבאן 15 מ"ג (Rivaroxaban 15 mg)

ריבר טבע 20 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

ריברוקסבאן 20 מ"ג (Rivaroxaban 20 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 – מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה וסעיף 6 – מידע נוסף.

קופא היא חבילת מידע תמציתי על התרופה. אם יש של שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

<div></div>	<div>כרטיס מידע בטיחותי למטופל</div>
<div>בנוסף לעלון, לתכשיר ריבר טבע קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעלך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בריבר טבע ולפעול על פיו.</div>	
<div>יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר.</div>	
<div>יש לשמור את הכרטיס והעלון לעיון נוסף במידת הצורך.</div>	

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ריבר טבע 15 מ"ג וריבר טבע 20 מ"ג מיועדים למבוגרים במצבים הבאים:

- מניעת קרישי דם במוח (שבץ) ובכלי דם אחרים בגוף, בחולים הסובלים ממקצב בל לא סדיר הנקרא פרופור פרוזדוריום שלא על רקע מסמתי, ומגורם כיטון אחד או יותר מהבאים: אי ספיקת לב, יתר לחץ דם, גיל (75 או מעל), סוכרת, שבץ או חתקת איסכמי חוליך בעבר.
- טיפול בקרישי דם בוורידים הרגליים (פקקת ורידים עמוקים) ובכלי הדם של הריאות (סחחיף ריאתי) ולמניעת הפועה חוזרת של קרישי דם בכלי הדם ברגליים ו/או בריאות.

ריבר טבע 15 מ"ג וריבר טבע 20 מ"ג מיועדים לילדים ולמתבגרים בלתי לגיל 18 השוקלים 30 ק"ג או יותר במצב הבא:

- טיפול בקרישי דם ומניעת הפועה חוזרת של קרישי דם בוורידים או בכלי הדם של הריאות, לאחר טיפול התחלתי של לפחות 5 ימים עם תרופות להזרקה המשמשות לטיפול פרופיטי.

קבוצה פרופיטית: ריבר טבע שייך לקבוצת תרופות הנקראת נוגדי קרישה ופועל על-ידי הקטנת הנטייה ליצירת קרישי דם וזאת על-ידי סתימת גורם המעורב בתהליך הקרישה (Xa)10a).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לריברוקסבאן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר כילה התרופה (למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 – מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה וסעיף 6 – מידע נוסף).
- אתה סובל מדימום מוגבר.
- יש לך מחלה או מצב באיבר בגוף שמגבירים את הסיכון לדימום רציני (כגון: כיב קיבה, חבלה או דימום במוח, ניתוח במוח או פעניים שהתרחש לאחרונה).
- אתה נוטל תרופות למניעת קרישי דם (כגון: וארפרין, דביגטראן, אפיקסבאן או הפרין), מלבד במקרים של מעבר מנוגד קרישה אחד למשנהו או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר ורידי או עורקי כדי להשאירו פתוח.
- אתה סובל ממחלת כבד הגורמת לעלייה בסיכון לדימום.
- את בהיריון או מניקה.

אל ליטול ריבר טבע וספר להוציא שלך אם אחד מהמצבים המתוארים מעלה חל עליך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת ריבר טבע.

נדרשת זהירות מיוחדת בשימוש בריבר טבע. לפני הטיפול בריבר טבע, ספר לרופא:

אם אתה בסיכון גבוה לדימום כפי שיכול להיות באחד מהמצבים הבאים:

- מחלת כליות חמורה במבוגרים ובינונית עד חמורה בילדים ובמתבגרים, מאחר שתפוקת הכליות עלול להשפיע על כמות התרופה הפועלת בגופך (ראה סעיף 3 - "כיצד השתמש בתרופה?" לגבי המינון המומלץ במקרה של מחלת כליות).

- אתה נוטל תרופות אחרות למניעת קרישי דם (כגון: וארפרין, דביגטראן, אפיקסבאן או הפרין), כאשר אתה עובר מנוגד קרישה אחד למשנהו או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר ורידי או עורקי כדי להשאירו פתוח (ראה בהמשך סעיף 2 - "תגובות בין-תרופתיות").
- הפרעות דימום.
- לחץ דם גבוה מאוד שאינו מאוזן באמצעות טיפול תרופתי.

- מחלה בקיבה או במעי העלולה לגרום לדימום כגון: דלקת המעי או הקיבה, או דלקת בוווש כתוצאה, למשל, ממחלת החרז ווטי-קיבתי (מחלה בה חומצה המקהיבה עולה לושט) או גידולים הממוקמים בקיבה או במעיים או באיברי המין או בדרכי השתן.

- בעיות בכלי הדם ש רשתית העין (רטינופתייה).
- מחלת ראות בה רשתיתפנות מורחבים ומלאים בהפרשות מוגלתיות(ברנוכיאקטיזם) או דימום קודם מהריאה.
- אם יש לך מסתם לב מלאכותי.
- אם ידוע לך כי אתה סובל ממחלה בחיסן תסמונת אנט-פוספוליפידית (הפרעה במערכת החיסון שתסומנת אנט-ליטון מוגבר לקרישי דם), ספר לרופא שלך והוא יחליט האם יש לשנות את הטיפול.

- אם הרופא קטב שלחץ הדם שלך אינו יציב או שמתוכנן בעבורך טיפול ניתוחי או אחר להסרת קרישי הדם מהריאות.
- במידה ואחד מהמצבים הנזכרים לעיל חל עליך ספר לרופא לפני נטילת התרופה.** הרופא יחליט אם יש לטפל בכך בריבר טבע ואם אתה זקוק למעקב צמוד.
- במידה והרופא יחשוב שאתה נמצא בסיכון מוגבר לפתח כיב קיבה או מעי, ייתכן שיתן לך גם טיפול למניעתו.

אם אתה מתוכנן לעבור ניתוח או הליך פולשני

יש חשוב ביותר ליטול ריבר טבע לפני ואחרי הניתוח או ההליך הפולשני בדיוק בזמנים שקבע לך הרופא.

אם צנרת או זריקה תוך-שידרתיים (כגון בלאלוש אפידורלי או שידרתי או לשיכון כאב) מעורבים בניתוח שלך:

- חוסר ביותר בליטול ריבר טבע לפני ואחרי הזריקה או השריפת הצנתר בדיקת בזמנים שקבע לך הרופא.
- פנה מיד לרופא המטפל אם אתה סובל מחוסר תחושה או מחולשה ברגליים או מבעיות במעי או בשלפוחית השתן לאחר התפוגגות הבלאוש, מאחר שיש צורך בהתערבות רפואית דחופה.

ילדים ומתבגרים

טבליות ריבר טבע אינן מומלצות לילדים השוקלים פחות מה-30 ק"ג. אין מוספיק מידע על השימוש בילדים ובמתבגרים בתרופות המיועדות למבוגרים.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות מסוימות נוגד זיהומים פטריותיים (כגון: פלוקונאזול, איטרקונאזול, וזריקונאזול, פוסאקונאזול), פרט לאלו שמועדות רק למריחה על העור.
- טבליות המכילות טקסוקונאזול לטיפול בתסמונת קושינג' - מצב בו הגוף מייצר עורף של קורטיזול.
- תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים (כגון: קלאריתרומיצין, אריתרומיצין).
- תרופות אנטי-ויראליות מסוימות לטיפול בזיהומים של נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV)/מחלת האיידס (כגון: ריטונאביר).
- תרופות נוגדות קרישה אחרות (כגון: אנוקסאפארין, קלופידוגרל או אנטגוגנטיים לויטמינן K כגון וארפרין ואצנוקומרויל).

- תרופות נוגדות דלקת ומשככות כאב (כגון: נפרוקסן או חומצה אצטילסליצילית [אספירין]).
- תרודנורן, תרופה לטיפול בדופק לא סדיר.
- תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין [SSRIs] או מעכבים של ספיגה חוזרת של סרוטונין ונזרופינפרין [SNRIs]).

במידה ואחד של המצבים הנזכרים לעיל חל עליך ספר לרופא לפני נטילת התרופה, כיוון שתרופות אלו עלולות לגרום להגברת ההשפעה של ריבר טבע. הרופא שלך יחליט האם לטפל בך עם ריבר טבע והאם יש צורך בהנחה רפואית צמודה.

- כמו כן, יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:** (כגון: כרטיס מסימות לטיפול בכפיין (אפילפטיא), כגון: פניטואין, קארבאמאזפין, פנובארביטאל).
- התנשי או חומצה ליטפול בדיכאון סנט ג'ונס וורט (St. John's wort, הסיפריקום).
- ריפאמפיצין (אנטיביוטיקה).

במידה ואחד מהמצבים הנזכרים לעיל חל עליך ספר לרופא לפני נטילת התרופה, כיוון שתרופות אלו עלולות לגרום להשפעה מופחתת על ריבר טבע. הרופא שלך יחליט האם לטפל בך עם ריבר טבע והאם יש צורך בהשגחה רפואית צמודה.

שימוש בתרופה ומזון

חובה ליטול את התרופה עם מזון ומומלץ לבלוע את הטבלייה עם מים.

היריון, הנקה ופוריות

אל ליטיל ריבר טבע אם את בהיריון או מניקה.

אם יש סיכוי שתכניסי להריון, עליך השתמש באמצעי מניעה אחר בזמן נטילת ריבר טבע.

אם נכנסת להריון במהלך נטילת התרופה, פני מיד לרופא, אשר יחליט לגבי המשך הטיפול.

הניגה ושימוש במכונות

ריבר טבע עלול לגרום לסחרחורת (תופעת לוואי שכיחה) או לעילפון (תופעת לוואי שאינה שכיחה) (ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי"). אין לנהוג, לרובכ על אופניים, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות בזמן השימוש בריבר טבע במידה ואתה מושפע מתסמינים אלו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה לקטוז ונתרן.

אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני שאתה מתחיל ליטול ריבר טבע. התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל טבלייה וכן על נחשבת כמתונה?נטולת נתרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לזכוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

מבוגרים

- למניעת קרישי דם במוח (שבץ) ובכלי דם אחרים בגוף, המינון המקובל בדרך כלל הוא טבלייה אחת של ריבר טבע 20 מ"ג פעם ביום.

במידה ואתה סובל מלקיוי בתפקוד הכליות, ייתכן שהמינון יופחת לטבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג פעם ביום.

אם אתה צריך לעבור הליך לטיפול בחסימה בכלי הדם בלב (הליך בשם: התערבות כללית מלעורית - PCI עם החדרת תומכן), קיים מידע מוגבל על הפחתת המינון לטבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג פעם אחת ביום בנוסף לתרופה מעכבת סטיות, כגון: קלופידוגרל.

- לטיפול בקרישי דם בוורידים הרגליים ובכלי הדם של הריאות ולמניעת הפועה חוזרת של קרישי דם, המינון המקובל בדרך כלל הוא טבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ'ג פעמיים ביום למשך 3 השבועות הראשונים, ובהמשך טבלייה אחת של ריבר טבע 20 מ"ג פעם ביום. לאחר השלמת לפחות 6 חודשים של טיפול, ייתכן שהרופא יחליט להמשיך את הטיפול בריבר טבע 10 מ"ג טבלייה אחת ביום.

במידה ואתה סובל מלקיוי בתפקוד הכליות ונוטל ריבר טבע 20 מ"ג פעם אחת ביום ייתכן שהרופא יחליט להפחית את המינון לאחר 3 שבועות, לטבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג פעם ביום, זאת במידה שהסיכון לדימום גדול יותר מהסיכון להיווצרות עוד קרישי דם.

ילדים ומתבגרים

המינון של ריבר טבע תלוי במשקל הגוף, ויחושב על-ידי הרופא.

- המינון המומלץ עבור ילדים ומתבגרים **השוקלים בין 30 ק"ג ופחות 50-ק"ג** הוא **טבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג פעם ביום**.

- המינון המומלץ עבור ילדים ומתבגרים **השוקלים 50 ק"ג או יותר** הוא **טבלייה אחת של ריבר טבע 20 מ"ג פעם ביום**.

יש ליטול מנת ריבר טבע עם משקה (לדוגמה מים או מיץ) במהלך ארוחה. יש ליטול את הטבליות כל יום בשעה קבועה. יש לשקול שימוש בשעון מעורר כדי להזכיר לך. להורים או מטפלים: אנא התבוננו בילד במהלך הנטילה כדי לוודא שהמנה המלאה נלקחה.

כיוון שהמינון של ריבר טבע מווסט על משקל גוף, חשוב להקפיד על ביקורים מתוכננים אצל הרופא, כי ייתכן שיהיה צורך להתאים את המינון ככל שמשקל הגוף משתנה.

לעולם אין להתאים את המינון של ריבר טבע בעצמך. הרופא יתאים את המינון במידת הצורך.

אין לחצות את הטבלייה בניסיון לתת חלק ממנת הטבלייה. אם נדרש מינון נמוך יותר, השתמש בצורת מינון של ריברוקסבאן בגרגרים להכנת תרחיף למתן פומי. לילדים ולמתבגרים שאינם מסוגלים לבלוע טבליות שלמות, יש להשתמש בצורת מינון בגרגרים להכנת תרחיף למתן פומי. אם צורת מינון בגרגרים להכנת תרחיף למתן פומי אינה זמינה, ניתן לרסק את הטבלייה ולערבב עם מים או מחית תפוחים מיד לפני נטילתה. יש לאכול מיד לאחר נטילת התרופה המרוסקת. במידת הצורך, הרופא שלך עשוי לתת לך טבליות ריבר טבע מרוסקות דרך צינור הזנה לקיבה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

יש ליטול ריבר טבע כל יום עד שהרופא יורה לך להפסיק.

הרופא יחליט לגבי משך הטיפול בתרופה.

צורת הנטילה

חובה ליטול את התרופה עם מזון ומומלץ לבלוע את הטבלייה עם מים. במידה וקשה לך לבלוע את הטבלייה בשלמותה, דבר עם הרופא שלך על דרכים אחרות ליטול ריבר טבע. ניתן לרסק את הטבלייה ולערבב עם מים או מחית תפוחים מיד לפני נטילתה.

יש לאכול מיד לאחר נטילת התרופה המרוסקת.

במידת הצורך, הרופא שלך עשוי לתת לך טבליית ריבר טבע מרוסקת דרך צינור הזנה לקיבה. אין מידע לגבי חצייה/ליסה. נטילת התרופה באותו זמן בכל יום, תסייע לך לזכור את נטילתה.

אם אתה יורק את המנה או מקיא

- אם חלפו פחות מ-30 דקות לאחר נטילת ריבר טבע, יש ליטול מנה חדשה.
- אם חלפו יותר מ-30 דקות לאחר נטילת ריבר טבע, אין ליטול מנה חדשה. במקרה זה, יש ליטול את המנה הבאה של ריבר טבע במועד המתוכנן הבא.

יש לפנות לרופא אם אתה יורק את המנה או מקיא לאחר נטילת ריבר טבע שוב ושוב.

אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר עליך לפנות מיד לרופא המטפל. נטילת ריבר טבע יתר על המידה מגבירה את הסיכון לדימום.

אם נטלת מנת יתר או אם טבעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש

- מבוגרים, ילדים ומתבגרים**
 - במינון של טבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג או ריבר טבע 20 מ"ג פעם ביום, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה או שתי מנות באותו יום! יש ליטול את המנה הבאה למחרת היום ובהמשך פעם ביום כרגיל ולהיוועץ ברופא.
- מבוגרים**
 - במינון של טבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג פעמיים ביום, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת. אין ליטול יותר משיט טבליות של ריבר טבע 15 מ"ג ביום אחד. ניתן ליטול שתי טבליות של ריבר טבע 15 מ"ג ביחד לקבלת מינון של 30 מ"ג ליום אחד. למחרת היום יש להמשיך וליטול טבלייה אחת של ריבר טבע 15 מ"ג פעמיים ביום.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל פשוט במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא מאחר שריבר טבע מטפל ומונע מצבים חמורים.

אם אתה מציב את נטילת התרופה אתה פוגע ביכולת הטיפולית והמניעתיית שלה.

אין ליטול תרופות בחושך בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרובכ משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בריבר טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

כמו תרופות להפחתת היווצרות קרישי דם דומות אחרות, ריבר טבע עלול לגרום לדימום. הסיכון העלול לסכן חיים. דימום חזק עלול לגרום לירידה פתאומית בלחץ הדם (שוק). בחלק מהמקרים הדימום עלול להיות סמוי.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה או הילד סובלים מאחת מתופעות הלוואי הבאות:

סימנים לדימום:

דימום מוחי או תוך-גולגולתי (תסמינים יכולים לכלול כאב ראש, חולשה בצד אחד, הקאה, פרכוס, ירידה ברמת הכרחה ונקישות בצוואר. זהו מצב חירום רפואי חמור, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי!).

- דימום ממושך או מוגבר.
- חולשה ויציאת דופן, עייפות, חיוורון, סחרחורת, כאב ראש, נפיחות בלתי מוסברת, קוצר נשימה, כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס).

הרופא שלך יחליט האם דרושה השגחה צמודה או דרוש שינוי בטיפול.

סימנים ליטגובות עוריות חמורות:

- פריחה אינטנסיבית מתפשטת על העור, שלפוחיות או פצעים ברגמה ירית, למשל בפה או בעיניים (Stevens-Johnson syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis).
- דימום ממושך או מוגבר.
- חולשה ויציאת דופן, עייפות, חיוורון, סחרחורת, כאב ראש, נפיחות בלתי מוסברת, קוצר נשימה, כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס).

הרופא שלך יחליט האם דרושה השגחה צמודה או דרוש שינוי בטיפול.

סימנים ליטגובות עוריות חמורות:

- פריחה אינטנסיבית מתפשטת על העור, שלפוחיות או פצעים ברגמה ירית, למשל בפה או בעיניים (Stevens-Johnson syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis).

- תגובה לתרופה הגורמת לפריחה, לחום, דלקת של איברים פנימיים, להרגיות בדם ולחולי מערכת (תסמונת Dress). הדדירות של תופעות לוואי אלו הינה נדירה מאוד (עד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים).

סימנים ליטגובות אלרגיות חמורות:

- התנפחות הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון; קשיי בליעה; סרפדתקשיי נשימה; צניחה פתאומית של לחץ הדם.
- התדירויות של תגובות אלרגיות חמורות הינן נדירות מאוד (תגובות אנאפילקטיות, כולל שוק אנאפילקטי; עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים) או אינן שכיחות (אנגיואדמה ובתקת אלרגית; עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים).

תופעות לוואי נוספות שדווחו במבוגרים, בילדים ובמתבגרים

תופעות לוואי שכיחות (Common) (תופעות שעלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים):

- ירידה בתאי דם אדומים העלולה לגרום לחיוורון, לחולשה או לקוצר נשימה
- דימום בקיבה או במעי, דימום באיברי המין והשתן (כולל דם בשתן ודימום וסתי מוגבר), דימום מהאף, דימום בחניכיים
- דימום לתוך העין (כולל דימום מלבון העין)
- דימום לתוך רקמה או חלל בגוף (שטף דם פנימי מקומי, חבלה)
- שיעול דמי
- דימום מהעור או מתחת לעור
- דימום לאחר ניתוח
- דליפה של דם או נוזל מפצע ניתוחי
- נפיחות בגפיים
- כאב בגפיים
- תפקוד לקוי של הכליות (יכול להתגלות בבדיקות המבוצעות על-ידי הרופא)
- חום
- כאב בטן, קשיי עיכול, בחילה או הקאה, עצירות, שלשול
- לחץ דם נמוך (תסמינים לכך יכולים להיות סחרחורת או עלילפון כאשר אתה נעמד)
- ירידה כללית בכוח ובאנרגיה (חולשה, עייפות), כאב ראש, סחרחורת
- פריחה, גרד בעור

בדיקות דם יכולות להצביע על עלייה באנזימי כבד מסוימים

תופעות לוואי שאינן שכיחות (Uncommon) (תופעות שעלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים):

- דימום תוך-מוחי או תוך-גולגולתי (ראה למעלה, "סימנים לדימום")
- דימום לתוך מפרק הגורם לכאב ולנפיחות
- טרומבוציטופניה (מספר נמוך של טסיות דם, שהן תאים שמסייעים לקרישת הדם)
- תגובות אלרגיות, כולל תגובות אלרגיות בעור
- תפקוד לקוי של הכבד (יכול להתגלות בבדיקות המבוצעות על-ידי הרופא)
- בדיקות דם יכולות להצביע על עלייה בבילירובין, באנזימים מסוימים של הלבלב או של הכבד או במספר הטסיות עלילפון
- תחושה כללית לא טובה
- דופק מואץ
- יובש בפה
- סרפדת (אוזנידקריה)

תופעות לוואי נדירות (Rare) (תופעות שעלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים):

- דימום לתוך שריר