

עלון לצרכן לפי תקנות הרחיקים (תכשירים) – התשמ"ב – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אקטיק[®] **200 מיקורגם**
אקטיק[®] **400 מיקורגם**
אקטיק[®] **600 מיקורגם**
אקטיק[®] **800 מיקורגם**
אקטיק[®] **1200 מיקורגם**
אקטיק[®] **1600 מיקורגם**

טבליות דחוסות על מקל למתן דרך ריריות חלל הפה

הרכב: כל בטבליה דחוסה על מקל מכילה:

אקטיק 200 מ"ג: פנטניל (כציטראט) 200 מ"ק"ג (Fentanyl [as citrate] 200 mcg)
אקטיק 400 מ"ג: פנטניל (כציטראט) 400 מ"ק"ג (Fentanyl [as citrate] 400 mcg)
אקטיק 600 מ"ג: פנטניל (כציטראט) 600 מ"ק"ג (Fentanyl [as citrate] 600 mcg)
אקטיק 800 מ"ג: פנטניל (כציטראט) 800 מ"ק"ג (Fentanyl [as citrate] 800 mcg)
אקטיק 1200 מ"ג: פנטניל (כציטראט) 1200 מ"ק"ג (Fentanyl [as citrate] 1200 mcg)
אקטיק 1600 מ"ג: פנטניל (כציטראט) 1600 מ"ק"ג (Fentanyl [as citrate] 1600 mcg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואולרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. זה עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

בנוסף לעלון, לתכשיר אקטיק קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, בעיקר לרעת, קיים התחלת הטיפול במהלך הטיפול באקטיק ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס המידע הבטיחותי למטופל ובעלון לצרכן לפני תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

<div></div>
<p>תרופות ממשפחת האופיאידים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והינן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית אך לגרום למוות. ודא כי הינן מכיי את שם התרופה, המינון שהינן לוקה, תדירות המתן, קשי הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים. מידע נוסף אודות הסיכון ללקות בהתמכרות ניתן למצוא בקישור:</p> <p>https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/Doclib/opioids_he.pdf</p>
<p>נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית (כולל מיםים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת שינויות עמוקה, קשי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.</p>

1. למה מיועדת התרופה?

אקטיק נועד לטיפול בכאב מתפרץ בחולי סרטן מבוגרים ומתבגרים מגיל 16 ומעלה שכבר נטלים תרופות אופיאידיות אחרות לשיכון כאבים מתמשכים, ושגופם הורגל לטיפול (סבליות לאופיאידים).

קבוצה תרופטית

משך כאבים ממושך מומלץ לטיפול באקטיק (נרקוטיקה).

כאב מתפרץ הוא כאב פתאומי נוסף, המתרחש פתאום, על אף נטילת התרופות הרגילות שלך לשיכון כאבים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

<ul style="list-style-type: none">איתך משתמש באופן קבוע בתרופה האופיאידית שנרשמה עבורך (כגון קודאין, פנטניל, הידרומורפון, מורפין, אוקסיקודון, פתידין), כל יום לפי לוח זמנים קבוע, במשך שבוע לפחות, לשיכון כאבים מתמשכים. אם אינך משתמש בתרופות אלו אין ליטול אקטיק, מאחר והדבר עלול להגדיל את הסיכון לך שהנשימה תהיה איטית ו/או שטחית באופן מסוק, או אפילו לגרום להפסקת הנשימה. אתה רגיש (אלרגי) לפנטניל או לכל אחד מהמרכיבים הנספיים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6). אתה נוטל מנכבי מנואמיין אוקסידאז (MAOI) (תרופות לטיפול בדיכאון חמור) או נטלת אותם בשבועיים האחרונים (אם סעיף 2 תחת "לפני השימוש בתרופות אלו"). אתה נוטל תרופה המכילה סודיום אוקסיבאט (sodium oxybate). אתה סובל מבעיות נשימה חמורות או מבעיות ריאה המלוות בחסימה ריאתית. אתה סובל מכאב קיצר טווח (כאב טווח נובע מפציעות, ניתוח, כאבי ראש או מיגרנות), שאינו כאב מתפרץ.
<p>אל תשתמש באקטיק אם אחד מהמבצים המפורטים לעיל לרונטני עבורך. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא שלך או ברוקח לפני שימוש באקטיק.</p>

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

במהלך הטיפול באקטיק יש להמשיך להשתמש בתרופה האופיאידית לשיכון הכאבים המתמשכים הנובעים מהסרטן.

אחסן תרופה זאת במקום בטוח ושומר שבו לאנשים אחרים אין גישה אליו. למידע נוסף ראה סעיף 5- "איך לאחסן את התרופה?".

לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם:

- אתה חולה במחלה המשפיע על הנשימה שלך (כגון אסטמה, צפצופים או קוצר נשימה).
- אתה סובל מחבלת ראש או מאובדן הכרה כלשהו.
- יש לך בעיות בלב, במיוחד קצב בלתי נאיטי.
- יש לך בעיות בכבד או בכליות – הן יפגעו על אופן פירוק התרופה בגופך.
- יש לך לחץ דם נמוך כתוצאה מממות נמוכה של נוזלים במחזור הדם.
- יש לך סוכרת.
- אתה מגיל 65 – ייתכן שתצטרך מינון נמוך יותר. כל העלות מינון יתבחן בהזריחה רבה על ידי הרופא שלך.
- אתה נוטל תרופה ממשפחת הבנזודיאזפינים (ראה סעיף 2 תחת "תגובות בין תרופתיות"). שימוש בבנזודיאזפינים עלול להגביר את הסיכון לתופעת תופעות לוואי ממושכות כולל מוות.
- אתה משתמש בתרופות נוגדות דיכאון או תרופות אנטי פסיכיות (מעכבי ספיגה חזרת סלקטיבים של סרטונין [SSRIs], מעכבי ספיגה חזרת של סרטונין ונוראפיפרין [SNRIs], מעכבי מנואמיין אוקסיאז [MAOI]). ראה סעיף 2 תחת "אין להשתמש בתרופה אם" ותחת "תגובות בין תרופתיות"). שימוש באקטיק אלו יחד עם אקטיק **יכול להוביל למצב עלול להיות מסכן חיים הנקרא "תסמונת סרטונין"** (ראה סעיף 2 תחת "תגובות בין תרופתיות"). השתמשת לרעה או התמכרת לאופיאידים או תרופות אחרות, אלכוהול או סמים אל חוקיים.
- פיתחת כבבר, במהלך שימוש באופיאידים, אי ספיקת יותרת הכליה (מצב בו בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות מספיק הורמונים) או חוסר בהורמוני מין (חוסר באדרוגנים) (ראה סעיף 4 תחת "תופעות לוואי חמורות").
- אתה צורך אלכוהול; אמא ראה סעיף "שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול".

במהלך הטיפול באקטיק היוועץ ברופא אם:

אם אתה חווה כאב או רגישות מוגברת לכאב (היפראלגיה) אשר אינו מגיב למינון גבוה יותר של התרופה כפי שרשם על ידי הרופא שלך.

יש לך סימנים של עששת. אקטיק מכיל כ-2 גרם סוכר; שימוש תכנן עלול להגביר את הסיכון לעששת שעלולה להיות חמורה. חשוב לטפל היטב בשיניים במהלך הטיפול באקטיק. אתה חווה שילוב של התסמינים הבאים: בחילה, הקאה, חוסר תיאבון, עייפות, חולשה, סחרחורת ולחץ דם נמוך. הפועת תסמינים אלו יחד עלולה להעיד על מצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא כשל יותרת הכליה – במצב זה בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות מספיק הורמונים.

אקטיק עלול לגרום להפרעות נשימה הקשורות לשינה כגון קושי לנשום בזמן השינה (אפנאה-זום חום) ולרמות מתגן נמוכות בדם (היפוקסמיה). התסמינים יכולים לכלול הפסקות נשימה בזמן השינה, התעוררות לילית כתוצאה מקוצר נשימה, קושי בשימור השינה או שינויות יתר במהלך היום. אם אתה או אדם אחר מבחין בתסמינים אלו, פנה אל הרופא שלך.

ייתכן שהרופא שלך ישקול להפחית את מינון התרופה.

שימוש לרופא אחר וסבליות לתרופה

תרופה זו מכילה פנטניל שהיא תרופה אופיאידית. שימוש חוזר ונשנה במשככי כאבים אופיאידים עלול לגרום לכך שיעילות התרופה תפחת (אתה מתרגל לתרופה, תופעה המכונה סבליות לתרופות). אתה עלול גם להיות רגיש יותר לכאב בזמן השימוש באקטיק. תופעה זו ידועה בשם היפראלגיה. הגדלת מינון אקטיק עשויה לעזור בהפחתת הכאב לזמן מה, אך היא עלולה גם להזיק. אם אתה שם לב שיעילות התרופה פוחתת, היוועץ עם הרופא. הרופא יחליט אם עדיף להעלות את המינון או להפחית בהדרגה את השימוש באקטיק.

תלות והתמכרות

שימוש חוזר ונשנה בקטיק גורם לתלות, וכן עלול לגרום לשימוש לרעה ולהתמכרות, שעלולים לגרום למינון יתר מסכן חיים. הסיכון לתופעות לוואי אלו יכול לעלות עם מינון גבוה יתר ומשך השימוש ארוך יותר. תלות או התמכרות יכולים לגרום לתחושה שאתה כבר לא שולט בכמות התרופה או בתדירות שאתה צורך להשתמש בה. אתה עשוי להרגיש שאתה צורך להמשיך ולהשתמש בתרופה, גם כאשר השימוש בה אינו עוזר לך להקל על הכאב.

הסיכון לתלות או להתמכרות משתנה מאדם לאדם. ייתכן שיהיה לך סיכון גדול יותר להיות תלוי או מכור לאקטיק אם:

• אתה או מישהו ממשפחתך השתמש לרעה או התמכר לאלכוהול, תרופות מרשם או סמים לא חוקיים ("התמכרות").

- אתה מעשן.
- היו בעיות במצבר הנפשי (דיכאון, חרדה או הפרעת אישיות) או טופלת על ידי פסיכיאטר בגין מחלות נפש אחרות.

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הבאים בזמן השימוש באקטיק, זה יכול להיות סימן שהפכת תלוי בתרופה או התמכרת אליה:

- יש לך צורך ליטול את התרופה למשך זמן רב יותר ממה שהומלץ על ידי הרופא.
- יש לך צורך במינון גבוה יותר מהמומלץ.
- אתה מרגיש רגוע' אל תלמוד להיטול את תרופת המהמרה שבגינה ניתנה לך התרופה, למשל, כדי 'להישאר רגוע' אל תלמוד לך לישון".
- עשית ניסיונות חוזרים ונשנים, שלא צלחו, להפסיק או לשלוט בשימוש בתרופה.
- כאשר אתה מנסה לציטור את התרופה אתה מרגיש את טוב (למשל בחילות, הקאות, שלשולים, חרדות, עצמורות, רעד וזעה), ואתה מרגיש טוב יותר לאחר שימוש חוזר בתרופה ("תופעות גמילה").

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הללו, התייעץ עם הרופא כדי לדון בדרך הטיפול הטובה ביותר עבורך. כולל מתי ינון להפסיק יוצר להפסיק בצורה בטוחה.

פנה לעזרה רפואית מיידידת אם:

אתה חווה תסמינים כגון קושי בנשימה או סחרחורת, נפיחות של הלשון, השפתיים או הגרון במהלך השימוש באקטיק, אלו עלולים להיות תסמינים מוקדמים לתגובות אלרגיות חמורות (אנפילקסיס/רגישות יתר, ראה סעיף 4 תחת "תופעות לוואי חמורות").

ילדים ומתבגרים

אקטיק אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אל תשתמש בתרופה וספר לרופא או לרוקח אם:

- אתה נוטל תכשירי פנטניל אחרים שנרשמו לך בעבר לכאב מתפרץ. אם אתה עדיין מחזיק בחלק מתכשירי פנטניל אלה בבית עלך להיוועץ ברוקח לגבי אופן השמדתם.
- אתה נוטל תרופות מקבוצת מעכבי מנואמיין אוקסיאז (MAOI) (תרופות לדיכאון חמור) או נטלת אותם בשבועיים האחרונים (אם סעיף 2 תחת "אין להשתמש בתרופה אם" ותחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם").

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות הרגעה כמו בנזודיאזפינים או תרופות דומות – שימוש בו זמני עם אקטיק מעלה את הסיכון לשינויות, קשיים בנשימה (דיכוי נשימה), תרדמת ועלול להיות מסכן חיים. לכן קא גם אפשרויות טיפול אחרות אינן אפשריות, שימוש משולב ילקח בחשבון.
- אם הרופא שלך יחליט על טיפול משולב, המינון נמשך לטיפול יוגבל על ידו.
- ספר לרופא על כל תרופות ההרגעה שאתה נוטל (לדוגמא כדרי שינה, תרופות לטיפול בחרדה, תרופות מסוימות לטיפול בתגובות אלרגיות (אנטי-היסטמינים) או תרופות הרגעה אחרות). יש למלא אחר הוראות הרופא בקפידה. מומלץ שתסביר להורים ולקרובים שלך איך לזהות את הסימנים והתסמינים שתוארו לעיל. צור קשר עם הרופא שלך כאשר אתה חווה תסמינים כאלה.
- תרופות מסימות הרפייית שרירים לדוגמא בקלופן, דיאזפאם (ראה גם "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- תרופות העלולות להשפיע על פירוק אקטיק בגופך, כגון ריטונביר או תרופות אחרות המסייעות לשלוט בדיהום HIV, תרופות אחרות המכונות "מעכבות CYP3A4" כגון טקונוזול, איטראקונזול, או פלוקוזול (ממששות לטיפול בזיהומים וטריותיים), סטרלודינומיון, קלריתרמיצין, או אריתרמיצין (תרופות לזיהומים חיידיקים) ותרופות המכונות "מפגעי CYP3A4 כגון ריפמיצין או ריפאבוטין (תרופות לזיהומים חיידיקים), קורמפיץ, פנוברביטאל או פינטאויין (תרופות המשמשות לטיפול בפרסוסים).
- גופים מסוימים של משככי כאבים חזקים הנקראים אגוניסטים חלקיים/אנטגוניסטים כגון גרופורנין, נלבופין ופנטאניל (תרופות לטיפול בכאב). אתה עלול לחוות תסמונת גמילה (בחילה, הקאה, שלשול, חרדה, עצמורות, רעד וזעה) במהלך השימוש בתרופות אלו.
- משככי כאבים מסוימים המיועדים לשיכון כאב עצבי (בגפנטין ופרגבלין).
- תכשירים רפואיים סרטונגריים המשמשים לטיפול בדיכאון (תרופות נוגדות דיכאון כגון: מעכבי ספיגה חזרת סלקטיבים של סרטונין [SSRIs], מעכבי ספיגה חזרת של סרטונין ונוראפיפרין [SNRIs] או תרופות אנטי פסיכיות). השימוש בתרופות אלו יחד עם אקטיק יכול להוביל למצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא "תסמונת סרטונין" (ראה סעיף 2 תחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם, ו"אין להשתמש בתרופה אם"). התסמינים של תסמונת סרטונין יכולים לכלול שינויים במצב נפש (כגון אי-שקט, הזיות ותרדמת) והשפעות אחרות כגון חום גוף מעל 38°C, עלייה בקצב הלב, לחץ דם אל יציב, התעצמות רפלקסים, קשיון שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תופעות במערכת העיכול (כגון בחילה, הקאה, שלשול). הרופא ישקול האם אקטיק מתאים עבורך.

אם אתה לקראת ניתוח הדרש הרדמה מלאה היוועץ ברופא.

שימוש בתרופה ומזון ושתייה

- בין לטיפול אקטיק לפני או אחרי ארוחות. אבל אין להשתמש במהלך הארוחות.
- ניתן לשתות מעט מים לפני נטילת אקטיק על מנת להרטיב את הפה, אבל אין לשתות או לאכול דבר בזמן השימוש באקטיק.
- אין לשתות מים אשכוליות במהלך השימוש באקטיק מאחר והדבר עלול להשפיע על פירוק התרופה בגוף.

שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול במהלך השימוש באקטיק. הדבר עלול להגביר את השכיחות לתופעות לוואי חמורות כולל מוות.

היריון והנקה

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת היריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

הרייון

אין להשתמש בתרופה במהלך ההיריון אלא בהוראת הרופא שלך. אם נעשה שימוש ממושך באקטיק במהלך ההיריון, קיים סיכון לתופעת תסמני גמילה אצל הלידוד שעלולים להיות מסכני חיים אם לא יזוהו ויטופלו על ידי הרופא (ראי סעיף 4 תחת "תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה").

אין להשתמש באקטיק במהלך הלידה מאחר ופנטניל עלול לגרום לקשיי נשימה בילוד.

הנקה

פנטניל יכול להיות מופרש בחלב אם ועלול לגרום לתופעות לוואי בתינוק יונק. אין להשתמש באקטיק אם את מיניקה. אל תתחילי בהנקה עד לפחות 5 ימים מהמנה האחרונה של אקטיק.

הגיגה ושימוש במכונות

התרופה עלולה להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש בכלים או במכונות המשלש השעות הראשונות לאחר ברופא האם בטוח עבורך לנהוג או להשתמש בכלים או במכונות.
אם אתה מרגיש ישנוני או מסוחרר, יש לך שטטוש ראייה באקטיק. אין לנהוג או להפעיל מכונות אם אתה מרגיש ישנוני או מסוחרר, יש לך שטטוש ראייה או ראייה כפולה או אם יש לך קושי להרדמ.

חשוב שתדע כיצד אתה מגיב לאקטיק לפני הנהיגה או שימוש בכלים או במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אקטיק מכיל סוכרז. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי סבליות לסוגים מסוימים של סוכר, היוועץ ברופא לפני השימוש באקטיק. אקטיק עלול להזיק לשיניים. אקטיק מכיל גלוקוז. כל בטבליה מכילה כ-1.89 גרם גלוקוז. אם יש לך סוכרת, עליוך לקחת זאת בחשבון. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי סבליות לסוגים מסוימים של סוכר, היוועץ ברופא לפני השימוש באקטיק. אקטיק עלול להזיק לשיניים.

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הכותב.

עליוך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. לפני תחילת הטיפול באופן קבוע במהלך הטיפול, הרופא ידון איתך גם על מה אתה יכול לצפות משימוש באקטיק, מתי עליוך לקחת את התרופה, מתי לפנות לרופא ומתי עליוך להפסיק את התרופה (ראה סעיף 2- "לפני השימוש בתרופה").

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כאשר תתחיל לראשונה להשתמש באקטיק, הרופא יקבע יחד איתך את המינון המתאים לשיכון הכאב המתפרץ.

חשוב מאוד שתשתמש באקטיק בדיוק כפי שהרופא הורה לך.

אין לשתות את המינונים של אקטיק או של תרופות אחרות לכאב עד דעת עצמך. שינוי במינון חייב להירשם ולהיבדק על ידי הרופא.

אם אינך בטוח לגבי המינון המתאים או אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש בתרופה עליוך לפנות לרופא.

כיצד התרופה נספגת בגופך

- כאשר אתה ממקם את הטבליה בפיו;
- הטבליה מתמוססת והחומר הפעיל משתחרר. התהליך אורך כ-15 דקות.
- החומר הפעיל נספג דרך רריות יתלי הפה אל תוך מחזור הדם.
- שימוש בתרופה באופן זה מאפשר ספיגה מהירה, כלומר התרופה תשכך את הכאב המתפרץ במהירות.

במהלך התאמת המינון

במהלך השימוש באקטיק אתה אמור להתחיל להרגיש הקלה מסוימת באופן מהיר. עם זאת, במהלך התאמת המינון ששולט בכאב המתפרץ, ייתכן שלא תחוש הקלה מספקת בכאב 30 דקות לאחר תחילת השימוש ביחידת אקטיק אחת (15 דקות מסיום יחידת אקטיק בפרך). במקרה זה, ייתכן שהרופא יאפשר לך להשתמש ביחידת אקטיק שנייה באותו החזקת עבור אותו אירוע של כאב מתפרץ. אין להשתמש ביחידה שנייה אלא בהוראת הרופא בלבד. בשום אופן אין להשתמש ביותר משתי יחידות לטיפול באירוע בודד של כאב מתפרץ.

במהלך התאמת המינון, ייתכן שתצטרך להיחזק בביתך יותר מחזקת אחד של אקטיק. עם זאת, יש לשמור רק יחידות אקטיק בחזקת שהינך צורך, על מנת למנוע אפשרות של בלבול או מינון יתר. היוועץ ברוקח כיצד להשליך את היחידות שאינך צוקק להן.


בכמה יחידות יש להשתמש

לאחר שנמצא המינון המתאים יחד עם הרופא שלך, השתמש ביחידה אחת עבור אירוע של כאב מתפרץ. פנה לרופא אם המינון של אקטיק שנקבע עבורך אינו משכך את הכאב המתפרץ במשך מספר אירועים רצופים של כאב מתפרץ. הרופא יחליט אם יש צורך לשנות את המינון. עליוך לספר מייד לרופא אם אתה משתמש באקטיק יותר מ-4 פעמים ביום, כיוון שיתכן שיש צורך בשינוי משטר הטיפול שלך. ייתכן שהרופא ישנה את הטיפול בכאב המתמשך שלך; כאשר הכאב המתמשך נמצא תחת שליטה, הרופא ישקול שינוי במינון של אקטיק. אם הרופא שלך חושש שפיתחת רגישות מוגברת לכאב שקשורה לאקטיק (היפראלגיה), ייתכן שהוא ישקול הפחתת הבינון של תלמוד ל"אזהרות מיוחדות להנעת לשימוש בתרופה"). להשגת הקלה מיטבית, ספר לרופא על הכאב שלך וכיצד אקטיק משפיע עליוך, על מנת לשנות את המינון במידת הצורך.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

פתיחת האריזה – כל יחידה של אקטיק אטומה באריזת מגנטית (בלוטר) נפרדת. פתח את אריזת המגנטית כאשר אתה מוכן להשתמש באקטיק. אל תפתח בליה (ראה סעיף 2- "לפני השימוש בתרופה").

מקם את המספרים שציינו בקצה של יחידת האקטיק ותוהן' את קצה המגנטית בהתאם לסימון שמודפס על גביה.



משוך את מכסה המגנטית המודפס עד להפרדה מלאה שלו מהמגנטית.

הוצא את יחידת אקטיק מאריזת המגנטית והכנס אותה מייד לפה.

שימוש ביחידת אקטיק

הנח את הטבליה בין הלחל לחניכיים.
אתה צריך שימוש במקל, סובב את הטבליה בחלל פוך, במיוחד לאורך הלחי. סובב את המקל לעיתים קרובות.



- סיים את הטבליה תוך 15 דקות להשגת ההקלה המירבית. אם תסיים מהר מדי – תבלעו יותר מהתרופה ותשיג פחות הקלה בכאב המתפרץ.



אין לנגוס או ללעוס את הטבליה, על מנת למנוע רמות נמוכות יותר בדם של התרופה ופחות הקלה בכאב לעומת שימוש בהתאם להוראות.

אם מסיבה כלשהי אינך מסים את כל הטבליה בכל פעם שיש לך כאב מתפרץ, ספר לרופא שלך על כך.

מהי יחידת השימוש באקטיק?

אל תשתמש ביותר מ-4 יחידות אקטיק ביום, לאחר מציאת המינון ששולט ביעילות בכאב שלך, אם אתה חושב שיתכן שתצטרך להשתמש ביותר מ-4 יחידות אקטיק ביום, ספר לרופא מייד.

כמה יחידות אקטיק יש ליטול?

אין להשתמש ביותר משתי יחידות לטיפול בכל אירוע בודד של כאב מתפרץ.

אם נטלת בטעות מנת יתר

תופעות הלוואי השכיחות ביותר כתוצאה משימוש יתר: תחושת שינויות, בחילה או סחרחורת. אם אתה מתחיל לחוש מסוחרר, בחילה או ישנוני מאוד לפני התמוססות מלאה של הטבליה, עליוך להוציאה מהפה ולהיעזר עזרה.

תופעות לוואי חמורה של אקטיק הניה נשימה איטית ו/או שאיט שדי. את עלולה להופיע במידה והמינו