

كيتوزول شامبو

يحتوي كل 1 غرام شامبو على:

Ketoconazole 20 mg كيتوكونازول 20 ملغم الماد غير الفعالة وموادات الحساسية في المستحضر

- أنظر الفقرة 6 'معلومات إضافية'.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا

توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين.

فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية

مشابهة لحالتك.

(1) لأى غرض مخصص الدواء؟

كيتوزول شامبو مخصص لعلاج التهاب الجلد الدهني

(seborrhoeic dermatitis) والقشرة نتيجة تلوث

Pityriasis فطري مثبت، وعلاج النخالية المبرقةة (versicolor)

الفصيلة العلاجية:

مستحضرات مضادة للفطريات من فصيلة الإيميدازولات.

بالمشابه لأنواع أخرى من الشامبو، فإن الشامبو يحتوي

أيضاً على مرکبات لتنظيف شعرك.

يُعالج الشامبو حالات طبية التي قد تترافق بحكة. تتجمّع

هذه الحالات عن فطر يسمى الملاسيزيا (Malassezia).

هذا الفطر موجود على جلد كل شخص، لكن أحياناً بإمكانه

أن يتکاثر و يؤدي إلى مشاكل. يعمل كيتوزول شامبو عن

طريق إبادة الفطر.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال كيتوزول شامبو إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة كيتوكونازول أو لكل واحد من المرکبات الإضافية التي يحتويها الشامبو (أنظر الفقرة 6 'معلومات إضافية').
- لا تستعمل كيتوزول شامبو إذا إنطبقت عليك الجملة المذكورة أعلاه. إذا لم تكن واثقاً، تحدث عن ذلك مع الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال كيتوزول شامبو.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ كيتوزول شامبو إحك للطبيب إذا:

- كنت تستعمل مستحلب أو كريم على شعرك الذي يحتوي على ستيرونيدات، مثل بيتاميثازون أو هيدروكورتيزون:

● عليك أن تقلل تدريجياً من إستعمال المستحلب أو الكريم خلال 2-3 أسابيع الأولى من العلاج بـ كيتوزول شامبو.

● بهذه الطريقة يتم وقف إحتدام حالتك الصحية في الوقت الذي يبدأ فيه كيتوزول شامبو بالعمل.

إذا توفرت لديك أسئلة حول التوقف عن إستعمال المستحلب أو الكريم الذي يحتوي على ستيرونيدات، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

الأطفال والمراهقون:

كيتوزول شامبو غير مخصص لإستعمال لدى حديثي الولادة والأطفال.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية

أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات

غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ

الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تستعمل كريم أو مستحلب يحتوي على ستيرونيدات للعلاج على فروة الرأس (أنظر الفقرة 'تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء'). عادة لا يتدخل كيتوزول شامبو مع أدوية أخرى.

الحمل والإرضاع:

بإمكان إستعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة. إنستيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء كان وذلك إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

السياحة وإستعمال الماكنتات:

من غير المتوقع أن يؤثر كيتوزول شامبو على القدرة على السياحة أو تشغيل الماكنتات.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

إن وَئِيرَة إستعمال كيتوزول شامبو تتعلق بنوع التلوث: المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

التهاب الجلد الدهني (Seborrhoeic dermatitis)

والقشرة: يجب إستعمال الشامبو مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين حتى 4 أسابيع.

النخالية المبرقةة (Pityriasis versicolor): يجب الإستعمال مرة في اليوم 1-5 أيام.

إنسل وصوبن الجلد المصاص أو فروة الرأس بواسطة كيتوزول شامبو وإنظر لمدة 3-5 دقائق قبل الشطف. تأكد من أنك تصوبن الجلد ذاته بشكل جيد وفروة الرأس وليس فقط الشعر.

كما هو متبع في إستعمال مستحضرات شامبو أخرى، يجب تجنب التماس مع العينين.

في حالة تماش الشامبو مع منطقة العينين فيجب غسل العينين بواسطة الماء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

للإستعمال الخارجي فقط.

لا يجوز بلع كيتوزول شامبو.

إذا حدث وبلغت أنت أو بلع طفالك بالخطأ من الدواء، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضار عليه الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز إستعمال مقدار دوائي مضاعف. إستعمل المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كيتوزول شامبو قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعانى أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال كيتوزول شامبو وإن التوجه فوراً للطبيب إذا لاحظت أو لديك شك بإحدى الأعراض التالية. من الجائز أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ.

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة پاداچيس بواسطة العنوان التالي:

Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
- لا تسبب التقىء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر القنينة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. يجب الحماية من الضوء.
- بعد الفتح للمرة الأولى للقنينة يجب الإستعمال خلال 4 أسابيع.

6) معلومات إضافية

يحتوي الشامبو بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:
Sodium Lauryl Ether Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide, Imidurea, FD&C Red #40, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
كيتوزول شامبو عبارة عن سائل لزج بلون برتقالي - أحمر بحجم 100 مل.

صاحب الإمتياز والمنتج: پاداچيس إسرائيل فارماسيكتيكا شارع راكيفيت 1 شوهام إسرائيل.

تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 138.73.31583
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

أعراض التي يمكن أن تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 100:

• تهيج شديد أو إحمرار الجلد في منطقة إستعمال الشامبو، أو علامات أخرى لحساسية خلال الأيام الأولى للعلاج.

أعراض التي يمكن أن تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 1,000:

• رد فعل تحسسي، إنفاس الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الرقبة، الذي قد يؤدي إلى صعوبات في البلع أو في التنفس.

• تقشر الجلد أو حويصلات.

توجه إلى الطبيب أو الصيدلي بأسرع ما يمكن إذا كنت تلاحظ أو لديك شك بإحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100):

• إلتهاب جذور الشعر.

• إنتاج زائد للدموع.

• تساقط أو خفة شادة للشعر.

• جفاف الجلد، طفح، الشعور بحرقة.

• تغيرات في الإحساس بشعرك.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000):

• تضرر حاسة التذوق.

• تهيج في العينين.

• حب الشباب.

• تقرشات في الجلد.

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

• شرى (رد فعل تحسسي).

• تغير في لون الشعر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية:

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>