

הירין, הנקה ופוריות
אם את בהירין או מיניקה, חשבת שאת אול' בהירין או מתכנת להרות, היועצى ברופא לפני תרופה זו.

הירין
אין לשמש בזופסיה במילר הירין, אם את מוגה להרות, או שאת איששה שכלה להרות ואין משתמש באטען מניה עילום. אם נעשה שימוש בזופסיה במהלך הירין, קיימן סיכון למלק לעבר. אם את איששה שכלה להרות, הרופא יידע ואטרק לב' ינון להיפוי שתתנייל טיפול בזופסיה ויבש מרק לעבר בדיקת הירין כדי לוודא שאריך בהירין. עלי'ך לשמש באטען מניה עילום בדמן לטילת זופסיה ולשרף לפחות 3 וחודשים לאחר שטפסקי ליטול אותה. שאל' את הרופא על שיטות אמינותו לוגונעת הירין.

הרופא יתני לך חוברת מידע בטיחותי למיטופיל/לטיפול וכרטיסים תזכורת בנושא הירין שמסבירים למה עלי'ך להמען מהירין כאשר את נטלה זופסיה. הרופא החליט להפסיק את הטיפול (ראי' סעיף "אם אתה מפסיק ליטול זופסיה" בפרק 3). יובוז מעקב הירין מיה.