



338

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب أنظمة الصيدلة فقط

أچيسرك 16

أقراص

التركيز:

يحتوي كل قرص على: 16 ملغ بيتاهيستين ديهيدروكلوريد

(Betahistine dihydrochloride 16 mg)

المواد غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء للعلاج من آ杰ل. لا تتعاطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حاليهم الطبي مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج متلازمة منيير.

لعلاج أمراض الدوار المحيطي.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الدوار.

يحتوي أچيسرك 16 على بيتاهيستين الذي يعتبر قرين للهيستامين الذي يستعمل

لعلاج أمراض متلازمة منيير:

دوار (فيرتيغ)، طنين في الأذنين (tinnitus)، فقدان السمع أو صعوبة في السمع.
يعمل أچيسرك 16 على تحسين جريان الدم في الأذن الداخلية، الأمر الذي يقلل من تراكم الضغط.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كثت مسأساً (أرجي) لـ بيتاهيستين (المادة الفعالة) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- كثت تعاني من درم في الغدة الكظرية (ورم خلايا الكروماتين القاتمة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ أچيسرك 16 إستشر الطبيب إذا:

• كثت تعاني من الربو.

• كثت تعاني من قرحة في المعدة (Ulcer).

• كثت حاملاً، تعقدن بانك حامل، تخططين للحمل.

• كثت مرضة.

إذا إنجلقت عليك إحدى الحالات الموصوفة أعلاه، فسوف يقدم لك الطبيب الإستشارة فيما إذا كان بدء تناول أچيسرك 16 آمناً بالنسبة لك.

من الجائز أن يرغب الطبيب أيضاً في متابعة حالة الربو لديك خلال العلاج بـ أچيسرك 16.

التدخلات/ التفاعلات بين الأدوية:

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إلّا أنّ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بـ أچيسرك 16 بالأخص إذا كنت تتناول:
- أدوية من فصيلة مثبطات مونأمين أوكتسيدار (MAOIs) لعلاج الإكتئاب أو مرض الباركنسون. قد تزيد هذه الأدوية من تأثير أچيسرك 16.
- أدوية مضادة للهيستامين التي قد تقلل من تأثير أچيسرك 16. كذلك، قد يقلل أچيسرك 16 من تأثير الأدوية المضادة للهيستامين.

الأطفال والمرأهقون:

لا يوصى بإستعمال أچيسرك 16 لدى أطفال دون عمر 18 سنة لعدم توفر ما يكفي من المعطيات حول السلامة والنجاعة.

إستعمال الدواء والطعام

بإمكان تناول أچيسرك 16 مع أو بعد الطعام.

الحمل والإرضاع:

- لا تتناول أچيسرك 16 خلال فترة الحمل، إلا إذا قرر طبيبك بأن هذا الأمر ضروري.
- لا يُعرف فيما إذا كان أچيسرك 16 ينتقل إلى حليب الأم. لا ترضعي أثناء تناولك أچيسرك 16، إلا إذا أوصاك طبيبك خلاف ذلك.

السياحة وإستعمال الماكنتات:

من غير المتوقع أن يضر أچيسرك 16 في قدرتك على السياحة أو إستعمال المعدات أو الماكنتات.

مع ذلك، تذكر بأن الأمراض التي من أجلها تتناول هذا الدواء (الدوار، طنين في الأذنين وفقدان السمع المتعلقة بمترلازمه منيير) قد تسبب لك الشعور بدوار أو بغثيان، وقد تؤثر على قدرتك على السياحة وتشغيل الماكنتات.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. سوف يلائم الطبيب المقدار الدوائي وفقاً لحالتك الطبية. من الجائز أن لا يكون تأثير أچيسرك 16 فوريًا. عليه الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي للكلار هو عادة: 16 ملغ ثلاث مرات في اليوم.

عند الحاجة، بالإمكان البدء بمقدار دوائي قدره 8 ملغ ثلاث مرات في اليوم.

إذا تطلب الأمر مقداراً دوائياً قدره 8 ملغ، فبإمكان إستعمال مستحضرات أخرى مسجلة في إسرائيل التي تحتوي على بيتاهيستين ديهيدروكلوريد 16 ملغ ضمن أقراص التي يمكن شطرها لتلقي 8 ملغ.

المقدار الدوائي اليومي يتراوح ما بين 24 إلى 48 ملغ ويوصى بتقسيمه إلى ثلاثة مقدابر دوائية بشكل متساوي على امتداد 24 ساعة للتأكد من أن نسبة الدواء في جسمك ثابتة. حاول تناول الأقراص في نفس الوقت من كل يوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب تخزين في مكان بارد، دون 25 درجة مئوية.

- يجب الحماية من الضوء ومن الرطوبة.

لا يجوز إلقاء أدوية في المجرى أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات على حماية البيئة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على -

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Talc, Citric acid monohydrate, Silica colloidal anhydrous.

- كف ييدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

الأقراص معبأة ضمن عبوات لوحة (بليستر). تحتوي كل عبوة على 30 قرصاً.

الأقراص مستيردة لونها أبيض وملعمة بخط للشطر في جانب واحد وفي الجانب الآخر مطبوعة بـ "أچيسرك".

- إسم المنتج وصاحب الإمتياز: باداچيس إسرائيل فارماستيکا م.ض، شارع راكيفيت 1، شوهام.

- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: أچيسرك 16 أقراص 056-8727365.

من أجل سهولة وتهوير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحديث هذه النشرة بموجب تعليمات وزارة الصحة في شهر أيلول 2023.

طريقة التناول: يجب بلع الدواء مع الماء. يفضل تناول الدواء مع الطعام.

السحق/الشطر/المضغ: من أجل تسهيل عملية البلع، بالإمكان عند الحاجة شطر القرص للإستعمال الفوري. يجب بلع كلا النصفين سوية بعد الشطر مباشرة، لا تتوفر معلومات حول السحق والمضغ.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أچيسرك 16 قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين.

لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لأن تعايني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية: ردود فعل تحسسية مثل:

- طفح جلدي أحمر أو إلتهاب وتهيج في الجلد.

- إنفاس في الوجه، في الشفتين، في اللسان أو في العنق. قد تسبب هذه صعوبات في التنفس.

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 100):

غثيان، صعوبات في الهضم، صداع.

أعراض جانبية إضافية:

تهيج، طفح، شرى (رد فعل تحسسي للأوعية الدموية في الجلد)، إضطرابات متعدلة في الجهاز الهضمي مثل تقيؤات، آلام في البطن والشعور بانفاس في البطن.

إن تناول أچيسرك 16 مع الطعام يساعد على تقليل هذه الأعراض.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعايني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبلیغ شركة باداچيس بواسطة الرابط:

www.padagis.co.il