



יוני 2024

פיזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ  
רח' שנקר 9, ת.ד. 12133  
הרצליה פיתוח, ישראל 46725  
טל: 972-9-9700500 פקס: 972-9-9700501

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

ברצוננו להודיעך על עדכון בעלון לרופא בלבד של **NEURONTIN 400& 300 MG** :

GABAPENTIN 300 & 400 mg

Epilepsy:

- Gabapentin is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial seizures with and without secondary generalization in adults and adolescents (age 12 and up) with epilepsy.
- Treatment of neuropathic pain
- Gabapentin is indicated for the treatment of neuropathic pain in diabetic neuropathy or postherpetic neuropathy (neuralgia) in adults.

### שינויים עיקריים בעלון לצרכן:

#### היריון, הנקה ופוריות

לפני נטילת התרופה יש להיוועץ ברופא אם את בהיריון או מניקה, אם את חושבת שיתכן שאת בהיריון או אם את מתכננת להיכנס להיריון.

#### היריון

ניתן להשתמש בנורונטין במהלך השליש הראשון של ההריון במידת הצורך. אם את מתכננת להיכנס להריון או אם את בהריון או חושבת שאת בהריון, דברי עם הרופא שלך מיד. אם נכנסת להריון ויש לך אפילפסיה, חשוב שלא תפסיקי לקחת את התרופה מבלי להיוועץ תחילה ברופא שלך, שכן הדבר עלול להחמיר את מחלתך. החמרה של האפילפסיה שלך עלולה לסכן אותך ואת ילדך שטרם נולד.

במחקר שסקר נתונים מנשים במדינות נורדיות שנטלו נאורונטין ב-3 החודשים הראשונים להריון, לא היה סיכון מוגבר למומים מולדים או בעיות בהתפתחות תפקוד המוח (הפרעות בהתפתחות נוירולוגית). עם זאת, לתינוקות של נשים שנטלו נאורונטין במהלך ההריון היה סיכון מוגבר למשקל לידה נמוך וללידה מוקדמת.

אין ליטול נאורונטין™ במהלך ההריון, אלא אם נאמר לך אחרת על ידי הרופא. נשים בגיל הפוריות חייבות להשתמש באמצעי מניעה יעילים בעת הטיפול בתרופה.

לא נעשו מחקרים על השימוש בתרופה זו בקרב נשים הרות. אולם בשימוש בתרופות אחרות לטיפול בפרנסים דווח על עלייה בסיכון לנזק לתינוק המתפתח, במיוחד בנטילה של יותר מתרופה אחת לטיפול בפרנסים בו זמנית. לכן, במידת האפשר, יש לנסות ליטול תרופה אחת למניעת פרנסים במהלך ההריון ורק בהתייעצות עם הרופא.

בשימוש במהלך ההריון, נאורונטין עלול להוביל לתסמיני גמילה אצל תינוקות שזה עתה נולדו. סיכון זה עשוי להיות מוגבר כאשר גאבאפנטין נלקח יחד עם משככי כאבים אופיואידים (תרופות לטיפול בכאב חמור).

יש לפנות מיד לרופא אם נכנסת להריון במהלך הטיפול בתרופה, אם את חושבת שיתכן שאת בהריון או שאת מתכננת להיכנס להריון במהלך נטילת התרופה. אין להפסיק את הטיפול בתרופה זו בפתאומיות כיוון שזה עלול להוביל להתפרצות מחודשת של פרנסים, העלולים להביא להשלכות חמורות לך ולתינוקך.

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החמרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה. העלונים המעודכנים זמינים באתר משרד הבריאות.

<https://israel.drugs.health.gov.il/#/byDrug>

לחילופין, לקבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, ת.ד. 12133 הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,  
אורטל עבודי  
רוקח/ת ממונה