

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ג - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוזומפיק® 1 מ"ג
תמיישה להזרקה בעט מוקן לשימוש

החומר הפעיל הוא סמגלוטיד.
1 מ"ל תמיישה להזרקה מכליל 1.34 מ"ג סמגלוטיד.
semaglutide 1.34 mg/ml

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעין את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- אוזומפיק מיועדת לטיפול במוגרים החולים בסוכרת סוג 2 שמצוב מחלתם אינם בשליטה מספקת, בנוסף למשטר תזונתי ופעולות גופניות:
- טיפול מיוחד כאשר טיפול במטפורמין (cholinesterase inhibitor) אינם מתאימים עקב אי סבירות או התווית נגד לשימוש.
 - כתוספת לתרופות אחרות לטיפול בסוכרת.

קבוצה רפואיית: תרופות לטיפול בסוכרת, אנלוגים של GLP-1

אוזומפיק מכילה את החומר הפעיל סמגלוטיד. היא מסייעת לגוף להפחית את רמת הסוכר בدم רק כאשר רמת הסוכר בדם גבוהה מדי ויכולת לשיער במניעת מחלת לב. חשוב שתתmeshר בתוכנית התזונה והפעולות הגופניות כפי שהרווא לך הרופא, הרוקח או האחות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לסמגלוטיד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בפרק 6 "מידע נוסף").

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בתרופה זו, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות.

- תרופה זו אינה זהה לאינסולין (cholinesterase), ואין להשתמש בה אם:
- יש לך סוכרת סוג 1 – מצב שבו גוף אינו מייצר אינסולין כלל.
 - פיתחת חמצת קוטנית סוכרתית (diabetic ketoacidosis) – סיכון של סוכרת הכרוך ברמת סוכר גבוהה בדם, קשה נשימה, הבלבול, צמא מוגבר, ריח נשימה מתוק או טעם מתוק או מתכת בפה.

אוזומפיק אינה אינסולין ולכן אין להשתמש בה כתחליף לאינסולין.

השפעות על מערכת העיכול

במהלך הטיפול בתרופה זו, יתכן שתרגיש בחילה או תקיא, או שיהיה לך שלשול. תופעות אלו יכולות לגרום להתייבשות (איבוד נזלים). חשוב שתשתחה הרבה נזלים כדי למנוע התיבשות. זה חשוב במיוחד אם יש לך בעיות בכליות. שוחח עם הרופא אם יש לך שאלות או חששות כלשהן.

כאב בטן חמוץ ומתמשך הולך להיגרם כתוצאה מדלקת לבלב חריפה
אם יש לך כאב חמוץ ומתמשך באזורי הבطن – פנה לרופא מייד, מפני שזה עלול להיות סימן של דלקת לבלב חריפה (acute pancreatitis). אנו ראה בפרק 4 את סימני האזהרה לדלקת לבלב.

רמת סוכר נמוכה בدم (היפוגליקמיה)

השילוב של סולפונילאוראה (sulfonylurea) או אינסולין עם תרופה זו עלול להגביר את הסיכון לפתח רמות סוכר נמוכות בדם (היפוגליקמיה). אנו ראה בפרק 4 את סימני האזהרה של רמות סוכר נמוכות בדם. הרופא עשוי לבקש ממך לבדוק את רמות הסוכר בדמך. זה יסייע לרופא להחליט אם יש צורך לשנות את מנת הסולפונילאוראה או האינסולין כדי להפחית את הסיכון לרמת סוכר נמוכה בדם.

מחלת עיניים סוכרתית (רטינופתיה)

אם יש לך מחלת עיניים סוכרתית ואתה משתמש באינסולין, תרופה זו עלולה לגרום להחמרה מצב הראייה שלך, והדבר עשוי לחיבב טיפול. ספר לרופא אם יש לך מחלת עיניים סוכרתית או אם יש לך בעיות עיניים במהלך הטיפול בתרופה זו.

ילדים וمتבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולתבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות ו问问ק

יש לבצע בדיקות עיניים תקופתיות על ידי רופא עיניים.

תగובות בין תרופתיות

אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופק**. במיוחד אם אתה לוקחת תרופות המכילות:

- אורפרין (warfarin) או תרופות דומות אחרות הנלקחות דרך הפה להפחחתת קריישיות הדם (נגדי קרישת פומיים). יתכן שתזדקק לבדיקות דם תכופות כדי לקבוע את מהירות קרישת הדם שלך.
- אם אתה משתמש באינסולין, הרופא ינחה אותך כיצד להפחית את המנה של אינסולין, וימליך לך למדוז את רמת הסוכר בדמך באופן יותר, זאת במטרה להימנע מהיפרגליקמיה (רמה גבוהה של סוכר בדם) וחמצת קטוטית סוכרתית (סיבוך של מחלת הסוכרת המתרכש כאשר הגוף לא מסוגל לפרך גליקוז כי אין מספיק אינסולין).

הירין, הנקה ופוריות

אם את בהירין או מיניקה, חושבת שאתה בהירון או מתכונת להרות, עליך להיעזר ברופא לפני Nutzung תרופה זו.

אין להשתמש בתרופה זו במהלך ההירון, מפני שלא ידוע אם היא משפיעה על העובר. לפיכך, מומלץ להשתמש באמצעות מנעה בזמן השימוש בתרופה זו. אם ברצונך להרות, התיעיצ' עמו הרופא שלך כיצד לשנות את הטיפול כיוון שעלייך להפסיק ליטול תרופה זו חודשיים מראש לפחות. אם תהרי בזמן שאתה נוטלת תרופה זו, דברי עם הרופא מייד, מפני שהיא צריכה לצורך לשנות את הטיפול שלך.

אל תשתמשי בתרופה זו אם את מיניקה, מפני שלא ידוע אם היא עוברת בחלב אם.

נהיגה ושימוש במכוניות

אווזמפיק לא צפוייה להשפיע על יכולת שלך לנוהג או להשתמש במכוניות. אם אתה משתמש בתרופה זו בשילוב עם סולפונילאוראה או אינסולין, עלולה להתפתח רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) שעלולה לגרום ביכולת הריכוז שלך. אין לנוהג או להשתמש במכוניות אם יש לך סימנים של רמת סוכר נמוכה בדם. עיין בסעיף

2 "ازהרות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה" למידע על סיכון מוגבר לרמת סוכר נמוכה בدم, ובסעיף 4 לסימני האזהרה של רמת סוכר נמוכה בדם. פנה לרופא לקבלת מידע נוסף.

אחת מתופעות הלואאי השכיחות של התרופה הינה סחרחות אשר עלולה להשפיע בחילק מהמטופלים על יכולת הנהיגה או הפעלת מכונות.

מידע חשוב על חילק מהמרכיבים של התרופה תכולת נתן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתן (23 מ"ג) למנה, כלומר, היא למעשה "נטולת נתן".

3. כיצד השתמש באוזומפיק?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקורי בדרך כלל הוא:

- המנה ההתחלתית היא 0.25 מ"ג פעם בשבוע, במשך ארבעה שבועות.
 - לאחר ארבעה שבועות הרופא יעלה את המנה שלך ל-0.5 מ"ג פעם בשבוע.
 - הרופא עשוי להעלות את המנה שלך ל-1 מ"ג פעם בשבוע אם רמת הסוכר בدمך אינה מאוזנת בצורה מספקת טוביה באמצעות מנה של 0.5 מ"ג פעם בשבוע.
- אל תנסה את המינון אלא אם כן הרופא הורה לך לעשות זאת.

אין לעבור על המנה המומלצת.

מהי דרך המtan של אוזומפיק

אוזומפיק ניתנת בהזרקה מתחת לעור (זריקה תת-עורית). אל תזריק אותה לווריד או לשדריר.

- המיקומות הטובים ביותר להזרקה הם החלק הקדמי של הירכיים, החלק הקדמי של המותן (הבטן) או החלק העליון של הזרוע.
 - לפני שתשתמש בעט לראשונה, הרופא או האחות יראו לך כיצד השתמש בו.
- הוראות השימוש מפורטות בהמשך עליון זה.

מתי השתמש באוזומפיק

- עליך להשתמש בתרופה זו אחת בשבוע, באותו היום בשבוע אם ניתן.
- אתה יכול להזריק לעצמך את התרופה בכל שעה ביום – ללא קשר לאירועים.

כדי לסייע לך להזכיר תרופה זו אחת בשבוע בלבד, מומלץ לרשום את היום בשבוע שבחרת (לדוגמה, יום רביעי) על גבי האזינה, ולרשום את תאריך ההזרקה על האזינה בכל פעם שאתה מזריק.

במקרה הצורך, אתה יכול לשנות את יום ההזרקה השבועי של תרופה זו, כל עוד חלפו 3 ימים לפחות מההזרקה الأخيرة. לאחר שתבחר יום ההזרקה חדש, המשך להזריק פעם בשבוע.

אם ההזרקת בטיעות מינון גבוה יותר של אוזומפיק

אם ההזרקת מנת יתר או אם בטיעות נטל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה אליו. יתכן שהיו לך תופעות לוואי כמו בחילה.

אם שכחת להשתמש באוזומפיק:

אם שכחת להזריק מנת של התרופה:

- אם חלפו 5 ימים או פחות מאז שהיא אמרה להשתמש באוזומפיק, השתמש בה מייד כשתיזכר. לאחר מכן, הרזק את המנה הבאה כרגיל, ביום הקבוע.
- אם חלפו יותר מ-5 ימים מאז שהיא אמרה להשתמש באוזומפיק, דלג על המנה שנשכחה. לאחר מכן, הרזק את המנה הבאה כרגיל, ביום הקבוע.

אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות עלמנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש באוזمفיק
אל תפסיק להשתמש בתרופה זו מבלתי לדבר עם הרופא. אם תפסיק להשתמש בה, רמות הסוכר בدمך עלולות לעלות.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווית והמנה **בכל פעען** שאתה לוקח תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זkok להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באוזمفاיק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת המ משתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי חמורות

יש לפנות מיד לרופא אם מופיעות אחת מתופעות הלואו החמורות המפורטוות מטה.

توفעות לוואי **שכיחות**: עשויה להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים

- סיבוכים של מחלת עיניים סוכרתית (רטינופתיה) – עליך לדוח לרופא אם אתה מפתח בעיות עיניים, כגון שינוים בראיה, במהלך הטיפול בתרופה זו.

توفעות לוואי **שאינם שכיחות**: עשויה להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים

- דלקת לבלב (דלקת לבלב חריפה (acute pancreatitis)) שעשויה לגרום לכאב חמור בבטן ובגב אשר אינו עבר. עליך לפנות מיד לרופא אם אתה חווה תסמינים כאלו.

توفעות לוואי **נדירות**: עשויה להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים

- תגובות אלרגיות חמורות (תגובה אנטיפילקטית, אנגיאוأدמה). עליך לפנות לקליטת סיוע רפואי מיידי ולהודיע מייד לרופא אם יש לך תסמינים כמו בעיות נשימה, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון עם קושי בבליעה וקצב לב מהיר.

توفעות לוואי **ששכיחותן אינה ידועה** (תופעות שכיחותן אינה ניתנת להערכת המנתונים הזמינים):

- חסימת מעיים. צורה חמורה של עצירות עם תסמינים נוספים כגון כאב בטן, נפיחות, הקאות וכו'.

توفעות לוואי אחרות

توفעות לוואי **שכיחות מוד**: עשויה להשפיע על יותר מאשר אחד מתוך 10 משתמשים

- בחילה – בדרך כלל חולפת עם הזמן
- שלשול – בדרך כלל חולף עם הזמן
- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) כאשר משתמשים בתרופה זו יחד עם תרופות שמכילות סולפנילאוראה או אינסולין.

توفעות לוואי **שכיחות**: עשויה להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים

- הקאה

- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) כאשר משתמשים בתרופה זו יחד עם תרופות לטיפול בסוכרת הניתנות דרך הפה שאינן סולפונילאורה או אינסולין.

סימני האזהרה של רמת סוכר נמוכה בדם יכולים להופיע בפתאומיות. הם יכולים לכלול: צעה קרה, עור חיוור וקריר, כאב ראש, קצב לב מהיר, בחילה או תחושת רעב גדולה, שינוי בראייה, תחושת ישננות או חולשה, תחושת עצבנות, חרדה או בלבול, קשיי ריכוז או רעדות. הרופא יאמר לך כיצד לטפל ברמת סוכר נמוכה בדם ומה לעשות אם תבחן בסימני אזהרה אלה. יש סבירות גבוהה יותר שתהייה לך רמת סוכר נמוכה בדם, אם אתה נוטל בנוסף סולפונילאורה או אינסולין. הרופא עשוי להפחית את המנה של תרופות אלה לפני שתתחל להשתמש בתרופה זו.

- בעיות עיכול
- דלקת קיבה (גסטריטיס) – הסימנים כוללים כאב בטן, בחילות או הקאות
- רפלוקס או צרבת – נקרה גם מחלת החזר הקיבתי ושת (GERD)
- כאב בטן
- נפיחות של הבطن
- עצירות
- גיהוקים
- אבני מרה
- סחרחות
- עייפות
- איבוד משקל
- ירידת בתיאבון
- גזים
- עליה של אנזימי הלבלב (כמו ליפאצ' ועמילאצ').

תופעות לוואי שאין שכיחות: עשויות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים

- שינוי בטעמים של מזון ומשקאות
- דופק מהיר
- תגובות במקום ההזרקה – כמו חבורות, כאב, גירוי, גרד ופריחה
- תגובות אלרגיות כגון פריחה, גרד או חרלה
- האטה בריקון הקיבה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למ משרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי התווית של העט ואירועת הקרטון. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

לפני הפתיחה:

יש לשמר במקירר ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$). אין להקפיא את אוזמפיק ואין להשתמש בתרופה שהוקפאה. יש להרחיק מגוף הקירור. יש לשמר על העט מכוסה כדי להגן מפני אור.

במהלך השימוש:

- ניתן לשמר את העט במשך 6 שבועות כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 30°C , או במקירר ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$) הרחק מגוף הקירור. אין להקפיא את אוזמפיק ואין להשתמש בתרופה אם היא הוקפאה.
- כאשר אין משתמש בעט, שמור על המכוסה סגור כדי להגן מפני אור.

אל תשתמש בתרופה זו אם שמת לב שהתמייסה אינה צלולה וחסרת צבע או כמעט חסרת צבע.

אין להשליך תרופות לשפכים או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאין משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו לשימירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Propylene glycol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

אוזמפיק היא תמייסה צלולה וחסרת צבע או כמעט חסרת צבע, המיעדת להזרקה באמצעות עט מוקן לשימוש. כל עט מוקן לשימוש מכיל 4 מ"ג סמגלאוטיד-3 מ"ל תמייסה ומספק 4 מנות. כל מנת מכילה 1 מ"ג סמגלאוטיד ב- 0.74 מ"ל.

תמייסה להזרקה אוזמפיק 1 מ"ג זמיןנה בגדיי האריזה הבאים:

עת אחד ו-4 מחתמים חד-פעמיות NovoFine Plus.
3 עיטים ו-12 מחתמים חד-פעמיות NovoFine Plus.

יתכן שלא כל גודלי הארייזות משווים.

שם בעל הרישום וכתובתו

נבו נורדיסק בע"מ, רח' עתיר ידע 1, כפר-סבא 4464301

שם היצרן וכתובתו

נבו נורדיסק אי.א.ס., נבו אלה, ד.ק'-2880, בגסورد, דנמרק

נערך ביוני 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 09-35750-162

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות לאופן השימוש בתמייסה להזרקה של אוזומפיק 1 מ"ג בעט מוכן לשימוש



<p>קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש באוזומפיק בעט מוכן לשימוש.</p> <p>דבר עם הרופא, האחות או הרוקח כיצד יש להזריק אוזומפיק באופן נכון. בדוק את העט תחיליה כדי לוודא שהוא מכיל אוזומפיק 1 מ"ג, ולאחר מכן עיין באירורים מטה כדי להכיר את החלקים השונים של העט והמחט.</p> <p>אם אתה עיור או לך ראייה ואני מסוגל לקרוא את חלון מונה המנות בעט, אל תשתמש בעט זה ללא עזרה. בקש עזרה מאדם בעל ראייה טובה שיעדך כיצד להשתמש באוזומפיק בעט מוכן לשימוש.</p> <p>העט מוכן לשימוש, ומצדיך בבורר מנתה. הוא מכיל 4 מ"ג סמג'לוטיד, ובאפשרותך לבחור מנות של 1 מ"ג בלבד. עט חדש אחד מכיל ארבע מנות של 1 מ"ג.</p> <p>השתמש בטבלה שבחלק הפנימי של האריזה על מנת לעקוב אחרי מספר הזריקות שהזרקתי וזמן ההזרקה.</p> <p>העט מיועד לשימוש עם מחטים חד-פעמיות מסוג G, 30G, 31G ו-32G, באורך של עד 8 מ"מ.</p> <p>מחטי נובופין פלווא כלולות באריזה.</p>	<p>אוזומפיק בעט מוכן לשימוש ומחת (דוגמה)</p>
--	---

מידע חשוב

שים לב להערות אלו, הן חשובות לשימוש בטוח בעט.

1. הכן את העט עם מחט חדש



	<ul style="list-style-type: none"> בדוק את השם ואת התווית הצבעונית של העט, כדי לוודא שהוא מכיל אוזומפיק 1 מ"ג. זה חשוב במיוחד אם אתה נוטל יותר מטב של תרופת בהזרקה. שימוש בתרופת שגoya עלול לגרום נזק לבリアותך. הסר את מכסה העט.
	<ul style="list-style-type: none"> בדוק שהתמייסה בעט צלולה וחסרת צבע. הבט בחלון העט. אם התמייסה נראה אטום או בעל צבע, אל תשתמש בעט.

	<ul style="list-style-type: none"> קח מחת חדש בדוק את לשונית הניר ואת מכסה המחת החיצוני לנזקים שיכולים לפגוע בסטריליות. אם נראה נזק כלשהו, השתמש במחת חדש. תלוש את לשונית הניר.
	<p>וודא כי חיבורת את המחת באופן נכון</p> <ul style="list-style-type: none"> דחוף את המחת ישר לתוך העט. סובב אותה עד שהיא תתחבר בחזקה.
	<p>המchat מכוסה בשני מכסים. עליך להסיר את שני המכסים.</p> <p>אם אתה שוכח להסיר את שני המכסים, אתה לא תזריק את התמיסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> הסר את מכסה המחת החיצוני ושמור אותו להמשך. תזדקק לו לאחר ההזרקה, כדי להוציא את המחת מה�ט בבטחה.
	<ul style="list-style-type: none"> משור את מכסה המחת הפנימי והשלך אותן. אם תנסה להשיב אותן למקום, אתה עלול להזכיר בטעות מהמchat. <p>יתכן שתופיע טיפה של Tamishe בקצה המchat. זה דבר רגיל, אך עדין אתה חייב לבדוק את הזרימה אם אתה משתמש בעט חדש לראשונה. ראה שלב 2 "בדיקה את הזרימה עם כל עט חדש".</p> <p>אל תחבר מחת חדש לעט עד שתיהיה מוכן לקבל את הזריקה.</p>
 <p>השתמש תמיד במחת חדש עבור כל הזרקה.</p> <p>זה עשוי למנוע מחתים חסומות, הדבקה, זיהום ומינון לא מדויק.</p>	 <p>לעולם אל תשתמש במחת עקומה או פגומה.</p>
<h2>2. בדוק את הזרימה עם כל עט חדש</h2>	<ul style="list-style-type: none"> אם העט שלך כבר נמצא בשימוש, התקדם לשלב 3 "בחר את המנה". בדוק את הזרימה רק לפני הזרקה הראשונה שלך עם כל עט חדש. סובב את בורר המנה עד סמל בדיקת הזרימה (—•—). שיופיע מייד אחרי "0". וודא כי סמל בדיקת הזרימה מישר בקן אחד עם סמן המנה.


	<ul style="list-style-type: none"> • החזק את העט כשהמחלת פונה כלפי מעלה. לחץ והחזק את לחץ הזרקה עד שמונה המנות ייחזר ל- "0". ה- "0" צריך להתיישר בקן אחד עם סמן המנה. אמורה להופיע טיפה של תמייסה בקצת המחט.
<p>טיפה קטנה עשויה להישאר בקצת המחט, אך היא לא תזוזק. אם לא מופיעה טיפה, חזר על שלב 2 "בדיקה את הזרימה עם כל עט חדש", עד 6 פעמים. אם עדין אין טיפה, החלף את המחט וחזיר על שלב 2 "בדיקה את הזרימה עם כל עט חדש" פעם נוספת. השלך את העט והשתמש בעט חדש אם עדין לא מופיעה טיפה של תמייסה.</p>	
<p>ודא תמיד שטיפה מופיעה בקצת המחט לפני שאתת משתמש בעט חדש לראשונה. זהו סימן בטוח לכך שהתמייסה זורמת. אם לא מופיעה טיפה, לא תזריק תרופה כלל, אפילו אם תראה תזוזה במונת המנות. הדבר עשוי להעיד על מחט חסומה או פגומה. אם לא תבודוק את הזרימה לפני הזרקה הראשונה בכל עט חדש, אתה עלול שלא לקבל את מנת התרופה שנרשמה לך ואת ההשפעה המיועדת של אוזומפיק.</p>	


3. בחר את המנה	
	<ul style="list-style-type: none"> • סובב את בורר המנה כדי לבחור 1 מ"ג. המשר לסובב עד שמונה המנות עוצר ומראה 1 מ"ג.
<p>רק מונה המנות וסמן המנה יראו שנבחר 1 מ"ג. ניתן לבחור 1 מ"ג למינה בלבד. כאשר העט שלך מכיל פחות מ- 1 מ"ג, מונה המנות נעצר לפני שמוסיע 1 מ"ג. בורר המנה משמע "קליקים" שונים כאשר מסובבים אותו קדימה, אחורה, או כשמושיכים מעבר ל- 1 מ"ג. אל תספור את הקליקים של העט.</p>	
<p>יש לבחור רק מנות של 1 מ"ג עם בורר המנה. 1 מ"ג חייב להתיישר במדוייק עם סמן המנה, כדי להבטיח שתתקבל את המנה הנכונה.</p>	<p>כמה תמייסה נותרה</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • על מנת לראות כמה תמייסה נותרה, השתמש במונת המנות: סובב את בורר המנה עד אשר מונה המנות עצוץ. אם זה מראה 1, לפחות 1 מ"ג נותרו בעט. אם מונה המנות נעצר לפני 1 מ"ג, אז לא נותרה מספיק תמייסה למינה מלאה של 1 מ"ג.
	<p>אם לא נותרה מספיק תמייסה בעט למינה מלאה, אל תשתמש בו. השתמש בעט אוזומפיק חדש.</p>

4. הזרק את מנת התרופה

	<ul style="list-style-type: none"> החדר את המחט לתוך העור כפי שהראו לך הרופא או האחות. ודא שאתה יכול לראות את מונה המנתה. אל תכסה אותה באצבעותיך. הדבר עלול להפריע להזרקה.
	<ul style="list-style-type: none"> לחץ את לחצן ההזרקה והחזק אותו לחוץ. הסתכל על מונה המנתה חזר ל- "0". ה-"0" ציריך להתיישר בכו אחד עם סמן המנתה. יתכן שתשתמש או שתרגיש "קליק". המשך ללחוץ על לחצן ההזרקה והשאר את המחט בעור.
	<ul style="list-style-type: none"> ספור לפחות עד 6, בזמן שאתה ממשך ללחוץ על לחצן ההזרקה. אם תוציא את המחט מוקדם מדי, יתכן שתראה זרם של תמיישה יוצא מקצת המחט. אם זה קורה, לא קיבלת את המנתה המלאה.
	<ul style="list-style-type: none"> הוציא את המחט מהעור. כתע ניתן לשחרר את לחצן ההזרקה. אם מופיע דם במקום ההזרקה, לחץ בעדינות.
<p>יתכן שתראה טיפת תמיישה בקצת המחט לאחר ההזרקה. זהו מצב רגיל ואינו משפיע על המנתה שאתה מקבל.</p> <p>הבט תמיד במונת המנתה כדי לדעת כמה מ"ג אתה מזריק. החזק את לחצן ההזרקה במצב לחוץ עד שמונה המנתה חזר ל- "0". ⚠️</p> <p>כיצד לזיהות מחט חסומה או פגומה</p> <ul style="list-style-type: none"> אם לא מופיע "0" במונת המנתה לאחר לחיצה ממושכת על לחצן ההזרקה, יתכן שהשתמשה במחט חסומה או פגומה. במקרה זה לא קיבלת תרופה – אף שמונה המנתה התקדם ממנה המקורית שהגדרת. <p>כיצד לטפל במחט חסומה</p> <p>החלף את המחט כמפורט בשלב 5 "לאחר ההזרקה", וחזור על כל השלבים החל משלב 1 "הacen את העט עם מחט חדשה" ואילך. ודא שאתה בוחר את המנתה המלאה הדורשה לך.</p> <p>לעולם אל תיגע במונת המנתה בזמן ההזרקה. הדבר עלול להפריע להזרקה.</p>	

5. לאחר ההזרקה

	<ul style="list-style-type: none"> השליך את המחט תמיד לאחר כל הזרקה כדי להבטיח הזרקות נכונות ולהימנע ממחטים חסומות. אם המחט חסומה, אתה לא תזריק תרופה כלל.
<ul style="list-style-type: none"> הוביל את קצה המחט לתוך מכסה המחט החיצוני על גבי משטח שטוח, מבלי לגעת במחט או במכסה המחט החיצוני. 	

	<ul style="list-style-type: none"> ברגע שהמחט מכוסה, דחוף בזיהירות את מכסה המחט החיצוני עד שהוא נסגר על המחט לוחוטין. הוציא את המחט בתנעה סיבובית והשלך אותה בזיהירות בהתאם להנחיות הרופא, האחות, הרוקח או הרשויות המקומיות.
	<ul style="list-style-type: none"> הרכיב את מכסה העט על העט לאחר כל שימוש, כדי להגן על התמיסה מפני אור.
כאשר העט מתרוקן, השלך אותו לא המחט בהתאם להוראות הרופא, האחות, הרוקח או הרשויות המקומיות.	
	<p>לעולם אל תנסה להחזיר את מכסה המחט הפנימי על המחט. אתה עלול להידקר מהמחט.</p> <p>תמיד הוציא את המחט מהעט מיד לאחר כל הזרקה.</p> <p>זה עשוי למנוע מחלעים חסומות, הדבקה, זיהום, דליפה של התמיסה ומינון לא מדוקן.</p>
<p>מידע חשוב נוספים</p>	<ul style="list-style-type: none"> הרוקח תמיד תמייד את העט והמחטים מטווח ראייתם ומהישג ידם של אחרים, במיוחד ילדים. לעולם אל תחלק את העט או את המחטים עם אנשים אחרים. מטופלים נדרשים לנΚוט ザירות מרובה בעת הטיפול במחלעים משומשות כדי למנוע פצעה ממחלעים וזיהום צולב.
<p>טיפול בעט</p>	<p>טפל בעט בזיהירות. טיפול לא זהיר או שימוש שגוי עלולים לגרום למינון לא מדוקן. אם זה קורה, אתה עלול שלא קיבל את ההשפעה המיועדת של תרופה זו.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> אל תשאיר את העט ברכב או במקום אחר שבו הוא עלול להתחכם מדי או להתקרר מדי. אל תזריק אוזומפיק שהוקפא. אם תעשה זאת, אתה עלול שלא לקבל את ההשפעה המיועדת של תרופה זו. אל תזריק אוזומפיק שנחשה לאור שימוש ישיר. אם תעשה זאת, אתה עלול שלא לקבל את ההשפעה המיועדת של תרופה זו. אל תחשוף את העט לאבק, ללכלוך או לנוזלים. אל תשטווף, תטבול או תשמן את העט. ניתן לנקיות אותו בחומר ניקוי עדין על גבי מטלית לחה. אל תפיל את העט ואל תכה בו כנגד מטחחים קשים. אם הפלת את העט או שאתה חשד שיש בעיה, הרכב מחט חדש ובודק את הזרימה לפני שתזריק. אל תנסה לملא מחדש את העט. ברגע שהוא מתרוקן יש להשליכו. אל תנסה لتתקן את העט או לפرك אותו.