

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

וילdaglitin אס. קי.

טబליות

רכב:

כל טבלייה מכילה: וילdaglitin 50 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעין את העلون עד סוף בטראם תשתחש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

וילdaglitin אס. קי. מיועדת כתוספת לדיאטה ולפעולות גופנית בחולים עם סוכרת מסוג 2.

- טיפול היחיד, אם דיאטה ופעולות גופנית אינם מספיקים, או
- בשילוב עם מטפורמין, או עם סולפונילאורייה אם הטיפול בתכשירים אלה אינו מספיק לאיזון של ערכיו הגלוקוז בدم.

טיפול משולש דרך הפה בשילוב עם:

- סולפונילאורייה ומטפורמין, כטיפול המשלב דיאטה ופעולות גופנית בתוספת שני תכשירים אלה, שאינם מספיקים לצורך איזון גליקמי.

וילdaglitin אס. קי מיועדת גם לשימוש בשילוב עם אינסולין (עם או ללא מטפורמין) כאשר דיאטה ופעולות גופנית, בנוסף למינון קבוע של אינסולין אינם מספיקים לצורך איזון גליקמי.

וילdaglitin אס. קי מיועדת כתוספת לדיאטה ולפעולות גופנית בחולים עם סוכרת מסוג 2:

- בשילוב עם תיאזolidינידין, בחולים ללא איזון גליקמי ולמי שהשימוש בתיאזolidינידין מתאים.

קבוצה רפואיית:

תרופות המשמשות לטיפול בסוכרת: מעכבי האנזים דיפפטידיל פפטידוז 4 (DPP-4).

וילdaglitin אס. קי הינה תרופה לניטלה דרך הפה, המיועדת לעזור בויסות רמת הסוכר בדם.

סוכרת מסוג 2 מתפתחת כאשר הלבלב אינו מפריש מספיק אינסולין או כשהאינסולין המופרש אינו פועל כנדרש או כשהלבלב מייצר יותר מדי גלוקגון.

אינסולין מסיע להורדת רמת הסוכר בדם, בעיקר לאחר ארוחות.

גלוקגון מפעיל את ייצור הסוכר על-ידי הכלבד, וגורם לעלייה ברמת הסוכר בדם. הלבלב מייצר את שני החומרים גלוקגון ואינסולין. פעילות וילdaglitin אס. קי גורמת ללבלב ליצור יותר אינסולין ולהפחית את ייצור הגלוקגון, ובכך מסייעת לאיזון רמת הסוכר בדם.

התרופה המכילה נמפיתה את רמות הסוכר בדם, מה שיכול לעזור לך במניעת סיבוכי סוכרת.

למרות שהיא מתחילה כעת טיפול רפואי לסוכרת, חשוב שתתמשיך בדיאטה שלך ו/או בפעולות הגוף כפי שהומלץ לך.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי לוildagliptin או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוספת"). אם אתה חושב כי הינך עשוי להיות אלרגי לוildagliptin או לכל אחד מרכיבי התרופה וילדאגליפטין אס. קי, אין ליטול את התרופה ויש לדבר עם הרופא.
- אין להשתמש בוילדאגליפטין אס. קי אם אתה בהריון או מניקה.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: לפני הטיפול בוילדאגליפטין אס. קי, ספר לרופא אם:

- יש לך סוכרת מסווג 1 (מצב שבו הגוף אינו מייצר אינסולין), או אם הינך סובל מחמצת קטוטית של הסוכרת (ketoacidosis diabetic) אתה נוטל תרופה לטיפול בסוכרת מקבוצת הסולפונילօוריה (ייתכן והרופא שלך ירצה להזכיר את מנת התרופה המכילה סולפונילօוריה כאשר היא ניתנת יחד עם וילדאגליפטין אס. קי במטרה למנוע רמת גלוקוז נמוכה בדם [היפוגליקמיה]).
- יש לך מחלת כלותBINONIA או חמורה (חצרך ליטול מנה נמוכה של וילדאגליפטין אס. קי).
- הינך עבר טיפול דיאליזה.
- הינך סובל ממחלת כבד.
- הינך סובל מאירוע לב.
- יש לך או הייתה לך מחלת של הלבלב.

אם נאלצת בעבר להפסיק נטילת תרופה המכילה vildagliptin בשל בעיות בכבד, אין לחזר ולהשתמש בתרופה נגעים בעור הימן סיבוך שכיח של מחלת הסוכרת. מומלץ למלא אחר המלצות הרופא או האחות לשמירה על העור וכפות הרגליים. כמו כן מומלץ לשים לב במיוחד לתוצאות שלפוחיות או כיבים חדשים במהלך ליקחת וילדאגליפטין אס. קי. אם אלו קורים, عليك להיוועץ ברופא מידית.

ילדים ומתבגרים:

השימוש בוילדאגליפטין אס. קי בילדים ובמתבגרים עד גיל 18 אינו מומלץ.

בדיקות ומעקב:

לפני הטיפול בוילדאגליפטין אס. קי תעביר בדיקת תפוקדי כבד. במהלך שנות הטיפול הראשונה תעביר בדיקת תפוקדי כבד כל 3 חודשים ובהמשך בדיקה תקופתית. זאת כדי לאפשר גילוי מוקדם ככל האפשר של סימנים לעלייה באנזימי הכבד.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות:
אם אתה לוקה, או אם לך התלה לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרופק. במיוחד אם אתה לוקה:

- תאייזדים או משתנים אחרים
- קורטיקוסטרואידים (בדרך כלל משמשים לטיפול בדלקת)
- תרופות לבולותת התריס
- תרופות מסויימות המשפיעות על מערכת העצבים

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול וילdagelipstein אס. קי. עם או בלי אrhoה.

הירין והנקה:

אם את בהירין או מניקה, חושבת שاث בהירין או מתכנתת להרות, שאליך לעצת הרופא או הרוקח לפני נטילת הטרופה.

אל תשתמי בילdagelipstein אס. קי. במהלך ההירין לא ידוע אם וילdagelipstein אס. קי. מועברת לחלב האם. אל תשתמי בילdagelipstein אס. קי אם הינך מניקה או מתכנתת להניך.

נהיגה ושימוש במכונות:

עליך להימנע מנהיגה ומהפעלת מכונות אם הינך מרגיש סחרורת במהלך נטילת וילdagelipstein אס. קי.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של הטרופה:

וילdagelipstein אס. קי. מכילה **לקטווז** (סוכר החלב), כל טבליה מכילה 47.82 מ"ג לקטווז.

אם נאמר לך על-ידי הרופא, כי יש לך אי סbilות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת הטרופה. וילdagelipstein אס. קי **מכילה נתרן**. תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, על כן נחשבת כנטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

בהתאם לתగותך לטיפול הרופא יכול להעלות או להוריד את מינון הטרופה.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בילdagelipstein אס. קי. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל וילdagelipstein אס. קי. הוא 50 או 100 מ"ג ביום:

- אם אתה לוקח וילdagelipstein אס. קי. בלבד, המינון המקביל הוא 50 מ"ג ביום הנלקח במנת בבוקר, או 100 מ"ג ביום הנלקחים במנת של 50 מ"ג בבוקר ו- 50 מ"ג בערב
- אם אתה לוקח וילdagelipstein אס. קי. בשילוב עם תרופה נוספת המכילה סולפונילאוריאה, המינון המקביל הוא 50 מ"ג ביום הנלקח במנת בבוקר
- אם אתה לוקח וילdagelipstein אס. קי. בשילוב עם תרופה נוספת המכילה מטפורמין או גלייזון, בשילוב של מטפורמין וסולפונילאוריאה, או עם אינסולין (עם/ללא מטפורמין), המינון המקביל הוא 100 מ"ג ביום הנלקחים במנת של 50 מ"ג בבוקר ו- 50 מ"ג בערב

אין לעבור על המנת המומלצת.

משך הטיפול -

- יש לחתוך וילdagelipstein אס. קי בכל יום כל עוד הרופא מורה לך זאת. הטיפול עשוי להיות ממושך.
- הרופא יבדוק את מצבך באופן קבוע כדי לוודא שהטיפול משפייע באופן הרצוי.

צורת הנטילה -

אין **ללעוט!** יש לבלווע את הטבליה בשלמותה עם כוס מים.

ניתן ליטול וילdagelipstein אס. קי עם או בלי אrhoה.

אם הרופא הורה לך ליטול את התרופה פעם אחת ביום – יש ליטול אותה בבוקר.
אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר עליך לפני פנוטה מיד לרופא שלך. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלע' יلد מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים, והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחתי ליטול את התרופה, יש ליטולמנה מיד כשנזורתה. יש ליטול את המנה הבאה בזמן המועד. אולם, אם כמעט הגיע הזמן למנת הבאה, יש לדלג על המנה שנשכחה. אין ליטולמנה כפולה, יש להיעזר ברופא. יש להתמודד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה אל תפסיק לקחת וילdagלייפטין אס. קיילא אם הרופא אומר לך לעשות זאת. אם יש לך שאלות לגבי משך הטיפול בתרופה פנה לרופא שלך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זkok להם.
אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוילdagלייפטין אס. קיילול לגורם לתופעות לוואי בחלוקת מהמשמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואוי. ייתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות לרופא מיד אם יש לך אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- **אנגיוואדמה** (נדיר: תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

התסминים כוללים נפיחות של הפנים, הלשון או הגרון, קושי בבליעה, קשיי נשימה, הופעה פתאומית של פריחה או סרףזה (תסמין המציגים על תגובה אלרגית קשה ונדרירה הקרויה 'אנגיוואדמה').

• מהחלת כבד (הפטיטיס) (שכיחות אינה ידועה): התסמין כוללים הצהבה של העור והעינים, בחילה, אובדן תיאבון, שתן כהה, התסמין המציגים על מהלות בכבד (צהבה).

• דלקת של הלבלב (פנקראטייטיס) נדיר: (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):
התסמין כוללים כאב חריף ומתחש באזורי הבطن אשר עלול להקרין לגב כמו גם בחילות והקאות.

תופעות לוואי אחרות:

תופעות לוואי אפשריות במהלך נטילת וילdagלייפטין אס. קייל:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מעשרה):
כאב גרון, נזלת, חום.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):
פריחה מגדרת, רעד, כאב ראש, סחרחותה, כאבי שרירים, כאב במפרקים, עצירות, נפיחות של כפות הידיים, הקרסוליים או כפות הרגליים (בצקת), הזעה מוגברת, הקאה, כאבים בתרך ומסביב לקיבה (כאב בטני), שלשול, צרבת, בחילה, ראייה מטושטשת.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
עליה במשקל, צמרמותה, חולשה, חוסר תפוקוד מיני, רמת סוכר נמוכה בדם, הצלברות גזים במערכת העיכול.
תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

דלקת בלבלב.

מאז שהתקשר משוק, דווחו תופעות הלואוי הבאות בשכיחות לא ידועה (לא ניתן להעריך מהנתונים הנוכחיים):
קילופי עור מקומיים או שלפוחיות, דלקת של כלי דם (וסקוליטיס) שעשוויה לגרום לפריחה בעור או לנקודות
מורמות, שטוחות, אדומות ועגולות מתחת לפני העור או לחבורות.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוחה על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדיווח על

<https://sideeffects.health.gov.il>: או על-ידי כניסה לkishor: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנع הרעללה!** חרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווה ראייתם של ילדים
ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריה מאשר התגובה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתייחס
ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

יש לאחסן מתחת ל- 25°C .

6. מידע נוסף

נוסח על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose, sodium stearyl fumarate. Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium,

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה לבן עד אופ וויאט, עגולה, בעלת פנים שטוחות ושולטים משופעים.

גודל האריזה: 28 או 56 טבליות.

ייתכן ולא כל גדי הארץ משוקקים

בעל הרישום וכתובתו :

ק.א. א. קים אינטרנשיונל (א.ק.י. פארמה) בע"מ, יגאל אלון 94, תל-אביב-יפו, 6789139.

שם היצרן וכתובתו:

GALENICUM HEALTH, S.L., SPAIN

AVDA. DIAGONAL 123, 11TH FLOOR, 08005 BARCELONA, SPAIN

נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 174-65-36635

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

KS_VILDAG_PIL_10_23-V1