

يسوّق هذا الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ترزسپاير™

محلول للحقن

للحقن تحت الجلد

التركيب:

تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال (1.91 ملل) على:

تيزيبيلوماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

للمركبات غير الفعالة، أنظر البند 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

ترزسپاير مخصص كعلاج مداومة بالإضافة إلى العلاج الحالي للربو الوخيم لدى البالغين والمراهقين فوق عمر 12 سنة.

الفصيلة العلاجية:

أدوية لعلاج تضيق الطرق التنفسية.

مستضد وحيد النسيلة ضد البروتين TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*)

ما هو ترزسپاير

ترزسپاير عبارة عن دواء يحتوي على المادة الفعالة تيزيبيلوماب، الذي يعتبر مستضد وحيد النسيلة. إن المستضد هو عبارة عن نوع بروتين مصمم للتعرف والارتباط بموقع هدف معين في الجسم. موقع الهدف الخاص لتيزيبيلوماب هو بروتين يسمى TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*). للبروتين TSLP دور هام في المسيرة الالتهابية في الطرق التنفسية حيث يسبب أعراض وعلامات الربو. بواسطة حجب عمل البروتين TSLP، فإن ترزسپاير يساهم في تقليل المسيرة الالتهابية وأعراض الربو.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألبرجي) لتيزيبيلوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في البند 6). تحقق من الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً أو كنت تعتقد أن ذلك قد ينطبق عليك

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال ترزسپاير

- ترزسپاير ليس دواء طوارئ. لا تستعمله لعلاج نوبات الربو المفاجئة.
- إذا لم يتحسن الربو لديك أو إذا تفاقم أثناء العلاج بالدواء، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة.

• **انتبه لأعراض رد الفعل التحسسي.** يمكن أن تسبب أدوية مثل ترسپاير ردود فعل تحسسية خطيرة لدى بعض الأشخاص. تختلف علامات ردود الفعل هذه ويمكن أن تشمل انتفاخ الوجه، اللسان أو الفم لديك، مشاكل في التنفس، نبض سريع، إغماء، دوار، الشعور بدوخة، شرى وطفح. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، **تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.** تحدث مع الطبيب حول كيفية تشخيص علامات مبكرة للحساسية وكيفية التعامل معها إذا ظهرت.

• **انتبه للعلامات المحتملة لحدوث تلوث خطير أثناء استعمالك ترسپاير مثل:**

- سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلوانزا، تعرّق ليلي
- سعال لا يتوقف

○ جلد مائل للون الأحمر، ساخن ومؤلم أو طفح جلدي مؤلم يترافق بحويصلات.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، **تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.**

إذا وُجد لديك حاليًا **تلوث خطير، تحدث مع طبيبك،** قبل استعمالك لترسپاير.

• **انتبه لأعراض المشاكل القلبية، مثل:**

- آلام في الصدر
- ضيق في التنفس
- شعور عام بعدم الراحة، وعكة أو تضرر جودة الحياة.
- دوار أو إغماء.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، **تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.**

• إذا وُجد لديك **تلوث طفيلي** (ينجم عن طفيل) أو كنت تقطن في منطقة تنتشر فيها التلوثات الطفيلية (أو إذا كنت مسافرًا إلى مثل هذه المنطقة)، **تحدث مع طبيبك.** قد يضعف ترسپاير من قدرة جسمك على محاربة أنواع معينة من التلوثات الطفيلية.

الأطفال والمراهقون

ترسپاير غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة. لا تتوفر معلومات حول سلامة ونجاعة استعمال هذا المستحضر لدى أطفال دون عمر 12 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

- أخبر الطبيب إذا تلقيت مؤخرًا لقاحًا أو ستلقى لقاحًا في الفترة القريبة.

أدوية إضافية لعلاج الربو

لا تتوقف بشكل مفاجئ عن **أدوية الوقاية من الربو** بمجرد أن تبدأ العلاج بترسپاير. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتناول الستيروئيدات (تسمى أيضًا كورتيكوستيروئيدات). يجب التوقف عن استعمال هذه الأدوية بشكل تدريجي، تحت إشراف مباشر من طبيبك وبناءً على استجابتك لترسپاير.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملًا أو مرضعة، إذا كنت تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، استشيري طبيبك قبل استعمال الدواء.

لا يجوز استعمال ترسپاير أثناء الحمل إلا إذا أخبرك الطبيب خلاف ذلك. من غير المعروف ما إذا كان ترسپاير من شأنه أن يلحق الضرر بالجنين.

قد ينتقل ترسپاير إلى رضيعك عبر حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب استشارة الطبيب.

السياقة واستخدام الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر ترسپاير على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي ترسپاير على أقل من 1 ميليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل مقدار دوائي قدره 210 ملغ، وبالتالي يعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال ترسپاير دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو:

البالغون والمراهقون فوق عمر 12 سنة:

المقدار الدوائي الموصى به هو 210 ملغ (حقنة واحدة) كل أربعة أسابيع. يُعطى ترسپاير بالحقن تحت الجلد.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

سيقرر كل من طبيبك أو الممرضة، ما إذا كان بإمكانك حقن الدواء بنفسك أو إذا كان بإمكان شخص آخر يعتني بك القيام بذلك من أجلك. إذا كان الأمر كذلك، فستلقى أنت أو سيتلقى الشخص الذي يُعالجك إرشاداً حول الطريقة الصحيحة لتحضير وحقن الدواء ترسپاير.

قبل الحقن الذاتي لترسپاير، عليك قراءة كامل "تعليمات الاستعمال" بالنسبة لترسپاير محقنة جاهزة للاستعمال.

قم بذلك قبل كل عملية حقن، من الجائز أن المعلومات الواردة في "تعليمات الاستعمال" تحتوي على معلومات جديدة.

لا يجوز مشاركة محقنة ترسپاير الجاهزة للاستعمال أو استعمال المحقنة أكثر من مرة واحدة.

إذا فوّت مقداراً دوائياً من ترسپاير

- إذا نسيت حقن مقدار دوائي من ترسپاير، قم بحقن المقدار الدوائي في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك، احقن حقنتك التالية في الوقت المخطط له.
- إذا لم تلاحظ أنك فوّت مقداراً دوائياً وقد حان وقت المقدار الدوائي التالي بالفعل، احقن المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط له. لا تحقن مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي الذي فوّته.
- إذا لم تكن واثقاً متى عليك حقن ترسپاير، اسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

التوقف عن استعمال ترسپاير

لا يجوز التوقف عن العلاج بترسپاير دون التحدث عن ذلك أولاً مع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي. قد يؤدي إيقاف أو تشويش العلاج بترسپاير إلى عودة أعراض ونوبات الربو.

إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال تزياسبير قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني آياً منها.

ردود فعل تحسسية خطيرة

توجه فوراً لتلقي علاج طبي إذا كنت تعتقد أنه ربما يكون لديك رد فعل تحسسي. قد تحدث ردود الفعل هذه خلال ساعات أو أيام بعد الحقن.

غير معروفة (لا يمكن تقدير الوتيرة من البيانات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية، بما في ذلك رد فعل تحسسي خطير (تأق) الأعراض تشمل عادة:

- انتفاخ الوجه، اللسان، أو الفم لديك
- مشاكل في التنفس، نبض سريع
- إغماء، دوار، الشعور بدوخة

أعراض جانبية أخرى

شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- ألم في الحنجرة
- طفح
- آلام في المفاصل
- أعراض في موقع الحقن (مثل احمرار، انتفاخ وألم)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج الانترتي للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
 - يجب الحفاظ في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية (في الثلاجة). بعد الإخراج من الثلاجة، يمكن حفظ ترسباير في علبة الكرتون في درجة حرارة الغرفة (20 حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز إعادته إلى الثلاجة بعد أن تم تخزين ترسباير في درجة حرارة الغرفة.
 - يجب حفظ ترسباير في العلبة الأصلية حتى موعد الاستعمال، لحمايته من الضوء.
 - لا يجوز الخض، التجميد أو التعريض للحرارة.
 - لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. عند أي حالة من الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
 - لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.
 - لا تستعمل ترسباير إذا سقطت المحقنة، تضررت أو في حالة تلف ختم العلبة.
- لا يجوز إلقاء أي دواء إلى المجاري. يجب استشارة الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الاستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

L-proline, Acetic acid glacial, Polysorbate 80, Sodium hydroxide, Water for injection

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

ترسباير عبارة عن محلول شفاف حتى حليبي، عديم اللون حتى مائل للأصفر. يتوفر ترسباير ضمن علبة تحتوي على محقنة واحدة جاهزة للاستعمال.

المتيح

أسترازينيكا AB، سودرتاليا، السويد

صاحب الامتياز والمستورد:

أسترازينيكا (إسرائيل) م.ض.،

شارع عتيري ييدع 1، كفار سابا 4464301.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 171-59-37290

تم تحريرها في آذار 2024

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي

ترزسپاير™

محلول للحقن ضمن محقنة جاهزة للاستعمال

تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال (1.91 ملل) على:

تيزسپيلوماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

للحقن تحت الجلد

محقنة جاهزة للاستعمال لمرة واحدة

تحتوي تعليمات الاستعمال هذه على معلومات حول كيفية حقن ترزسپاير.

قبل استعمال محقنة ترزسپاير، سيوضح أحد أفراد الطاقم الطبي لك أو لشخص يساعدك كيفية استعمال المحقنة بشكل صحيح.

يجب قراءة 'تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي' قبل أن تبدأ باستعمال محقنة ترزسپاير لأول مرة وفي كل مرة تتلقى فيها حقنة إضافية قد تكون هناك معلومات جديدة. المعلومات التي تظهر هنا ليست بديلاً عن التحدث مع الطبيب المعالج حول حالتك الطبية أو علاجك.

إذا كانت لديك أنت أو للشخص الذي يساعدك أي أسئلة، فيجب التحدث مع الطبيب المعالج.

معلومات مهمة يجب أن تعرفها قبل حقن ترزسپاير

يجب تخزين ترزسپاير في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية في العلبة الأصلية حتى تكون مستعداً لاستعمال الدواء. يمكن الاحتفاظ بترزسپاير في العلبة الأصلية في درجة حرارة الغرفة (20 حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز إعادة إلى الثلاجة بعد تخزين ترزسپاير في درجة حرارة الغرفة. يجب التخلص من ترزسپاير الذي تم تخزينه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 30 يوماً (أنظر الخطوة 10).

لا يجوز استعمال محقنة ترزسپاير الجاهزة للاستعمال إذا:

- تم تجميد المحقنة
- سقطت المحقنة أو تلفت
- تلف ختم العلبة
- انقضى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.

لا يجوز خصّ المحقنة الجاهزة للاستعمال


لا يجوز المشاركة مع أي شخص أو معاودة استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال

لا يجوز تعريض المحقنة الجاهزة للاستعمال لمصدر حر.

استعد لحقن ترسپاير

الخطوة 1 - نظمّ المعدات

- 1 محقنة ترسپاير جاهزة للاستعمال من الثلاجة
- 1 ضمادة كحولية
- 1 قطن أو شاش
- 1 بلاستر صغير الحجم (ممكن)
- 1 حاوية مقاومة للأدوات الحادة (الرجاء أنظر الخطوة 10 - تخلص من المحقنة المستعملة)



محقنة
جاهزة
للاستعمال



ضمادة
كحولية



قطن أو
شاش



بلاستر



حاوية مقاومة
للأدوات
الحادة


الخطوة 2 - حضرّ محقنة ترسپاير للاستعمال



- ضع محقنة ترسپاير خارج الثلاجة لمدة 60 دقيقة أو أكثر قبل الحقن (كحد أقصى 30 يومًا)، من أجل أن تسخن قليلاً وتبلغ درجة حرارتها درجة حرارة الغرفة (بين 20 إلى 25 درجة مئوية).
- قم بإبقاء محقنة ترسپاير في علبة الكرتون لحمايته من الضوء.
- لا يجوز تسخين المحقنة بأي طريقة أخرى. مثلاً، لا يجوز تسخينها في الميكروويف، بالماء الساخن، بالشمس المباشرة أو وضعها بالقرب من أية مصادر للحر.
- لا تعد محقنة ترسپاير إلى الثلاجة بعد بلوغها درجة حرارة الغرفة. تخلص من محقنة ترسپاير إذا مكثت خارج الثلاجة لأكثر من 30 يومًا.
- لا يجوز نزع غطاء الإبرة حتى الخطوة 7.

الخطوة 3 - أخرج المحقنة الجاهزة للاستعمال من العلبة

أمسك جسم المحقنة (ليس بالمكبس) لإخراج المحقنة الجاهزة للاستعمال من الصينية.



الخطوة 4 - افحص المحقنة الجاهزة للاستعمال


تحقق من أن المحقنة الجاهزة للاستعمال ليست تالفة. لا تستعمل المحقنة الجاهزة للاستعمال إذا كانت تالفة.

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية الذي على المحقنة الجاهزة للاستعمال. لا تستعمل المحقنة الجاهزة للاستعمال إذا انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية.

أنظر إلى السائل من خلال نافذة المشاهدة في المحقنة. يجب أن يكون السائل الموجود في المحقنة صافياً وعتيم اللون أو مائلاً للأصفر.

لا تستعمل محقنة تزسباير الجاهزة للاستعمال إذا كان السائل الموجود في المحقنة عكراً، إذا كان لونه مختلفاً عن الموصوف أعلاه أو إذا كان يحتوي على جزيئات كبيرة.

قد تلاحظ فقاعات هواء صغيرة في السائل الموجود في المحقنة. هذا سليم. ليست هناك حاجة لفعل أي شيء حيال ذلك.



تاريخ انقضاء
الصلاحية


حقن تزسپاير

الخطوة 5 - اختر مكان حقن تزسپاير

إذا كنت تحقن تزسپاير لنفسك، فإن موقع الحقن الموصى به هو الجزء الأمامي من فخذك أو الجزء السفلي من بطنك. لا تحقن لنفسك في الذراع.

إذا تم إجراء الحقن من قبل شخص آخر، فيمكنه حقنك في أعلى الذراع، في الفخذ أو في البطن. بالنسبة لكل حقنة، اختر مكان حقن مختلف يبعد 3 سنتيمترات على الأقل من مكان الحقن الأخير.

- لا تحقن في مسافة حتى 5 سنتيمترات من سرتك.
- لا تحقن في مكان يكون فيه جلدك حساساً، مرضوضاً، فيه ندبة أو قاسياً.
- لا تحقن على ندبة أو جلد متضرر.
- لا تحقن من خلال الملابس




الخطوة 6 - اغسل يديك ونظف مكان الحقن

اغسل يديك جيداً بالصابون والماء.

نظف منطقة الحقن بضمادة كحولية بحركات دائرية. دع المنطقة تجف في الهواء.


لا تلمس المنطقة التي نظفتها قبل الحقن.

لا تجفف المنطقة بالنفخ أو بأي تهوية




الخطوة 7 - انزع غطاء الإبرة

لا تقم بنزع غطاء الإبرة حتى تكون جاهزاً للحقن.
أمسك جسم المحقنة بيد واحدة، واسحب بحذر وبشكل مستقيم غطاء الإبرة بيدك الأخرى.
لا تمسك بالمكبس أو رأس المكبس أثناء نزع غطاء الإبرة.
ضع غطاء الإبرة جانباً للتخلص منه لاحقاً.
من الجائز أن تلاحظ قطرة سائل في طرف الإبرة، هذا سليم
لا تلمس الإبرة ولا تسمح للإبرة بأن تلمس أي سطح.
لا تضع غطاء الإبرة مرة أخرى على المحقنة




الخطوة 8 - احقن الدواء تزسباير

أمسك المحقنة الجاهزة للاستعمال بيد واحدة كما هو موضح في الصورة:




استخدم يدك الأخرى لقرص الجلد بلطف والإمساك بالجلد في منطقة الحقن، حيث ترغب في الحقن. هذه العملية ستشكل منطقة صلبة مناسبة للحقن
لا تضغط على المكبس حتى تكون الإبرة بأكملها قد دخلت في الجلد.
لا تسحب مرة أخرى رأس المكبس للخلف في أي مرحلة.


اتبع التعليمات المفصلة في الصور التالية 1، 2 و- 3 من أجل حقن الدواء تزسباير:



1. أدخل الإبرة بالكامل في الجلد المقروص بزاوية 45 درجة. لا تحاول تغيير وضعية المحقنة بعد إدخال الإبرة في الجلد.



2. ادفع رأس المكبس للأسفل بواسطة إبهامك. استمر في الدفع قدر الإمكان لضمان قيامك بحقن كل سائل الدواء.




3. استمر في الضغط على رأس المكبس للأسفل بإبهامك أثناء قيامك بسحب الإبرة من جلدك. حرر إبهامك ببطء من رأس المكبس، حتى تغطي الإبرة بمنظومة حماية الإبرة.

الخطوة 9 - افحص موقع الحقن

قد تلاحظ قليلاً من الدم أو السائل في موقع الحقن. هذا سليم. اضغط برفق على مكان الحقن بالقطن أو الشاش حتى يتوقف النزف.

لا تفرك منطقة الحقن. إذا لزم الأمر، قم بتغطية موقع الحقن بواسطة بلاستر.



التخلص من المحقنة


الخطوة 10 - التخلص من المحقنة المستعملة بأمان

تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال من تزسپاير على مقدار دوائي واحد ولا يمكن معاودة استعمالها مرة أخرى.

لا تعد غطاء الإبرة مرة أخرى إلى الإبرة.

أدخل المحقنة المستعملة وغطاء الإبرة في حاوية مقاومة للأدوات الحادة فوراً بعد الاستعمال. إرم المعدات الإضافية في سلة المهملات المنزلية.

لا يجوز التخلص من المحقنة المستعملة في سلة النفايات المنزلية.



تخلص من الحاوية المقاومة للأدوات الحادة وفقاً للتعليمات التي قدمها لك الطبيب أو الصيدلي.

لا تتخلص من الحاوية المقاومة للأدوات الحادة في النفايات المنزلية، ما لم تكن هذه هي الإرشادات الخاصة بمنطقة إقامتك.

لا تقم بإعادة تدوير الحاوية المقاومة للأدوات الحادة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.