

פולידין®

משחה

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

החומר הפעיל וריכוזו: פובידון יודיד 10% Povidone Iodine

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

• תרופה זו מיועדת לחיטוי פצעים, לחיטוי ולמניעת זיהומי עור הנגרמים ע"י חיידקים ופטרייות, לחיטוי במחלות עור ולחיטוי ידיים ועור לפני ניתוח.

• **קבוצה תרפויטית:** חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או לiodine.

אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• **אם הנך לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח,** כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנבעים מתגובות בין תרופות.

• יש להימנע משימוש על אזורים נרחבים של העור. יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בפצעים עמוקים.

• אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

• **הריון והנקה:** אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש בתכשיר - הוראות כלליות:

• הרטב במים את העור או השערות. שים מעט פולידין תרחיץ, הקצף במשך שתי דקות ושטוף היטב במים.

• לצוות הרפואי: הרטב את הידיים והזרועות במים. שים כ-3 סמ"ק פולידין תרחיץ והקצף במשך 2-3 דקות. שטוף במים. חזור על התהליך שנית ושטוף היטב. נגב במגבת סטרילית.

• חיטוי עור וקרומים ריריים לפני הניתוח: שים פולידין תרחיץ על גזה רטובה ורחץ את אזור הניתוח במשך 2-3 דקות. שטוף במים. חזור על התהליך ושטוף שוב במים. מרח פולידין תמיסה או פולידין טינקטורה על האזור הנקי והשאר להתייבש.

• **אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

4. תופעות לוואי:

• כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין תרחיץ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

• בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: פריחה, גירוי, או נפיחות מתמשכים.

• אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איר לאחסן את התרופה?

• **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• ניתן להשתמש עד 36 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

• יש לאחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Purified Water, Sodium Laureth Sulfate, Potassium Iodide, Trisodium Phosphate, Perfume FL20-02126 .
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
נזל צלול בצבע חום כהה, ריח אופייני של יוד, תכולה 200 מ"ל, 1000 מ"ל.
- בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, רחוב בר יוחאי 9,
בני ברק 5155309 או ת.ד. 39071, ת"א 6139001.
- שם היצרן וכתובתו: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,
ד.נ משגב 20174.
- פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך נובמבר 2014 ועודכן בהתאם
להוראות משרד הבריאות בתאריך דצמבר 2021.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 131.90.23413
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.