

סוויס רליף דואל רליס Swiss relief Dual Release

DICLOFENAC SODIUM 75 MG החומר הפעיל בתכשיר וחוזקו: **התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:**

As a non-steroidal anti-inflammatory analgesic in symptomatic management of rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis, acute musculo-skeletal disorders such as peri-arthritis, tendinitis, tenosynovitis, bursitis, sprains, strains and dislocations, relief of pain in fractures, low back pain, acute gout, psoriatic arthropathy.

In the management of pain and inflammation associated with orthopaedic, dental and minor surgery.

בהודעה זו מצוינים רק השינויים המהותיים על רקע צהוב. קיימים עדכונים נוספים שאינם מהותיים ואינם נכללים בהודעה זו.

העלונים המעודכנים לצרכן ולרופא נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
<https://israeldrugs.health.gov.il/#/byDrug>

בברכה,
פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ

עלון לרופא

4.2 Posology and method of administration

...

Established cardiovascular disease or significant cardiovascular risk factors

Swiss Relief Dual Release is contraindicated in patients with established congestive heart failure (NYHA II-IV), ischemic heart disease, peripheral arterial disease and/or cerebrovascular disease (see section 4.3 Contraindications).

Patients with congestive heart failure (NYHA-1) and patients with significant risk factors for cardiovascular events (e.g. hypertension, hyperlipidaemia, diabetes mellitus, smoking) should only be treated with **the lowest effective daily dose for the shortest duration possible (see section 4.4).**
~~diclofenac after careful consideration and only at doses \leq 100 mg daily when treatment continues for more than 4 weeks.~~

...

2. לפני השימוש בתרופה

...

השפעות על הלב וכלי הדם:

ייתכן שנטילת תרופות כגון סוויס רליף דואל רליס יכולה להיות מיוחסת לעלייה קטנה בסיכון להתקף לב או שבץ. סביר כי הסיכון גבוה יותר במינונים גבוהים ובטיפול ממושך. אין לעבור על המינון או משך הטיפול המומלצים.

אם אתה סובל מבעיות לב, או אם היה לך שבץ או שאתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון למצבים אלו (לדוגמה, אם אתה סובל מלחץ דם גבוה, מסוכרת, מרמות כולסטרול גבוהות או אם אתה מעשן), יש להיוועץ ברופא לגבי הטיפול.

אסור להעלות מינון מעבר ל-100 מ"ג ליום, אם אתה מטופל למשך יותר מארבעה שבועות מאחר והסיכונים הקרדיוסקולריים עלולים לעלות עם העלייה במנה ומשך הטיפול, יש להשתמש במינון היעיל הנמוך ביותר למשך הזמן הקצר ביותר.

...