

עלון לצריך לפי תקנות הרווחחים (תקשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

אציטאלופרם טבָע 20 מ"ג טבליות

אציטאלופרם טבָע 10 מ"ג טבליות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:
20 מ"ג אציטאלופרם (אוקסולאט)
Escitalopram (as oxalate) 20 mg

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:
10 מ"ג אציטאלופרם (אוקסולאט)
Escitalopram (as oxalate) 10 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספים".

קרא **בעיון את העליון עד סופו** בתרום תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווחח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נהאה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת בذرך כלל לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

תרופות נוגדות דיכאון וחרדה, מעולות את הסיכון להתקנחות ולמחשבות אובדניות בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל 25. עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים ורקוביהם, לעקוב אחר שינוי התങחותם כגון: החמרה הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וצדומה. במידה וחלים שונים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

אציטאלופרם טבָע היא תרופה נוגדת דיכאון מקובצת מעכבי ספיגת סרוטונין סלקטיביים (SSRI). תרופות השיכוך לקבוצה זו פועלות על מערכת הסרוטונין במוח על ידי העלאת רמת הסרוטונין. אציטאלופרם טבָע משמש לטיפול במצבים הבאים:

דיכאון
 הפרעות פאניק
 חרדה כללית
 חרדה חברתית
 הפרעה טורדנית כפייתית

יתכן ויעברו מספר שבועות עד שתתחליל להרגיש טוב יותר. יש להמשיך לחתוך את התרופה אפילו אם לוקח זמן עד אשר משתפרת ההרגשה. עליך לדבר עם הרופא אם אין לך שיפור או אם אתה מרגיש גרווע יותר.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אציטאלופרם) או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימת חומרים בלתי פעילים בסעיף 6 – "מידע נוספים").
- אתה נוטל תרופות אחרות מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) לא-סלקטיביים, בלתי-הפיים, כגון: פנליין, איפרונייד, איזוקרבוקסיד, ניאלאמיך, טרנילצירופרומין. יש לחכות 14 ימים לאחר קיחת תרופות אלו לפני תחילת השימוש באציטאלופרם טבָע, או לחכות 7 ימים לאחר קיחת אציטאלופרם טבָע לפני תחילת הטיפול בתרופות אלו. כמו כן, אין ליטול אציטאלופרם טבָע בו-זמן עם מעכבי מונואמין אוקסידאז הפיים מסווג AI-MAO (סוג מוקלובמץ, לטיפול בדיכאון) או מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) הלא-סלקטיבי וההפריך לנזוליד (אנטיבוטיק), או מעכבי מונואמין אוקסידאז B (MAO-B) בלתי-הפיים (כגון סלגיילין, לטיפול בפרקינסון). השימוש עם תרופות אלו מעליה את הסיכון לסינדרום סרוטונין (ראה בסעיף 2 "תגובה בין תרופתיות").
- אתה סובל מהפרעות בקצב הלב (כפי שנבדק באמצעות א.ק.ג., בדיקה של תפקוד הלב), או מפגם מולד בפעולות החשמלית של הלב.
- אתה נוטל תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב או שעולמה להן השפעה על קצב הלב (ראה בסעיף 2 "תגובה בין תרופתיות").
- אתה נוטל את התרופה פימוזיד.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באציטאלופרם טבָע, ספר לרופא אם:

- את בהירין או מניקה (ראי סעיף "הירין, הנקה ופוריות").
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד החבד או הכליה. יש להפסיק את הטיפול באציטאלופרם טבָע אם יש התקף אפילפסי בפעם הראשונה או אם חלה עלייה בתדירות ההתקפים (ראה גם סעיף 4 – "תגובה לוואי").
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד החבד או הכליה. יתכן והרופא יצטרך להתאים לך את מינון התרופה. יש לך סוכרת. הטיפול באציטאלופרם טבָע עליך להשפיע על איזון רמות הסוכר. יתכן ותידרש התאמת מינון של אינסולין /או תרופות אחרות לטיפול בסוכרת. יש לך ירידה ברמתה הנתרן בدم.
- יש לך נטייה לפתח בעקבות דימומים או חבורות, או אם אתה בהירין (ראי סעיף "הירין, הנקה ופוריות").
- אתה מקבל טיפול בנזע חשמלי (ECT).
- אתה סובל או סבלת בעבר ממחלה לב כלילית.
- אתה סובל או סבלת בעבר מהפרעות בתפקוד הלב או אם סבלת לאחרונה מהתקף לב. יש לך קצב לב נמוך במנוחה /או אם ידוע לך שאתה עלול לפתח ירידה ברמות המלחים בדם, כתוצאה של מחלת מושוכות או כתוצאה מנטילת תרופות משתנות.
- אתה סובל או סבלת בעבר מתסמים העולים להעיד על הפרעות בקצב הלב כגון: קצב לב מהיר או לא סדיר, עילפון, התמוטטות או סחרחות בזמן קימת מישיבה או משכיבה.
- יש לך או היי לך בעבר בעיות בעיניים, כגון: סוגים מסוימים של גלאוקומה (לחץ תור-עיני מוגבר).

שים לב:

חלק מהמטופלים הסובלים ממאניה דפרסיה עלולים להיכנס למצב של מאניה, המופיע ברעינות לא שגרתיים המתחלפים במהלך, שמהה לא מוסברת ופעילות גופנית מרובה מהרגיל. אם אתה חש תסמינים אלה, יש לפנות לרופא.

תסמינים כדוגמת חוסר מנוחה או קושי לשבת מנוחה או לעמוד במנוחה עלולים אף הם להופיע בשבועות הראשונים לטיפול. אם הם מופיעים יש לדוח על כך מיידית לרופא.

תרופות כדוגמת אציטאלופרם טבָע (הנקרואות SSRI/SNRI) עלולות לגרום לתסמינים של הפרעות בתפקוד המיני (ראה סעיף 4 – "תגובה לוואי"). במקרים מסוימים התסמינים נמשכו גם לאחר הפסקת הטיפול.

הפרעת פאניקה

בטיפול בהפרעות פאניקה בדרך כלל חולפים 4-2 שבועות לפני שמORGASH שיפור כלשהו.

בתחילת הטיפול חלק מהמטופלים עלולים להרגיש חרדה מוגברת, שתעלם במהלך השבע הראשון והשני של הטיפול. לפיכך, במקרים של הפרעת פאניקה מומלץ

להתחילה במינון נמוך.

חשוב מאוד לבצע את הוראות הרופא בקפדנות ולא להפסיק את הטיפול או לשנות את המנה ללא התיעצות עם הרופא.

מחשבות אובדן וחומרה של הדיכאון או של הפרעת החדרה

מחשבות אובדן או מחשבות על פגיעה עצמית שכיחות בהפרעות פסיכיאטריות, במיוחד במקרים הסובלים מדיכאון או מהפרעת חרדה. מחשבות אלו עלולות

להתגבר בתחילת הטיפול, כיוון שהשפעת תרומות אלו לוקחת זמן, בדרך כלל שבועיים, אך לעיתים יותר מכך.

הסיכוי להופעת מחשבות כאלו גבוה יותר אם:

- היו לך בעבר מחשבות אובדן או מחשבות על פגיעה עצמית.

• אתה מבוגר עיר. מידע ממטופלים קליניים מראה כי קיימים סיכון מגבר להתקנות אובדן בקרב מבוגרים מתחת לגיל 25 במצב פסיכיאטרי שוטוף בוגרי דיכאון.

אם יש לך מחשבות אובדן או מחשבות על פגיעה עצמית בכל זמן שהוא, עליך לפנות לרופא שלך או לסתת לבית חולים מיד.

מומלץ לספר לקרוב משפחה או לחבר קרוב שאתה סובל מדיכאון או מהפרעת חרדה ולבקש מהם לקרוא את העalon הזה. ניתן לבקש מהם לומר לך כאשר הם חושבים שחליה החומרה בוגרי דיכאון או בהפרעת החדרה שלך, או אם הם מוטרדים משינוי של בהתנהגותך.

ילדים ותתבגרים

אוציטאלופרם טבעי אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש ילדים ובתתבגרים מתחת לגיל 18.

במטופלים מתחת לגיל 18 אשר לערך תרומות מוגברות לתופעות לוואי כגון ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדן ועוינות (במיוחד תוקפנות, התקנות מרדנית וזעם). למרות זאת הרופא שלך יכול לרשום תרופה זו למטופלים מתחת לגיל 18 אם הוא סבור שהדבר לטובתם.

אם הרופא רשם את התרופה למטופל מתחת לגיל 18 והוא מעוניין לדון בכם - פנה שנית לרופא. עליך לדוחות לרופא שלך אם הופיעו לך תופעות הלואן המפורטות מעלה או שהן חוזמרא, במקרים מסוימים מתחת לגיל 18. כמו כן, טרם נבדקו ההשפעות רחוקות הטוויה של אוציטאלופרם בקבוצת הגיל הזה, מבחינות גדייה, התבגרות והתפתחות קוגניטיבית-התנהגותית.

תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרומות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופא. במיוחד יש לידע את הרופא או הרופך אם אתה לוקחת:

• אין להשתמש עם מכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) לא-סלקטיביים (כגון: פנולין, איפרונויד, איזוקרבוקסיד, ניאלאmid, טרנילצ'פרומין). אם נטלת אחת מתרומות אלו, יש להמתין 14 ימים לפני תחילת טיפול באוציטאלופרם טבעי. לאחר הפסקת טיפול באוציטאלופרם טבעי, יש להמתין 7 ימים לפני תחילת טיפול בתרומות אלו.

• אין להשתמש יחד עם מכבי מונואמין אוקסידאז A (Al-A) סלקטיביים, הפיכים, כגון מוקלובמיד (טיפול בוגרי דיכאון).

• אין להשתמש יחד עם מכבי מונואמין אוקסידאז B (Al-B) בלתי-הפיכים, כגון סלגיין (טיפול במחלת פרקינסון). הם עלולים להגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

• אין להשתמש יחד עם האנטיבוטיקה לינזוליד.

• ליתיום (טיפול במניה דפרסיה) וטריפטופן.

• אימיפראמין ודסיפראמין (טיפול בוגרי דיכאון).

• סומטריפטאן ותרופות דומות (טיפול במיגרנה) וכן טרמולול ותרופות דומות (օפיאידים, המשמשים לשיכוך כאבים חמורים). תרומות אלו עלולים להגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

• סימטידין, לנסופראזול ואומפרازול (טיפול בכיב קיבה), פולקונאצול (טיפול בziehomim פטרייתים), פלובוקסמין (טיפול בוגרי דיכאון) וטיקלופידין (להפחחת סיכון לשבח). תרומות אלו עלולים להעלות את ריכוז אוציטאלופרם בדם.

• סנט ג'ון ווורט (היריקום פרפרואטים St. John's Wort) תרופה צמחית טיפול בוגרי דיכאון). אספירין (חווצה אצטיל-סלייצילית) ונוגדי דלקת שאינים סטרואידים (NSAIDs) (הנמצא בוגרי דיכאון). תרומות אלו עלולים להגביר את הנטייה לדימויים.

• וורפרין (warfarin), דיפירידאמול (dipyridamole) ופנפרוקומון (phenprocoumon) (תרופות לדילול דם, נוגדי קרישא): הרופא ינטר את זמן הקriseה של דם עם התחלת הטיפול ועם סיום הטיפול באוציטאלופרם טבעי, על מנת לוודא שהמיןון של התרופה לדילול הדם שאותה נוטל מתאים.

• תרופות העוללות להוריד את סף הרגשות לפרקטיים: מפלקווין (טיפול במלליה), בופרופין (טיפול בוגרי דיכאון) וטרמולול (טיפול בכאב חמוץ). תכשירים נוירופטיים (תרופות טיפול בסכיזופרניה ובפסיכוזה) ותרופות נגד דיכאון (מקבוצות נוגדי דיכאון טריציקליים ו-SSRIs) עקב סיכון אפשרי להורדת הסף לפרקטיים.

• פלקאייניד (flecainide), פרופאפנון (propafenone) ומטופרולול (metoprolol) (טיפול במחלות לב וכלי דם), קלומיפראמין (clomipramine) (נורטריפטילין) (norgestimate) (נווגדי דיכאון) וריספרידון (risperidone) (תירידאי (thioridazine) והולופרידול (haloperidol) (הנמצא אנט-פסיכוטיות). יתכן ותידרש התאמת של המין של אוציטאלופרם טבעי.

• תרופות המורידות את רמות האשלגן או המגנים בדם, כגון שמצבים אלה מעלים את הסיכון להפרעת קצב לב מסכנת חיים.

אין ליטול קצב לב מסוג Aα ו- III, תרופות אנט-פסיקוטיות (כגון: נגזרות פונטיאזין, פימוזיד, הלופרידול), נוגדי דיכאון טריציקליים, תכשירים אנט-מיוקרביאליים מסוימים (כגון ספרפלוקסצין, מוקסיפלוקסצין, אריתרומיצין במתן תור-ורייד, פנטמידין), אנט-היסטמינים מסוימים (טיפול באלה, אסטמיזול, הידרוקסיזין, מיזולוסטין). אם יש לך שאלות נוספות בנושא זה, פנה לרופא.

• תרופות נגדות דיכאון מקבוצת SNRI ו-SSRI עלולות לגרום לסינדרום סרוטוני (נדיר) הכול תס敏ים כגון עצבנות, חוסר שקט, בלבול, הזעה, חום גבוה, רפלקסים מוגברים, עוויות שרירים, רעדות, עליה בקצב הלב (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

הסידורים עלול להתרחש בשיכחות גבוהה יותר אם אתה נוטל בו-זמן תרופות נוספות על מערכת העצבים (ראה לעיל), لكن יש לדוחות לרופא על כל תרופה נוספת שאתה נוטל.

שימוש בתרופה ומדוזן

ניתן ליטול אוציטאלופרם טבעי עם או בלי מזון.

שימוש בתרופה וארכיכת אלכוהול

כמו עבור תרופות רבות, מומלץ שלא לצורך אלכוהול עם אוציטאלופרם טבעי, על אף שלא צפואה אינטראקטיבית בין אוציטאלופרם לבין אלכוהול.

הירין, הנקה ופוריות
אם אתה בהירין או מניקה, חושבת שאתה בהירין או מתכונת בהירין, התיעץ עם הרופא או הרופך לפני שאתה משתמש בתרופה זו. אל תשתמש באוציטאלופרם טבעי אם אתה בהירין או מניקה, אלא אם התיעצת עם הרופא שלך ודונת עמו בסיכון לעומת העובדה שנטילת תרופה זו.

במידה ונטילת אוציטאלופרם טבעי במהלך 3 החודשים האחרונים של ההירין, הסימנים הבאים עלולים להופיע בתינוק שיזולד: בעיות בנשימה, עור כחול, פרכים, שינווי בטמפרטורת הגוף, בעיות בהאלה, הקאות, רמת סוכר נמוכה בדם, שרירים נזקקים או רפואיים, רפלקסים מוגברים, רעד, קופצנות, רגירות, תשישות, בכி בלתי פ███, ישוניות, קשיים בשינה. יש לפנות לרופא באופן מיידי אם תינוק מראה סימנים אלה.

ודאי שהAMILDAH ו/או הרופא שלך יודיעים שאתה נוטל אוציטאלופרם טבעי. כאשר נוטלים תרופות מסווג אוציטאלופרם טבעי בזמן הAMILDAH והחודשים האחרונים של ההירין, עליה הסיכון להופעת מצב חמור בתינוקות הנקרא יתר לחץ דם ריאתי ממושך של הילד (PPHN), הגורם לתינוק לנשום מהר יותר ולהיראות כחול. סימנים אלה מופיעים בדרך כלל במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה. במקרה ותס敏ים אלה מופיעים בתינוקר, עליך לפנות מידיית לאחר מילידת ו/או לרופא.

אם אתה נוטל אוציטאלופרם טבעי לתום ההירין, עלול להיות סיכון מוגבר לדימום וגינלי כבד זמן לאחר הלידה, במיוחד אם יש בעבר הפרעות דימום. על הרופא או המילידת שלך להיות מודעים לכך שאתה נוטל אוציטאלופרם טבעי כדי שהם יוכל לסייע לך.

במידה והשתמש באוציטאלופרם טבעי במהלך ההירין, אין להפסיק את השימוש באופן פתאומי.

איסציטאלופרム עלול לעבור לחלב האם ולכך לא מומלץ להניק בעת השימוש בתרופה. מחקרים בבעלי חיים הראו כי ציטאלופרム, תרופה דומה לאיסציטאלופרם, מפחיתה את האיכות של החרע. באופן תיאורטי, הדבר עלול להשפיע על פוריות, אולם טרם נצפתה השפעה על פוריות בני אדם.

גיהגה ושימוש במכונות
מומלץ לא לנוהג ברכב או להפעיל מכונות מסוכנות, או לעסוק בכל פעילות המחייבת ערגנות, עד שתדע כיצד איסציטאלופרםطبع משפיעה עליו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתון בטבלייה ולפיכך נחשבת נטולת נתון.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בהתאם לתמיך בהתקאות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטענה בעוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

מבוגרים
די-אנו: המינון המומלץ בדרך כלל הוא 10 מ"ג פעמיים ביום (מינון חד-יומי). הרופא שלך יכול להעלות את המינון עד 20 מ"ג ליום. הפרעת פאניק: המינון ההתחלתי הוא 5 מ"ג ליום (מיןון חד-יומי) במשך השבוע הראשון ולאחר מכן העלאת המינון ל-10 מ"ג ליום. הרופא שלך יכול להעלות את המינון עד 20 מ"ג ליום.

חרדה חברתית: המינון המומלץ בדרך כלל הוא 10 מ"ג פעמיים ביום (מיןון חד-יומי). הרופא שלך יכול להפחית את המינון ל-5 מ"ג ליום או להעלות את המינון עד 20 מ"ג ליום, בהתאם לtagbutrk לטיפול בתרופה.

פרעת חרדה: המינון המומלץ בדרך כלל הוא 10 מ"ג פעמיים ביום (מיןון חד-יומי). הרופא שלך יכול להעלות את המינון עד 20 מ"ג ליום. הפרעה טורדנית כפיפיתית: המינון המומלץ בדרך כלל הוא 10 מ"ג פעמיים ביום (מיןון חד-יומי). הרופא שלך יכול להעלות את המינון עד 20 מ"ג ליום.

קשישים (מעל גיל 65)

המינון המומלץ בדרך כלל הוא 5 מ"ג פעמיים ביום (מיןון חד-יומי). הרופא יכול להעלות את המינון עד 10 מ"ג ליום.

ילדים ומתבגרים
איסציטאלופרםطبع בדרך כלל אינה מיועדת לשימוש ילדים ובמתבגרים (ראה סעיף 2 - "לפני השימוש בתרופה").

תפקיד קליני לkey
מומלץ להיזהר במטופלים עם תפקיד קליני לkey בGRADE חמורה. יש ליטול את התרופה כפי שנרשמה על ידי הרופא.

תפקיד כבד לkey
על מטופלים אלה לקבל לא יותר מ-10 מ"ג של התרופה ליום. יש ליטול את התרופה כפי שנרשמה על ידי הרופא.

מטופלים הידועים כבעלי מטבוליזם ירוד של האנזים CYP2C19
על מטופלים הידועים כבעלי הגנטיפ זהה לקבל לא יותר מ-10 מ"ג של התרופה ליום. יש ליטול את התרופה כפי שנרשמה על ידי הרופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש

יש לבולע את התרופה עם מעט מים. ניתן ליטול את התרופה עם או בלי אוכל. אין לטעון או לכתוש את הטבלייה כיוון שטעמה מר. ניתן לחוץ את הטבלייה בקנו החיצה.

משך הטיפול
יתכן וייעברו מספר שבועות עד שתתחיל להרגיש טוב יותר. יש להמשיך ליטול את התרופה אפילו אם לוקח זמן עד אשר משתמשת ההרגשה. אין לשנות את המינון מבלי להיוועץ ברופא.
עליך להשלים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול מוקדם מדי עלולה לגרום לתסמינים לחזרה. מומלץ להתמודד טיפול לפחות 6 חודשים לאחר שימושת הרגשתך.

אם נטלה בטעות מנת יתר או אם בטעות בלבד ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. עשה זאת גם אם אין לך ברע. תסמינים אפשריים של מינון יתר הם: שחזורות, רעד, עצבנות, פרכוסים, תרדמת, בחילה, הקאה, שינוי בקצב הלב, ירידת לחץ הדם, שינוי במאזן המלחים/נוזלים בגוף.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרושים, אין ליטול מנת כפולה. אם שכחת ליטול את התרופה ונזכרת לפני השינה, קח את המנה ששכחת מיד והמשך כרגיל ביום המחרת. אם נזכרת רק במהלך הלילה או ביום המחרת, אל תקח את המנה ששכחת והמשך כרגיל.

יש להתמודד טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. יש להשתמש בתרופה זו בזמןים קבועים כפי שנקבע על ידי הרופא המטופל. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:
אל תפסיק את הטיפול באיסציטאלופרםطبع באמצעות תקפל הוראה על כף המהרופא. עם השלמת הטיפול, בדרך כלל מומלץ להפחית בהדרגה את המינון התרופה על פני מספר שבועות. הפסקה פתואמית של הטיפול עלולה לגרום לסתמיים השיכחים בסיום הטיפול באיסציטאלופרםطبع. הסיכון להופעת תסמינים אלה גבוה יותר ככל שהטיפול באיסציטאלופרםطبع היה או במין גובה או להימשך זמן רב יותר (3-2 חודשים ומעלה). אם אתה חש בתסמינים של הפסקת טיפול, עם סיום הטיפול באיסציטאלופרםطبع, היועץ ברופא. הרופא כנראה יבקש מכך להזכיר לך את התרופה ולהפחית את המינון בצורה איטית יותר.
תסמינים של הפסקת טיפול יכולים: שחזורות (חוור, יציבות או אי-בוד שווי משקל), תחושה של סיכות ("דקרור"), תחושה של צריבה וזרם חשמלי (פחות שכיח), גם בראש, הפרעות שינה (חולומות עזים, סיוטים, חוסר יכולת לישון), תחושת חרדה, כאבי ראש, בחילה, הצעה (כולל הצעה לילית), תחושת חוסר מנוחה או עצבנות, רעד, בלבול או חוסר התמצאות במרחב, הרגשה של רגשות או רגונות, שלשול, הפרעות בראשיה, דפוקות לב (פלפיטציות).

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווות והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיסציטאלופרםطبع עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות לוואי. ניתן ולא תסבול מכך אחות מהן.
תופעות אלו חולפות בדרך כלל לאחר מספר שבועות של טיפול. שום דבר כי חלק מתופעות הלואוי עשוות להיות תסמינים של מחלתך ולכן ישתפרו כאשר תתחיל להרגיש טוב יותר.

יש לפנות מיד לרופא או לבית חולים אם מופיעים התסמינים הבאים:

לא שכיח, שכיחות של עד 1 מתוך 100 מטופלים:

- דימומיים בלתי רגילים, כולל דימומיים במערכת העיכול.

נדיר, שכיחות של עד 1 מתוך 1,000 מטופלים:

- התנפחות העור, הלשון, השפתיים, הלוע או הפנים, סרפדת או קשיים בנשימה או בבליעה (סימנים לתגובה אלרגית חמורה).
- חום גבוה, עצבנות או חוסר שקט, בלבול, רעד, כיווץ חזק של שרירים, עלולים להיות תסמינים של מצב נדיר הנקרא סינדרום סרוטוני.

שכיחות לא ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות על סמך הנתונים הזמינים):

- קושי במתן שתן.
- פרכוים (ראה גם בסעיף 2 "ازחרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפיה").
- הצהבה של העור והאזור הלבן בעיניים, שהינם סימנים לביעות בתפקוד הכלבי/דלקת בכבד (הפטיטיס).
- פעימות לב מהירות ובלתי סדרות ועילפון, עלולים להיות תסמינים של מצב מסכן חיים בשם Torsade de pointes (הפרעה בקצב הלב).
- מחשבות על פגעה עצמית או מחשבות אובדן (ראה גם בסעיף 2 "ازחרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפיה").
- התנפחות פתואמית של העור או הרקמות הריריות (אנגיאואדמה).
- לאחר תחילת טיפול תכשיר דוח על מקרים של תמס שריר (רבdomיוליזיס, פירוק שריר שלד). פנה מידית אל הרופא אם אתה חש באכיב, ריגשות או חולשת שריר בלתי מוסברים.

תופעות לוואי נוספת:

מופיעות לעיתים קרובות מאוד (שכיחות של יותר מ- 1:10):
בחילה, כאב ראש.

מופיעות לעיתים קרובות (שכיחות של עד 1:10):

גודש באף (סינוסיטיס), ירידת בתיאבון או עליה בתיאבון, חרדה, חוסר מנוחה, חלומות לא נורמליים, קושי להידם, ישוניות, סחרחות, פיהוק, רעד, תחושת נימול בעור, שלשול, עצירות, הקאה, יובש בפה, העזה מוגברת, כאבי שרירים ומפרקים, הפרעות בתפקוד המין (פליטת זרע מעוכבת, בעיה בזקפה, ירידת בחשך המין), קשיים בהגעה לאורגזמה אצל נשים), עייפות, חום, עליה במשקל.

מופיעות לעיתים רחוקות (שכיחות של עד 1:100):

פריחה, גרד בעור, חריקת שניים, התרגשות, עצבנות, התקף פאניקה, בלבול, הפרעות בשינה, הפרעות בחוש הטעם, עילפון, הגדלת אישונים, הפרעות בראיה, צפצופים באוזניים (טיניטו), נשירת שער, דימום כבד במחזור, מחזור לא רגיל, הפחחת משקל, קצב לב מהיר, התנפחות גפיים, דימום מהף.

מופיעות לעיתים נדירות (שכיחות של עד 1:1,000):
תוקפנות, דָּפְרָסָגְנִילִיזָצִיה, הדיזות, קצב לב איטי.

תופעות לוואי ששיכחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות על סמך הנתונים הזמינים):

ירידה ברמת הנתרן בدم (התסמינים הם הרגשה לא טוביה ובחליה עם חולשת שרירים או בלבול), סחרחות בזמן קימה מישיבה או משכיבה בשל לחץ דם נמוך, תפקודי כבד לא תקין (עליה של אמיימי כבד בדם), הפרעות בתנוחה (תנוונות לא רצוניות של שרירים), זקפה כואבת, דימומים **לא רגילים** (างון דימומים בעור ובריריות), רמה נמוכה של טסיות הדם (טרומבוציטופניה), הפרשה לא תקינה של ההורמון ADH הגורמת לגוף לאוצר מים ולדילול הדם, ולהורדת כמות הנתרן, עליה ברמות בדם של ההורמון פרולקטין, הפרשת חלב בגברים ובנשים שאין מניקות, מאניה, עליה בסיכון לשברים נצפתה במטופלים בתרופות מסווג זה, שניינן בקצב הלב (שנקרת הארכט מקטע QT, אשר ניתן לראות בבדיקה א.ק.ג המודדת את הפעילות החשמלית של הלב). דימום וגינלי כבד זמן קצר לאחר הלידה, ראי מידע נוסף בסעיף "הירון, הנקה ופוריות" המופיע בסעיף 2 של העalon.

בנוסף, ידועות מספר תופעות לוואי המופיעות בדומה לאסציטיאלופרム (החומר הפעיל באסציטיאלופרム טבעי), שהן: אקאתיזיה (חוור מנוחה בתנוחה), איבוד תיאבון.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעalon, עליך להתיעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחcie על הקישור "דיווח על תופעת לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il. www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ועל ידי כך תמנع הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוואה מפזרת מהרופה.
- אין להשתמש בתרופה אחריה בתגובה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לשמור את התרופה באזירה המקורית על מנת להגן מפני אמור ולחות, מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך תרופות לביב או לאשפה. שאל את הרופך כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסח על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, hypromellose, titanium dioxide, polyethylene glycol.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

אסציטיאלופרם טבעי 10 מ"ג: טבלייה לבנה, מצופה, עגולה וקמורה, בצד אחד של הטבלייה יש קו ח齐יה ובצד השני של הטבלייה מוטבע "10".
אסציטיאלופרם טבעי 20 מ"ג: טבלייה לבנה, מצופה, עגולה וקמורה, בצד אחד של הטבלייה יש קו ח齐יה, מצדיו השמאלי מוטבעת הסיפה "9" ומצדיו הימני הסיפה "3".
בצד השני של הטבלייה מוטבע "7463".
קיימות אריזות של 28 או 30 טבליות.
יתכן ולא כל גודלי האריזה משוקרים.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

העלון נערך ביוני 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אוסציאלופרם טبع 10 מ"ג: 137.84.31381
אוסציאלופרם טבע 20 מ"ג: 137.85.31382

לשם הפשטות ולהקלת הקရיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.