

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ziprasertolotab**10 מ"ג**

טבליות מס'סות בפה

ziprasertolotab**5 מ"ג**

טבליות מס'סות בפה

הרכב:

כל טבלייה מס'סוה בפה מכילה:

Olanzapine 10 mg

אולצפין 10 מ"ג

הרכב:

כל טבלייה מס'סוה בפה מכילה:

Olanzapine 5 mg

אולצפין 5 מ"ג

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע נוסף" וועף "מידע חשוב" אודות חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2. קרא בעיון את העلون עד סוף בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

מידע חיוני אודות התקשייר:

ازהרה: עליה בסיכון לתמותה באנשים מבוגרים הסובלים מפסיכוזה הקשורה לדמנציה אנשים מבוגרים הסובלים לדמנציה הקשורה לפסיכוזה המטופלים בתקשירים אנטיפסיקוטיים הינם בסיכון גבוה לתמותה.

בדומה לתקשירים אנטיפסיקוטיים אטייפיים, טיפול בתקשירים אנטיפסיקוטיים קונבנציונליים עלולים להעלות את הסיכון לתמותה. **ziprasertolotab** עלולה לגרום לTOT甫עט לוואי חמורה הכוללת עלייה בסיכון לתמותה באנשים מבוגרים הסובלים מבלבול, אובדן זיכרון ואובדן קשר למציאות (פסיכוזה הקשורה לדמנציה). **ziprasertolotab** אינה מאושרת לטיפול בחולים הסובלים מפסיכוזה הקשורה לדמנציה.

ziprasertolotab מיועדת למוגברים מעל גיל 18 שנים.**1. למה מיועדת התרופה?**

טיפול אקטוא ואחזקתי בסכיזופרניה.

ziprasertolotab מותווה לטיפול בתסמינים של הפרעות פסיקוטיות.**ziprasertolotab** מותווה לטיפול קצר טוח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה דו-קוטבית I.

מניעה של היסנות בהפרעה דו-קוטבית:
 בחולים שהתקף המאניה שלהם הגיב לטיפול באולצפין, **ziprasertolotab** מותווה למניעת היסנות בחולים עם הפרעה דו-קוטבית.

טיפול משולב בהפרעה דו-קוטבית:
 השימוש של **ziprasertolotab** עם ליתיום או אלפרוראט מותווה לטיפול קצר טוח בהתקפי מאניה חריפים הקשורים להפרעה דו-קוטבית I.

קבוצה רפואיית:
 תרופות אנטיפסיקוטיות א-טייפיות.

התסמינים של סכיזופרניה כוללים שמיעת קולות, ראיית דברים שאינם קיימים, אמונה בדברים שאינם נכוןים, חשדנות וניתוק.

התסמינים של הפרעה זו קוטבית מסוג I כוללים לסירוגין תקופות של דיכאון ושל מצב רוח מרומם או עצבנות, עליה בפעולות וחסור מנוחה, מחשבות דזהות, דיבור מהיר, התנהגות אימפולטיבית ורידת בכוח לישון.

התסמינים של דיכאון עמיד לטיפול כוללים רידת במצב הרוח, התעניות נמוכה, עליה בתחשות אשמה, רידת באנרגיה, רידת בריכוז, שינויים בתיאבון ומחשבות או התנהגות אובדנית.

2. לפני השימוש בתרפיה:

אין להשתמש בתרפיה אם:

- הין רגיס (אלרגי) לאולזפין או לכל אחד ממרכיבי התרפיה האחרים.
- למידע ספציפי על התווות נגד של ליתומים או אלפרואט יש לעין בסעיף התווות נגד של העלונים המצורפים לאריזה של תכשירים אלה.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרפיה:

- **דיפרנסת ולוטב גורמת להפרעה** בגין הגוף להפחית טמפרטורה. יש להימנע ממצבים בהם תיתכן עלית יתר בחום הגוף והתיישבות, כגון פעילות גופנית מוגברת או שהיא תקופה במקום חמים. יש להקפיד על שתיתת נזלים כדי למנוע התיבשות.
- **דיפרנסת ולוטב** עלולה לגרום לתה לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה. התסמינים כוללים: סחרחות, קצב לב מהיר או איטי, ובחלק מהחולים אף התעלפות. תופעה זו מתרחשת לרוב בתחילת הטיפול.
- **דיפרנסת ולוטב עלולה לגרום לשינויים,** לתה לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה ואירוע מוטורית ותחושתית שלולים לגרום לנפילות וכתוצאה מכך לשברים ופצעות נוספת. יש להשתמש בהזרות ולשקל סיכון/תועלת במטופלים עם רകע רפואי או תרופות העולמים להגבר את הסיכון לנפילות.
- נפתחה עליה במשקל בחולים שנטלו **דיפרנסת ולוטב**. יש לעקוב אחר המשקל באופן קבוע.
- יש לעקוב אחר רמות הסוכר והשומנים בدم כיוון **דיפרנסת ולוטב** עלולה לגרום לעליית מדדים אלו.
- במטופלים בעלי היסטוריה רפואי של רמות נמוכות של תא דם לבנים, יש לבצע ספירות דם באופן קבוע בחודשים הראשונים לטיפול לצורך מעקב. **דיפרנסת ולוטב** עלולה לגרום לרידת ברמות תא דם לבנים. יש לשקל הפסקת טיפול ב**דיפרנסת ולוטב** במקרה התסמן הראשון למצב זה. על מטופלים הסובלים מרידת ברמות תא דם לבנים להיות תחת מעקב אחר הופעת חום או תסמינים אחרים המעידים על זיהום. אם ישנהו כאלו יש להפסיק את הטיפול ב**דיפרנסת ולוטב** באופן מיידי.
- לא מומלץ ליטול **דיפרנסת ולוטב** בחולים מבוגרים הסובלים מדמנציה עקב היתכנות תופעות לוואי חמורות: נפילות, ישנויות, בצתת היקפית, הליכה משתנה, בריחת שתן, לאות, עליה במשקל, חולשה, חום, דלקת ריאות, יבש בפה, הרזיות ויזואליות, שבע ומומות.
- חולים סכיזופרניים וביפולרים הינם בסיכון גבוה לביצוע ניסיונות התאבדות. לכן, בזמן הטיפול ב**דיפרנסת ולוטב** יש לבצע מעקב צמוד אחר חולמים אלו.
- יש להיזהר במטופלים שסבירו בעבר או הסובלים כת מציגת שתן, הגדלה של בלוטת הערמוני, עצירות או היסטוריה של חסימת מעיים, היות ושימוש ב**דיפרנסת ולוטב** במטופלים אלה עלול לגרום לתופעות כגון עצירות, יבש בפה וטכיקרדייה. מנסיון שהצטבר לאחר שיוק התרפיה נמצא כי הסיכון לתופעות לוואי חמורות (כולל מקרי תמותה) עלה בעקבות של **דיפרנסת ולוטב** עם תרופות אחרות אנטיכולינרגיות.

לפני הטיפול בדיפרנסת ולוטב** ספר לרופא אם הין:**

- סובל או סבלת בעבר מבעיות לב.
- סובל או סבלת בעבר משbez או "מין שבץ" (תסמינים זמינים של שבץ).
- סובל או סבלת בעבר מפרקאים, סוכרת או רמות סוכר גבוהות בדם, לחץ דם גבוה או נמוך, רמות גבוהות של כולסטרול או טריגליקידים בדם. סובל מבעיות בכבד, מערכת העיכול (כגון חסימה בעיים).
- סובל מאלצהיימר, מסרטן שד.
- סובל או סבלת בעבר מגלאוקומה צרת זית
- חווה מחשבות אובדניות או פגיעה עצמא. במקרה זה עליך לפנות מידית לרופא או לחדר מיון.

- סובל או סבלת בעבר מבלוטת ערמנונית מוגדלת.
- מרבה בפעולות גופניות או שואה במקומות חמימים לעיתים תכופות
- בעל היסטוריה של שימוש לרעה בתרופות.
- הינך רגש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- סובל מפנילקטונוריה או Phenylketonuria – **דיפרקסה ולוטב** מכילה פנילאלаниין (אספרטיאם).
- סובל מכל בעיה רפואית אחרת.

יעישן:
אם הינך מעשן – יש לדוח על כך לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

בדיקות ועקב:

- יש לעקב בתחלת ובמשך הטיפול אחר רמות הסוכר בدم, במיוחד אם הינך סובל מסוכרת או מרמתות סוכר גבוליות (dL/mg 100-126 בצום).
- יש לעקב אחר רמות השומנים (colesterol וטריגליקידים) בדם, במיוחד בחולים הסובלים מהפרעות ברמות שומני הדם או מגורמי סיכון לפתח הפרעות אלה. יש לבצע בדיקות דם לرمות שומניים בדם בתחלת הטיפול ובמהלכו גם אם איןך סובל מתסמים כלשהם.
- עליה במשקל הינה תופעת לוואי נפוצה בטיפול ב**דיפרקסה ולוטב**. יש לקחת זאת בחשבון טרם תחילת הטיפול ולבצע בדיקות מעקב שגרתיות אחר המשקל.
- במטופלים עם היסטוריה של רמות נמוכות של תא דם לבנים, יש לעקב אחר רמות תא דם לבנים בחודשים הראשונים לטיפול. יש לשקלול הפסקת הטיפול ב**דיפרקסה ולוטב** בהופעת התסמין הראשוני המופיע על ידיה בתאי דם לבנים.

תגובהות בין-תרופתיות:

- אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
- דיאזepam: מתן בו זמני של **דיפרקסה ולוטב** ודיאזepam עלול לגרום לתת לחץ דם מעבר משכיבה לישיבה (אורטוסטטי).
 - תרופות המשפיעות על האנזים CYP1A2 כגון קרבזופין, פלווקסמין, אומפרוזול וריפמפיקין – עלולות להשפיע על רמות אולנזפין בדם.
 - תרופות המכילות פחמ פעל – עלול להפחית את הספיגה של אולנזפין.
 - תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון תרופות להרגעה, תרופות לדיכאון ותרופות לשינה, תרופות לאפילפסיה – יש להיזהר ממתן בו זמני של תרופות אלה ואולנזפין.
 - תרופות להורדת לחץ הדם – אולנזפין עלול להגביר את אפקט הורדת לחץ הדם ממתן משולב עם תרופות אלה.
 - תרופות המחקות פעילות דופמין (כגון התרופה לטיפול בפרקינסון – לוודופה וAGONISTים לדופאמין) – אולנזפין עלול לעכב פעילות תרופות אלו.
 - תרופות אנטי-קולינרגיות – שילובן יחד עם **דיפרקסה ולוטב** עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי חמורות במערכת העיכול הנובעות מירידה בתונעויות מערכת העיכול. יש להיזהר ממתן בו זמני של תרופות אלה ואולנזפין.
 -

שימוש בתרופה ומזון:
ניתן לקחת **דיפרקסה ולוטב** עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

הימנע מצריכת אלכוהול בזמן שימוש **דיפרקסה ולוטב**. שתית אלכוהול בזמן נטילת **דיפרקסה ולוטב** עלולה לגרום לך להיות יותר ישנו בהשוואה לנטילת **דיפרקסה ולוטב** ללא אלכוהול.

הירioxן, הנקה ופוריות:

הירין

התיעצץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה. התיעצץ ברופא אם הינך בהירין או מתכנתת הירין. לא ידוע האם **ZIPRUKSA** ו**LOTAB** פוגעת בעבר. יהודים עלולים לפתח תסמנות גמilia אם האם נטלה את התרופה בטרימסטר האחרון (שלושת החודשים האחרונים) של ההירין. תסמנות הגמilia כוללת את התסמינים הבאים: חוסר שקט, רעד, קשין/חולשה בשירים, ישוניות, עצבנות, בעיות נשימה ובעיות בהאכלה. אם הילד שילך מפתח אחד או יותר מהתסמינים הנ"ל, צרי קשר עם הרופא.

הנקה

התרופה עוברת לחלב אם. ישנים דיווחים על עודף הרגעה, נרגנות, קושי בהאכלה, רעד והפרעה בתনועות שרירים בתינוקות שהו חשופים לאולנזין. יש לבצע אחר תסמים אלו בתינוקות שהו חשופים לאולנזין. אין מידע לגבי השפעת אולנזין על יצור החלב. שוחחי עם הרופא לגבי הדרכ הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם הינך נוטלת **ZIPRUKSA** ו**LOTAB**.

פוריות

טיפול בZIPRUKSA וLOTAB עלול לגרום לעלייה ברמת פרולקטין בדם, שיכולה להוביל לפגיעה הפיכה בפוריות בנשים בגיל הפרון.

נהיגה ושימוש במכונות:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לשינויו ולהשפעה על יכולת קבלת החלטות, חסיבה חדה או תגובה מהירה ועל כןichiיב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המכילה מחייבת ערנות. הימנע מכל פעילות שמצו עד שתבין כיצד **ZIPRUKSA** ו**LOTAB** משפיע עלך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

ZIPRUKSA ו**LOTAB** 0.5/0.6 מ"ג מכילה אספרטים 0.6/0.8 מ"ג (בהתקאה) בכל טבלייה מסיסה. אספרטים הוא מקור של פנילאלניין. הוא עלול להזיק למטופל שיש לו פנילקטונוריה, הפרעה גנטית נדירה שבה פנילאלניין מצטרבר, כתוצאה לכך שהוא לא יכול לפנותו כנדרש.

ZIPRUKSA ו**LOTAB** מכילה פרהידרוקסיבenzozat – עלול לגרום לתגובה אלרגיות (ייתכנו תגובות מאוחרות).

3. כיצד תשמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטעו בנוגע למינון ולأופן הטיפול בתרופה.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. יתכן שהרופא יctrיך לשנות את המינון עד למציאת המינון המתאים לך.
- אין לעبور על המנה המומלצת.
- יש לוודא שהידיים יבשות. יש להפריד ייחידה אחת מרזרקת המגשית ולקלף בזהירות את הכיסוי. אין לדוחוף את הטבליה. יש להוציא את הטבליה ולהניח בהפה בשלמותה מיד לאחר קילוף הכיסוי. הטבליה נמסה ברוק במחירות, לכן ניתן לבלווע אותה בקלות עם או בלי משקה.
- אין מידע על התכשיר כשהוא מרוסק, חצוי או כתוש. אי לcker, אין לרסק, לחצות או לכתוש את הטבליה!
- לא קיים מידע על התכשיר בשימוש בזונדה.
- **אם נטلت בטעות מינון גבוה יותר** אתה עלול לחוש רדום, לחווות הפרעה בדייבור, אגרסיביות או חוסר שקט, קצב לב מהיר וירידה ברמת הרכרה.
- אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
- **אם שכחת ליטול את המנה** וקייח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אם זה בסמוך למועד נתילת המנה הבאה, דלג על המנה וקייח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה.
- יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
- גם אם חיל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא או הרוקח.
- כדי למנוע תופעות לוואי חמורות אין להפסיק **NETILAT ZIPRUKSA וLOTAB** בפתאומיות. אם עליך להפסיק **NETIL LOTAB ZIPRUKSA וLOTAB**, הרופא ינחה אותך כיצד יש לעשות זאת.

- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוקק להם.
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בziprasig וLOTUS עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחן למקרא רשימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

ziprasig וLOTUS עלולות לגרום לתופעות לוואי חמורות:

1. **עליה בסיכון למותם** במטופלים קשיישים הסובלים מבלבול, אובדן זיכרון ואובדן קשר עם המציאות (פסיכוזה הקשורה בדמנציה). **ziprasig וLOTUS** אינה מיועדת לשימוש במטופלים קשיישים הסובלים מדמנציה.
2. **עליה ברמות הסוכר בدم (היפרגליקמיה)** עלולה להתרחש במטופלים הסובלים מסוכרת ובמטופלים שאינם סובלים מסוכרת. עליה ברמות הסוכר בدم עלולה לגרום ל:

- קטואצידוזיס - עליה ברמות חומרה בدم בעקבות הצטברות קטונים
- תרדמת (קומה)
- מוות

על הרופא שילך לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם לפני תחילת הטיפול בziprasig וLOTUS ובמהלכו. במטופלים שאינם סובלים מסוכרת, עליה ברמות הסוכר בדם עוברת בעת הפסיקת הטיפול בziprasig וLOTUS. מטופלים הסובלים מסוכרת וחילק מהמטופלים שלא סבלו מסוכרת בעת תחילת הטיפול בziprasig וLOTUS ולוטב צריכים ליטול תרופה להורדת רמות סוכר בדם גם לאחר הפסקת הטיפול בziprasig וLOTUB. אם אתה סובל מסוכרת, על הרופא שילך להנחות אותך באיזו תדירות לבצע בדיקות דם לרמות סוכר בדם בזמן נטיית ziprasig וLOTUB.

יש לפנות לרופא אם אתה סובל מאחד מהתס敏ין רמת סוכר גבוהה בדם:

- צימאון מוגבר
- עליה בתכיפות מתן שתן
- הרגשת רעב מוגברת
- הרגשת חולשה או עייפות
- הרגשת בחילה
- הרגשת בלבול או ריח פירות מהפה.

3. **עליה ברמות שומנים (コレsterol וטריגליקידים) בדם** עלולה להתרחש במטופלים בziprasig וLOTUB. על הרופא שילך לבצע בדיקות דם לרמותコレsterol ושומנים בדם לפני תחילת הטיפול ובמהלכו גם אם אין סובל מהתס민ין כלשהם.

4. **עליה במשקל נפוצה** מADOW במטופלים בziprasig וLOTUB. בחלק מהמטופלים ישנה עליה קיצונית במשקל. יש להתייעץ עם הרופא בנוגע לשינויו על המשקל כגון תזונה בריאה ופעילות גופנית.

5. **שכיחות מוגברת של שbez או "מין-שbez" - אירוש איסכמי חולף (AIA)** בקרבת קשיישים הסובלים מפסיכוזה הקשורה בדמנציה (קשיישים הסובלים מאובדן קשר עם המציאות בעקבות בלבול ואובדן זיכרון).ziprasig וLOTUB אינה מאושרת עבור מטופלים אלה.

6. **תסמונת נירולפטית ממאירה (Neuroleptic Malignant Syndrome)** - מצב נדיר אך חמור מאוד אשר עלול להתרחש במטופלים הנוטלים תרופות אנטי-פסיכוטיות, כולל ziprasig וLOTUB. תסמונת נירולפטית ממאירה עלולה לגרום למותם ומחיצה אשפוז. יש לפנות מיד לרופא אם אתה נהיה חולה וסובל מהתסמינין הבאים:

- חום גבוה
- הזהה מוגברת
- נזקשות שרירים
- בלבול
- שינויים בנשימה, דופק ולחץ דם

7. **תופעת לוואי הכללית אודינופיליה ותס敏ין סיסטמיים (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS)**. תופעה זו עלולה להתרחש עם ziprasig וLOTUB. תופעה זו עלולה לכלול: פריחה, חום, בלוטות נפוחות ומעורבות של איברים פנימיים נוספים כגון: כאב, כאליות, ריאות ולב. תופעה זו עלולה לגרום לפעמים למותם, אך יש לספר לרופא מיד אם אתה סובל מאחד מהתסmins הללו.

8. טרידיב דיסקינזיה (**Tardive dyskinesia**) - מצב הגורם לתנועות לא רצוניות, בגוף שקורות ואין לך שליטה עליהן. התנועות בדר"כ הין של הפנים והלשון. התופעה עלולה להמשיך גם אחרי הפסקת הטיפול בZIPRKSA ולוטב. התופעה עלולה גם להתחילה אחרי הפסקת הטיפול בZIPRKSA ולוטב. יש לספר לרופא אם יש לך תנועות גוף לא נשלטות.
9. ירידה בלוץ הדם בעת שניינִי תנוכה הכלולת תסמיינים כגון סחרחות, דופק מהיר או איטי או עליון. התופעה מתרחשת בעיקר בתחילת טיפולת התרופת.
10. קושי בבליעה העולן לגורם למבחן או לשתייה להגיע לראיות.
11. פרכויסים - ספר לרופא שapr אמתה חוויה פרכויס במהלך הטיפול בZIPRKSA ולוטב.
12. בעיות בויסות חום הגוף - אתה עלול לסבול עליה בחום הגוף, לדוגמה כאשרה מתעמל או נמצא באיזור חמם מאוד. חשוב לשנות מים על מנת למנוע התיבשות. יש לפנות מיד לרופא אם אתה נהיה חולה מאוד וסובל מתסמיינים של התיבשות:
- הצעת יתר או חוסר הצעה
 - יובש בפה
 - מריגש חם מאוד
 - צימאון מוגבר
 - אצירת שתן

תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי המופיעות לעתים קרובות מאוד:
חולשה (חסור אנרגיה), יובש בפה, עצירות, הפרעת עיכול, ישנות, סחרחות, פציעה מתאונת, נודד שינה, פרקינסוניזם.

תופעות לוואי המופיעות לעתים קרובות:
חום, רעד, כאב גב, כאב חזה, כאבים בגפיים, כאבים במפרקים, עליה בקצב הלב, יתר לחץ דם, הקאה, אי שקט גופני, תאבון מוגבר, שינוי התנהגות, עליה ברמות טראגי-צידדים בدم, עליה במשקל, יתר לחץ דם במהלך משליכה לישיבה, דימום נת ערוי המתבטא בכתמים בעור, בצתקת פריפריאלית, הליכה לא רגילה, נזקשות שרירים, ליקויי היגיינה (דיבור), נחלת, שיעול, עין עצלה, דלקת הלוע, נמנום, בריחת שתן, זיהום בדרכי השתן, עליה בرمמות פרולקלטין, עליה בرمמות של אלקלאלין פוסףטاز בדם, הפרשת חלב מהשד, גידלה של השד בגברים, פגיעה בזיכרון, נמלול, מצב רוח מרומם (אפוריה), קוצר נשימה, עור יבש, אקנה, פגעה בריאות, כאבי מוחזר ודלקת בגרתית בנשים, צואה קשה או מתן צואה לעתים רחוקות.

תופעות לוואי המופיעות לעתים רחוקות:
צמרמורת, בצתקת בפנים, רגשות לאור, ניסיון התאבדות, שbez, התרחבות כלי דם, בחילה, הקאה, בצתקת בלשון, ירידה בرمמות תא דם לבנים, ירידה בرمמות טסיות הדם, רמות גבוזות של בילירובין בדם, רמות נמוכות של חלבונים בדם, בעיות קוואורדינציה, הפרעה בדיבור, ירידה בחشك המין, קהות חושפים, דימום מהאף, נשירת שיער, יובש בעיניים, שינויים במיקוד הראייה (אקוומודציה), אין אונות, שינויים במוחזור החודשי (גון אל וסת, ירידה/עליה בדים הוויסטי, דימום ויסתי כבד), אצירת שתן, תכיפות וdochיות במתן שתן, נפח שתן גדול, כאב בשד, דיסטוניה (התכווצות שרيري הצוואר, קשיי בליעה, קשיי נשימה, הוצאה של הלשון), נפיחות בבטן ומומות על רקע סוכרת.

תופעות לוואי המופיעות לעתים נדירות:
אפקט הנגאובר, חסימת מעיים, כאב שומני, אוטואופורוזיס, תרדמת, בצתקת בריאות, התרחבות אישונים, מומות פתאומי.

תופעות לוואי בשכיחות שאינה ידועה:
תגובה אלרגית [גיאן]: תגובה אנាបילקטית, התנפחות הפנים או הגרון (אנגיאודמה), גירוד, פריחה], תרדמת הקשורה לsocرت, קטואציג'וזיס סוכרתי, תופעות לוואי שלולות להופיע בעת הפסקת טיפול (בחילה, הקאה והצעה), צהבת, דלקת בלבל ובכבד, פגעה בכבד, הפרשת רוק מוגברת, תסמנות הרגליים העצביות

(פריאפיים), פגעה בשרירים הגורמת לכאבים (רבדומיליזט), פקקת ורידים, גmagom.

אם הופעה תופעת לואו, אם אתה מטופעת הלואו מחייבת, או כאשר אתה סובל מטופעת לואו שלא הזכרה בעלו, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לואו:

ניתן לדוח על תופעות לואו למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואו" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לואו, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי קר תמנוע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C .

6. מידע נוספת:

נוסך על החומר הפעיל, טבליות זיפרקסה ולוטב מכילות גם:

Gelatin,mannitol, aspartame, sodium methyl parahydroxybenzoate, sodium propyl parahydroxybenzoate and purified water.

טבליות זיפרקסה ולוטב 5 מ"ג: מכילות אספרטימ 0.60 מ"ג/טבליה.
טבליות זיפרקסה ולוטב 10 מ"ג: מכילות אספרטימ 0.80 מ"ג/טבליה.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה:
אריזות מגשית (בליסטר) של 14, 28 טבליות עגולות צהובות.
יתכן שלא כל גודלי הארץיות משוקקים.

בעל הרישום וכתובתו: אל' לילי ישראל בע"מ, רח' השיזף 4, ת.ד 4246, רעננה 4366411.

שם הייצן וכתובתו: לילי בע"מ, אלקבנדס (מדריד), ספרד.

עודכן ביוני 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

זיפרקסה ולוטב 5 מ"ג: 130-75-30740-00-00

זיפרקסה ולוטב 10 מ"ג: 130-76-30741-00-00

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.